

**ສັດປ່າ ແລະ
ຖິ່ນຢູ່ອາໄສທີ່ສຳຄັນຂອງສັດປ່າ
ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ**

**Integrated Ecosystem and Wildlife
Management Project**

April 2006



Copyright © 2006

Integrated Ecosystem and Wildlife Management Project:
Bolikhamxay Province Provincial Agriculture and Forestry Office and the Wildlife Conservation Society. Reproduction of material from this document for education or other non-commercial purposes is authorized without prior permission, provided that the source is acknowledged.

Disclaimer:

The interpretations express in this report represent those of the authors and do not imply the endorsement of Wildlife Conservation Society or the donor. The designation of geographical entities and their presentation in this report do not imply an opinion on the part of Wildlife Conservation Society concerning the legal status of any county, territory or area, or its authorities, or the delimitation of its frontiers or boundaries.

Cover Illustrations:

Background Phou cvcvcv Photo: IEWMP.

Citation:

IEWMP 2006 *Significant Wildlife and WILDLIFE Habitats of Bolikhamxay Province*. Bolikhamxay Provincial Agriculture and Forestry Office and Wildlife Conservation Society. Vientiane Lao PDR.

Copies available from:

Bolikhamxay Provincial Agriculture and Forestry Office
Bolikhamxay Province or
Wildlife Conservation Society – Lao Program
Vientiane, Lao PDR
Tel/Fax: +856 21 215400
Email: wcs-Lao@wcs.org

ສັດປ່າ ແລະ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສທີ່ສຳຄັນຂອງສັດປ່າ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

1. ອະລຳພະບົດ

1.1 ເປົ້າໝາຍ ຂອງປຶ້ມຫົວນີ້

ຫ້ອງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ
ເພາະມັນສັງລວມເອົາເນື້ອ
ໃນ ສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງບົດ
ລາຍງານສະບັບນີ້

ປຶ້ມຫົວນີ້ ຂຽນຂຶ້ນສຳລັບພະນັກງານການນຳ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ “ວຽກງານອະນຸລັກ” ສັດປ່າ ແລະ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ຢູ່ໃນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປຶ້ມຫົວນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີທິບທວນລະອຽດ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນ ສັດປ່າຂອງພືດຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງ, ແຕ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ສັດປ່າຊະນິດສຳຄັນ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງມັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອເນັ້ນ ເຖິງວ່າ: ແມ່ນຫຍັງແທ້ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອະນຸລັກ, ຫຼາຍກວ່າການປົກປັກຮັກສາ ແບບລວມໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຈະດຳເນີນການອະນຸລັກແນວໃດ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄຈ້ແຍກ ໃຫ້ ຮູ້ວ່າ “ແມ່ນຫຍັງ” ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ “ເຮັດແນວໃດ”, ສະນັ້ນປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງເປັນ ພຽງບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.

1.2 ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງແມ່ນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີເນື້ອທີ່ປ່າ
ໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ສຳຄັນທີ່
ສຸດຈຳນວນ ໃນການອະນຸລັກ

ສ ປ ປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ 17 ແຂວງ (ໃນນັ້ນ ມີ 1 ນະຄອນຫຼວງ), ໃນປັດຈຸບັນ ມີພຽງແຂວງບໍລິຄຳໄຊເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເປັນຕົວແທນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການອະນຸລັກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF). ເປັນ ຫຍັງ? ເຫດຜົນ ມີຄື ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຄວາມສຳຄັນສູງລະດັບໂລກ ສຳລັບການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ມາຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງ ຊຶ່ງສ່ວນໜຶ່ງ ນອນຢູ່ໃນເຂດສາຍພູຫຼວງ (ຫຼືສາຍພູອານາມ). ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ ອົງການກອງທຶນທຳມະຊາດໂລກ (WWF) ໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະ ຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບຖິ່ນຢູ່ອາໄສທຳມະຊາດ ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງລວມມີທັງທະວີບ ອາຟຼິກ ກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ເກາະດອນຕ່າງໆໃນທະວີບໂອເຊອານີ – ໂດຍ ໄດ້ກຳນົດ ເຂດບຸລິມະສິດສູງທາງດ້ານການອະນຸລັກ ປະມານ 200 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “200 ເຂດຂອງໂລກ”. ເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍບ່ອນ ເປັນ “ຈຸດໝໍ້ແຫຼມ” ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ຫຼືເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນເຂດສຳຄັນສູງ ດ້ານການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ. ສາຍພູຫຼວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ວຽດນາມ ແມ່ນ ບ່ອນໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນ 200 ເຂດຂອງໂລກ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າ ເປັນລະບົບ ນິເວດ ຂອງດິນ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

“ຈຸດໝໍ້ແຫຼມ” ໝາຍເຖິງເຂດທີ່
ມີຄວາມສຳຄັນສູງທາງດ້ານຊີ
ວະນາໆພັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ອະນຸລັກ
ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງ
ສັດປ່າ ແລະ ຮັກສາໄວ້ສຳລັບ
ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປ

ສາຍພູຫຼວງ ແມ່ນກວມເອົາດິນແດນຂອງປະເທດຫວຽດນາມເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຍາວ ຢຽດ ການຫຼາຍແຂວງຕາມແນວຊາຍແດນ, ເບື້ອງ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນມີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ກຳມວຸນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ? ອັນທີໜຶ່ງ ແມ່ນຍ້ອນ ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມສູງຫຼາຍ (ປະຊາກອນ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ມີເຖິງ 81 ລ້ານຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ ສ ປ ປ ລາວ ມີພຽງ ປະມານ 5,5 ລ້ານຄົນ) ຈຶ່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ຖືກທຳລາຍ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ປະເທດ

ຫວຽດນາມ ສູນເສຍໂອກາດ ໃນການອະນຸລັກບໍລິເວນສາຍພູຫຼວງເບື້ອງປະເທດຫວຽດນາມ, ແຕ່ກໍຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະອະນຸລັກໄດ້ຢູ່ໃນ ເບື້ອງຂອງ ສ ປ ປ ລາວ.

ສາຍພູຫຼວງເບື້ອງ ສ ປ ປ ລາວ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີອັນແຕກຕ່າງ ກັບແຂວງອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມສຳຄັນນຳມວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ:

- ອັດຕາຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ຍັງມີສູງ, ສູງກວ່າອັດຕາຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງສາຍພູ ຫຼວງຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຫຼາຍ.
- ປ່າໄມ້ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ສັດປ່າມີຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ໂຕເສົາຫຼາ ພົບ ເຫັນຢູ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ, ແຕ່ບໍ່ມີຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ຫຼື ອາດບໍ່ມີຢູ່ແຫ່ງໃດອີກໃນໂລກ ນອກຈາກ ເຂດສາຍພູຫຼວງ. ປະເພດປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນຖິ່ນຢູ່ ອາໄສຂອງເສົາຫຼາ ບໍ່ມີຢູ່ໃນແຂວງໃດໆອີກ (ຍັງມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ຢູ່ໃນ ພາກຕໍ່ໄປ).
- ນອກຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນແລ້ວ ແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊ ບໍ່ມີເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີປ່າໄມ້ແບບສາຍພູຫຼວງຕາມຊາຍແດນ ລາວ- ຫວຽດນາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍ ຍັງຂ້ອນຂ້າງດີ, ແຕ່ເຂດດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ມີໂຕເສົາຫຼາ ແລະ ສັດປ່າຊະນິດສຳຄັນທີ່ມີຢູ່ເຂດປ່າໄມ້ສາຍພູຫຼວງອາໄສຢູ່ ຍ້ອນວ່າຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ຂອງມັນ ແຕກຕ່າງກັນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພື່ອການ ອະນຸລັກ.

1.3 ທີ່ມາ ຂອງຂໍ້ມູນ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັດປ່າກໍຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຈຳກັດ ຢູ່ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບການສຶກສາລະອຽດທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງລຽບຕິດຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ພູຫີນປູນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ພູມາດ ຂອງປະເທດຫວຽດ ນາມ.

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີພຽງການສຶກສາເລັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ, ເຂດ ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ແລະ ພູເຂົາຄວາຍ. ສ່ວນເຂດອື່ນໆຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ ການສຳຫຼວດ ສຶກສາກ່ຽວກັບສັດປ່າເທື່ອ. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊຶ່ງຂຽນໂດຍອົງການອະ ນຸລັກທຳ ມະຊາດໂລກ (IUCN) ໃນປີ 2000 ນັ້ນມີພຽງ 2 ວັກທີ່ຂຽນ ກ່ຽວກັບສັດປ່າໂດຍລວມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ເນັ້ນໜັກ ກ່ຽວກັບເສົາຫຼາ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມໃນການຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້ ແມ່ນມີຈຳກັດ, ແລະ ມັນກໍເປັນພຽງບາດກ້າວເລີ້ມຕົ້ນ ໃນ ການລວບລວມ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສັດປ່າ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຈາກບົດລາຍງານ ຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊເອງ, ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ມາເພື່ອມາຂຽນລົງໃນປຶ້ມຫົວນີ້. ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ນຳມາຂຽນປະກອບ ໃນ ປຶ້ມຫົວນີ້ ແມ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ລຸ່ມນີ້ ໂດຍມີການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ປັບປຸງຈາກບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ. ສ່ວນຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ເວບໄຊກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບນົກ ຢູ່ໃນໂລກ. Del Hoyo, Elliott, and Sargatla, eds, 1994. Lynx Edicions.

- ການສຳຫຼວດສັດປ່າ ແລະ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສ ປ ປ ລາວ. Timmins and Evans, 1996. ສູນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳ (ກົມປ່າໄມ້) ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ.
- ແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ເຂດເຊື້ອມຕໍ່ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ: ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດສັດປ່າ. Tobias, 1997. ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ.
- ການສຳຫຼວດສັດປ່າ (ເສົາຫຼາ ຫຼື "Nyu-ja") ຈາກບ້ານຕ່າງໆ ໃນເມືອງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. Souvannalath, 1998. ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ.
- ບົ້ມ ກ່ຽວກັບສັດກິນຊີ້ນ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. Kanchanasakha, Simcharoen and Than, 1998. ໜ່ວຍງານ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນໃກ້ຈະສູນພັນ ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະ ຊາດໂລກ (WWF), ຫ້ອງ ການປະຈຳປະເທດໄທ.
- ບົ້ມຄູ່ມື ທາງດ້ານແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບ ແລະ ສັດເລືອຄານອື່ນໆ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ອາຊີຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້, Cox, van Dijk, Nabhitabhata and Thirakhupt, 1998. Asia Books.
- ບົດສັງລວມ ກ່ຽວກັບເສົາຫຼາ, ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍພືດເປັນຢາ ແລະ ສັດປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ບົດສະເໜີຂະຫຍາຍເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍນ້ຳເທີນ. Robichaud and Stuart, 1999. ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ ແລະ ອົງການ ອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ.
- ບົ້ມສັດປ່າ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ: ບົດລາຍງານ ປີ 1999. Duckworth, Khounbouline and Salter, 1999. ອົງການ IUCN, WCS ແລະ ກົມປ່າໄມ້.
- ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ອາໄສຕາມໜ້າດິນ ຢູ່ໃນໂລກ. Sixth Edition. Nowak, 1999. John's Hopkins University Press.
- ບົ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບນົກ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. Robson, 2000. New Holland.
- ບົ້ມຄູ່ມື ດ້ານແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. Francis, 2001. Asia Books.
- ບົ້ມຄູ່ມື ດ້ານແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບເຕົ້າ ໃນປະເທດໄທ, ສ ປ ປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. Stuart, van Dijk and Hendrie, 2001 WCS, IUCN, the World Bank, Fauna and Flora International, Wetlands International, Traffic Southeast Asia and the Darwin Initiative.

2. ຄວາມສຳຄັນ ໃນການອະນຸລັກຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ

2.1 ປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນ

ເຂດສຳຄັນຂອງປ່າດິບຊຸ່ມຊື່ນ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກວມເອົາ ເຂດລຽບຕາມແນວຊາຍແດນ ເຊັ່ນ ເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ

ລະດູຝົນ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນມາຈາກ ກະແສ ລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຊຶ່ງເລີ່ມຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ. ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບນ້ຳຝົນຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ເປັນລະດູແລ້ງ, ຊຶ່ງ ເນື່ອງມາຈາກ ກະແສລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງ ເໜືອ ໂດຍແມ່ນສາຍພູຫຼວງ ແລະ ສາຍພູອື່ນໆ ຕາມຊາຍແດນ ເປັນສິ່ງກົດ ຂວາງ ກະແສລົມດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ ສ ປ ປ ລາວ. ແຕ່ວ່າໃນເຂດຕ່ຳ ຂອງສາຍ ພູຫຼວງ (500 – 800 ແມັດ) ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຫວຽດ ນາມ ບໍ່ສາມາດບັງກະແສລົມມໍລະສຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດມີ ລົມພັດ ຜ່ານເຂົ້າມາ ສ ປ ປ ລາວ ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ເປັນບໍລິ ເວນຍາວ ຫຼາຍກິ ໂລແມັດ. ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນໄລຍະນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມກົດອາກາດ ຕ່ຳ ແລະ ມີອາກາດໜາວຄື່ມ ແລະ ມີຝົນຕົກ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ປະເທດ ໃນເວລານັ້ນ ມີອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຫ້ອງຟ້າສົດໃສ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ບາງພື້ນທີ່ມີລະດູຝົນແກ່ຍາວ ຮອດ 10 ເດືອນ ຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງມີ ປະລິມານນ້ຳຝົນ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 40 ມິນລິແມັດຕໍ່ເດືອນ (Robichaud & Timmins 2004). ສະນັ້ນອາກາດໃນເຂດບໍລິເວນຊາຍແດນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ໃນເຂດ ດັ່ງກ່າວ

ເປັນປ່າຝົນຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື “ຊຸ່ມຕະຫຼອດ” (Timmins & Evans 1996). ໃນປ່າຝົນຊຸ່ມຊື່ນນີ້ ອາດມີການແຕ່ງກະຈາຍ ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມສະເພາະ ຖິ່ນຊະນິດໃໝ່ ຢູ່ໃນສາຍພູຫຼວງ. ສັດສະເພາະຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງປານກາງ (ລະ ຫວ່າງ 500 - 900 ແມັດ) ໃກ້ກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ບ່ອນທີ່ກະແສລົມມໍ ລະສຸມພັດຜ່ານເຂດປ່າສະຫງວນ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະ ທິບາຍໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ລະ ດັບນ້ຳຝົນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວອາດມີເຖິງ 3.000 ມິນລິແມັດຕໍ່ປີ, ໂດຍມີລະດູ ແລ້ງພຽງ 1-3 ເດືອນ, ອຸນຫະພູມອາກາດຕ່ຳກວ່າເຂດອື່ນໆ ໃນປ່າສະຫງວນ.

ສະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວ ອາດມີຄວາມເໝາະສົມເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງຊະ ນິດສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ເຊັ່ນ ເສົາຫຼາ ແລະ ກະຕ່າຍຂ້າງລາຍສາຍພູຫຼວງ ກໍ່ເປັນໄດ້. ຊະນິດພືດສະເພາະຖິ່ນຄາດວ່າ ຈະມີຫຼາຍ, ປ່າຝົນຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນ ເຂດຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໜ້າດິນທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ບໍ່ສະ ເພາະ ແຕ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມ ສຳຄັນທົ່ວ ສ ປ ປ ລາວ ອີກດ້ວຍ. ເຂດອື່ນຂອງໂລກທີ່ມີປ່າຝົນຊຸ່ມຊື່ນ ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ມັນກໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ ຫຼາຍແລ້ວ ຍ້ອນວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຫຼາຍເກີນໄປ.

ເຂດສຳຄັນຂອງປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ ລຽບຕາມແນວຊາຍ ແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດປ່າສະ ຫງວນ ນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ.

2.2 ປ່າດົງດິບແຫ້ງ/ປ່າດົງດິບປະສົມ

ປ່າປະເພດນີ້ ແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຖິ່ນຢູ່ອາໄສທຳມະຊາດ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ປ່າດັ່ງກ່າວອາດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນທຸກໆເມືອງ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນທາງ ດ້ານຄຸນນະພາບ. ພື້ນທີ່ປ່າດັ່ງກ່າວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ຊຶ່ງອາດຖືວ່າເປັນປ່າດົງດິບແຫ້ງ/ປ່າ ປະສົມຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຍັງມີ ເຫຼືອຢູ່ ໃນພາກພື້ນອິນດູຈີນກໍ່ເປັນໄດ້. ຊະນິດພັນທີ່ສຳຄັນທີ່ມີຊີວິດຂຶ້ນກັບເຂດປ່າດັ່ງ ກ່າວນີ້ ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພາກ ຕໍ່ໄປ ແລະ ບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ ນົກກົກ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດ ມີຊີວິດລອດ ຖ້າປ່າສະຈາກປ່າທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ປະເພດນີ້.

ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງ/ປ່າປະສົມ ແມ່ນຖິ່ນຢູ່ອາໄສທຳມະ ຊາດຕົ້ນຕໍ ຂອງແຂວງບໍລິ ຄຳໄຊ

ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ແມ່ນປ່າໄມ້ເຂດຕ່ຳ. ບ່ອນດັ່ງກ່າວອາດ ເປັນເຂດສຳ ຄັນ ພິເສດສຳລັບບາງຊະນິດພັນ ເຊັ່ນ ຊ້າງປ່າ ແລະ ສັດປ່າຈຳ ພວກມີເຂົ້າ.

2.3 ເຂດພູຫີນປູນ

ພູຫີນປູນ ແມ່ນຖິ່ນຢູ່ອາໄສທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ ຂອງສັດຊະນິດພັນ ທີ່ຫາ ຍາກ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ສັດປ່ານຳນວນໜຶ່ງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບປ່າໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ຕາມພູຫີນ ປູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ສະເພາະຂອງດັ່ງປ່າ ດັ່ງກ່າວ. ພູຫີນອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ (ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ລຽບຕາມສາຍນ້ຳອູ ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ), ແຕ່ມີພຽງພູຫີນປູນຢູ່ແຂວງບໍລິ ຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຖືວ່າຫາ ຍາກລະດັບໂລກ



ສະເພາະນັກພູເຂົາ ວິທະຍາ. ມີບາງຊະນິດສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນີ້
ຫາກໍ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນໂລກ.

ເຂດສາຍພູດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືກຮັບຮູ້ ໃນນາມ "ກຸ່ມພູຫີນປູນພາກກາງ ຂອງອິນ ດູຈິນ", ແລະ
ຖືກພິຈາລະນາຈັດເປັນບູລິມະສິດສິ່ງ ສຳລັບການອະນຸລັກ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ,
ມັນມີຄວາມສຳຄັນ ຈົນວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດລຽບຊາຍ ແດນລາວ-ຫວຽດນາມ
ບໍລິເວນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ປະກາດ ເປັນເຂດ ມໍລະດົກໂລກ
(ເຂດມໍລະດົກໂລກແຫ່ງອື່ນໆ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນເມື່ອ ງຫຼວງພະບາງ ແລະ
ວັດພູຈຳປາສັກ).

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີເຂດພູຫີນປູນ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍແຫ່ງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງ.

2.4 ແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳ

ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ສາຍໜຶ່ງຂອງໂລກ. ມັນເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ມີ ເອກະ
ລັກພິເສດ ດ້ວຍເຫດວ່າ ລະດັບນ້ຳໃນແຕ່ລະລະດູມີການປ່ຽນ ແປງ ຫຼາຍ.
ສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳຂອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສ ປ ປ ລາວ
ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ມີສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍ ສາຍນອນຢູ່
ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊັ່ນ: ນ້ຳກະດິງ, ນ້ຳຊັນ, ນ້ຳງຽບ ແລະ ນ້ຳຍວງ.
ຍ້ອນປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາສາຍນ້ຳຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊມີ ຄວາມ
ສຳຄັນສູງ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊັ່ນ:

ການອະນຸລັກສາຍນ້ຳ
ລ້ວນແຕ່ມີ ປະໂຫຍດ
ແກ່ສັດປ່າທັງໝົດ

- ແມ່ນ້ຳ ແລະ ສາຍນ້ຳ ແມ່ນ ຊີວິດ, ຍ້ອນວ່າສັດທຸກຊະນິດ ແມ່ນຕ້ອງ ການນ້ຳ.
ສັດປ່າ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລ້ວນແຕ່ມີຊີ
ວິດຢູ່ໂດຍຂຶ້ນກັບນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ອາຫານກໍ່ແມ່ນໄດ້ມາ ຈາກນ້ຳທັງນັ້ນ.
- ຍ້ອນວ່າຄົນ ໃຫ້ສາຍນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ:
ເພື່ອການຄົມມະນາຄົມ, ຫາປາ, ລ່າສັດ ແລະ ລ້ຽງຄວາຍ - ບາງຊະນິດພັນ
ທີ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນຍ້ອນຈຸດພິເສດ
ຂອງສາຍນ້ຳ. ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ນົກນ້ຳຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຂ້ ແລະ ແມ່ນອນ ທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນປາ
ຊຶ່ງມີຈຳນວນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນການລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ ຕາມສາຍນ້ຳ.
- ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ມີປາບາງຊະນິດທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍນ້ຳຂອງ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ
ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ແຫ່ງອື່ນໃດອີກ ໃນໂລກ. ປາບາງຊະນິດທີ່ອາ
ໄສຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງສາຍນ້ຳ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຊີວິດຂຶ້ນກັບຍອດນ້ຳເຊັ່ນ ດຽວກັນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອການແຜ່ພັນ.
- ທາດໂປຼເຕອິນ ທີ່ປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ຮັບ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ໄດ້ມາຈາກສາຍນ້ຳ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນດັ່ງກ່າວແລ້ວ
ປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍ່ຈະທຸກຍາກລົງອີກ. ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າວ່າປາ
ໃນແມ່ນ້ຳຫາກຫຼຸດລົງ ຄົນກໍ່ຈະເຂົ້າປ່າລ່າສັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າ
ການອະນຸລັກປາ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັດປ່າທັງໝົດ.

3. ຄວາມສໍາຄັນໃນການອະນຸລັກສັດປ່າ

3.1 ແມ່ນຫຍັງ ເຮັດໃຫ້ຊະນິດສັດປ່າມີຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບການອະນຸລັກ

ພວກເຮົາ ຈະເຮັດແນວໃດ ຕໍ່ກັບຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອອະນຸລັກໄວ້ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ? ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຊະນິດສັດທີ່ເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ອະນຸລັກຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊແລ້ວ ມັນອາດຈະໝົດໄປຈາກ ທົ່ວປະເທດລາວ, ກໍຄືທົ່ວທະວີບອາຊີ ຫຼື ທົ່ວໂລກ ກໍເປັນໄດ້. ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ມີ ນົກ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດລ້ຽງ ລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ປະມານ 21.545 ຊະນິດ, ໃນນີ້ ມີ ນົກ 10.000 ຊະນິດ (<http://www.birdlife.org/action/science/sowb/state/14.html>), ສັດເລືອຄານ 7.870 ຊະນິດ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ 4.675 ຊະນິດ (<http://www.emblheidelberg.de/~uetz/dbinfo/HowManyReptileSpecies.html>).

- ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ມີ ສັດປະເພດນີ້ ປະມານ 1.066 ຊະນິດ, ໃນນີ້ ມີ ນົກ 800 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 166 ຊະນິດ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍ ນ້ຳນົມ 100 ຊະນິດ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ມີຊະນິດພັນສັດປ່າ ເກືອບຮອດ 5 ເປີເຊັນ ຂອງຊະນິດພັນທັງໝົດໃນໂລກ ແລະ ຈຳນວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ນອກນັ້ນ, ບາງຊະນິດ ພັນທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊນີ້ ຍັງຖືວ່າເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງປະຊາກອນ ສັດດັ່ງກ່າວ ຂອງທົ່ວໂລກ. ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າສັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຊະນິດໃດນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນສັດດັ່ງກ່າວທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ສົມທຽບກັບຈຳນວນທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກທັງໝົດ. ບາດກ້າວນີ້ ແມ່ນສິ່ງ ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ສັດບາງຊະນິດ ຊຶ່ງອາດຖືວ່າບໍ່ມີຫຼາຍຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ອາດມີ ຫຼາຍຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນ ກໍເປັນໄດ້ (ເຊັ່ນ: River Lapwing). ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ບາງຊະນິດທີ່ພົບເຫັນເປັນປົກກະຕິ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ອາດເປັນສັດທີ່ຫາຍາກ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ ຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ ຫຼື ໃນທົ່ວໂລກ ກໍເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ: ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ໂຕເສົາຫຼາ ບໍ່ມີຢູ່ໃນທະວີບອາຊີກາກ, ອະເມີລິກາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນ ໂອເອຊີ ແລະ ໃນໂລກ, ແມ້ແຕ່ຢູ່ແຂວງອື່ນໃນ ສ ປ ປ ລາວ ກໍຍັງຫາຍາກ ຫຼື ອາດບໍ່ມີເລີຍ.



- ມີ 2 ປັດໃຈ ທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງ “ຄວາມຫາຍາກ” ຄື: ປັດໃຈ ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງຊະນິດພັນ ແລະ ປັດໃຈທີສອງ ແມ່ນ ຈຳນວນປະ ຊາກອນ ຂອງຊະນິດພັນ. ບາງຊະນິດພັນ ອາດພົບເຫັນຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມ ວ່າມີຢູ່ທົ່ວໄປ (ມີຄວາມໜ້າແທ້ໆດ້ານປະຊາກອນຕໍ່າ), ຊະ ນິດພັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ ຫຼື ໄດ້ຮັບ ໄພຂົ່ມຂູ່. ຕົວ ຢ່າງ: ນົກກີກ. ບາງຊະນິດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ແຕ່ ໃນບໍລິເວນນ້ອຍ ແຕ່ກໍຍັງມີ ຫຼາຍ (ມີຄວາມໜ້າແທ້ໆດ້ານ ປະຊາກອນຂ້ອນຂ້າງສູງ), ເຊັ່ນ ໂຕຂາແດງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບາງຊະນິດ ພັນສັດ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ທັງມີຄວາມໜ້າແທ້ໆຂອງ ປະຊາກອນຕໍ່າ. ສັດຊະນິດນີ້ ແມ່ນຖືວ່າຫາ ຍາກ ຫຼື ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ : ໂຕເສົາຫຼາ.

ມີຢູ່ຫຼາຍປັດໃຈ ທີ່ເປັນຕົວຊີ້ ບອກ ເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການອະ ນຸລັກ, ໃນນັ້ນ ລວມມີຄື: ຄວາມ ຫາຍາກ, ແນວໂນ້ມດ້ານຈຳ ນວນປະຊາ ກອນ, ຄວາມສໍາ ຄັນຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີ ຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າ ມະນຸດ ຢາກອະນຸລັກຊະນິດພັນນັ້ນ.

ອີງໃສ່ ປັດໃຈຕ່າງໆຂ້າງເທິງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຈັດແບ່ງບຸລິມະສິດ ໃນການອະນຸລັກອອກເປັນ 4 ປະເພດລວມ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

	ຖິ່ນຢູ່ອາໄສນ້ອຍ	ຖິ່ນຢູ່ອາໄສກວ້າງ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕ່ຳ	ເປັນຊະນິດທີ່ມີບຸລິມະສິດສູງ	ເປັນຊະນິດທີ່ມີບຸລິມະສິດປານກາງ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນສູງ	ເປັນຊະນິດທີ່ມີບຸລິມະສິດປານກາງ	ເປັນຊະນິດທີ່ມີບຸລິມະສິດຕ່ຳ

ໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈບິນພື້ນຖານຄວາມຫຍາກພາບນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ວ່າ ຊະນິດພັນໃດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ, ບຸລິມະສິດທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແມ່ນຈຳພວກທີ່ມີປະຊາກອນຕ່ຳ ແລະ ມີຖິ່ນ ຢູ່ອາໄສນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ ບຸລິມະສິດຕ່ຳທີ່ສຸດ ແມ່ນຈຳພວກທີ່ມີປະຊາກອນສູງ ແລະ ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສກວ້າງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຢາກກຳນົດໄດ້ວ່າ ຊະນິດພັນໃດຈະຕົກຢູ່ໃນຫ້ອງໃດ (ບຸລິມະສິດໃດ) ນັ້ນ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງຊະນິດພັນນັ້ນ ທັງຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ ນອກຈາກແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

ນອກຈາກຄວາມຫຍາກພາບແລ້ວ, ການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນອີກດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນ “ທ່າອ່ຽງ” ທາງດ້ານປະຊາກອນ ຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດ. ເຊັ່ນວ່າ: ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນນັ້ນຫຼຸດລົງ, ຄົງຕົວ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄືແນວໃດ ? ຂໍ ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ ຊະນິດພັນໃດແທ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຜົນຂອງການສຳຫຼວດຫາກພົບເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ປະຊາກອນຊ້າງຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີ 50 ໂຕ (ນີ້ແມ່ນພຽງຕົວເລກຍົກມາເປັນຕົວຢ່າງ, ຕົວຈິງແລ້ວຍັງບໍ່ທັນມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຊ້າງທີ່ ມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ແຕ່ມັນມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກ ຈຳນວນຊ້າງທັງໝົດໃນແຂວງນີ້ ໃນ 10 ປີ ຜ່ານມາ ຫາກມີເຖິງ 200 ໂຕ ຫຼື ພຽງ 40 ໂຕ.

ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຄິດ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ລະດັບຄວາມຫຍາກພາບໃນ ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດເຖິງທ່າ ອ່ຽງຂອງຊະນິດພັນນັ້ນຕື່ມອີກ.

ຖ້າຫາກວ່າ ຜ່ານມາມັນຫາກມີຮອດ 200 ໂຕ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຈຳນວນທີ່ມີໃນ ປັດຈຸບັນ 50 ໂຕນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາກອນຂຽບຊ້າງໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຫຼຸດລົງ ຢ່າງໜ້າວິຕົກ (ໄວຜົກປົກກະຕິ) ແລະ ຖືວ່າຊະນິດພັນນີ້ຕົກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່ ຈະສູນພັນສູງ. ແຕ່ຖ້າໃນທີ່ຜ່ານມາ ມັນຫາກມີພຽງແຕ່ 40 ໂຕ ກໍສະແດງວ່າ ປະຊາກອນຊ້າງເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຄົງຕົວຢູ່ ແລະ ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃນ ໃສ່ ໃນການອະນຸລັກຢ່າງຮີບດ່ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຄິດ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ລະດັບຄວາມຫຍາກພາບໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດເຖິງທ່າອ່ຽງຂອງ ຊະນິດພັນນັ້ນຕື່ມອີກ.

ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ຄຳວ່າ “ຊະນິດພັນຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກ” ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່າວມານີ້. ໃນປີ 1999, ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຈາກອົງການສາກົນ –ໄດ້ ຈັດພິມ ປຶ້ມກ່ຽວກັບສະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ອອກ ຄື: ບົດລາຍງານ “ສັດປ່າ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ” (Wildlife in Lao PDR: 1999 Status Report). ໃນພາກຕໍ່ລົງໄປນີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາ ບັນດາຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ຊະນິດພັນຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການອະນຸລັກ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຊະນິດພັນສັດປ່າດັ່ງກ່າວ ລ້ວນແຕ່ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມພະຍາ ຍາມ ເອົາໃຈໃສ່ສຳລັບການອະນຸລັກ. ຖ້າບໍ່ສາມາດອະນຸລັກສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ທັງໝົດ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຢ່າງນ້ອຍກໍຄວນ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີ ຂອງພວກມັນໄວ້.

ສັດແຕ່ລະຊະນິດ ມີຊື່ ເປັນ 3 ພາສາ ຄື: ຊື່ພາສາລາວ, ຊື່ພາສາອັງກິດ ແລະ ຊື່ວິທະຍາສາດ. ຊື່ວິທະຍາສາດ ແມ່ນໃສ່ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການ ຂອງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ ດ້ານສັດ ແລະ ພືດ. ສ່ວນຊື່ພາສາລາວ ແລະ ຊື່ພາສາອັງກິດ ແມ່ນ ຊື່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ສຳລັບນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.

ຄຳນິຍາມ ຂອງຊະນິດພັນຫຼັກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ມີດັ່ງນີ້:

ຄຳນິຍາມ ຕາມອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ, IUCN, (2001):

ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ Critically Endangered (CR): “..ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຈະສູນພັນຈາກທຳມະຊາດ”

ໃກ້ຈະສູນພັນ Endangered (EN): “ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະສູນພັນຈາກທຳມະຊາດ”.

ມີທ່າອ່ຽງຈະສູນພັນ Vulnerable (VU): “ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະສູນພັນ”.

ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ Near Threatened (NT): “ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດວ່າ ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີທ່າອ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ, ແຕ່ ກໍຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຈະຈັດໃນປະເພດດັ່ງກ່າວ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້”.

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ Data Deficient (DD): “ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະປະເມີນໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການສູນພັນ ໂດຍອີງຕາມສະຖານະພາບ ດ້ານການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ປະຊາກອນ ຂອງຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ.”

ທ່ານ ດັກເວີດ, Duckworth et al. (1999):

ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນລາວ At Risk in Lao (ARL): ມາດຕະຖານນີ້ ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບ ທັງ 3 ປະເພດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ ຂອງ IUCN (1996), ລວມເຂົ້າກັນທັງໝົດ (ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ).

ສາມາດມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ Potentially At Risk in Lao (PARL): ມາດຕະຖານນີ້ ລວມເອົາຊະນິດພັນ (a) ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ ແຕ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດພັນ ບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະກຳນົດເຂົ້າໃນປະເພດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ, ແລະ

(b) ຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ.

ຮູ້ຈັກໜ້ອຍໃນລາວ Little Known in Lao (LKL): ມາດຕະຖານນີ້ ຈັດໄວ້ສຳລັບຊະນິດພັນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງການອະນຸລັກ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມີບັນຫາໃນການພິສູດ ຫຼື ກຳນົດ, ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ ຊຶ່ງເປັນເຂດແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນ ແລະ ສະພາບຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຊະນິດພັນບໍ່ຈະແຈ້ງ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນປັດຈຸບັນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄາຂອງສິນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (CITES).

ຊະນິດພັນທີ່ບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີ CITES ມີຄື: ບັນຊີ I (CA I, ຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ສູງທີ່ສຸດ ຕໍ່ການສູນພັນ) ຫຼື ບັນຊີ II (CA II, ຊະນິດພັນທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ສູງສູນພັນ ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ກໍອາດກ້າວໄປສູ່ການສູນພັນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຄວບຄຸມທາງການຄ້າ). ບັນຊີດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຢູ່ໃນບົດລາຍງານນີ້ ໃນຕາຕະລາງທີ 1. ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 1 ສຳລັບຮູ້ຈັດຊະນິດພັນທີ່ສຳຄັນຢູ່ນອກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຫຼື ຢູ່ທົ່ວ ສ ປ ປ ລາວ.

ນອກຈາກປັດໃຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ກໍຍັງມີອີກ 2 ປັດໃຈທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍມີສ່ນປະກອບໃນການກຳນົດບຸລິມະສິດໃນການອະນຸລັດເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊັ່ນ: i) ຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມ

ໃນປັດຈຸບັນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄາຂອງສິນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (CITES)

ສຳຄັນ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ii) ຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະຄົນຕ້ອງການອະນຸລັກມັນ. ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໝາຍເຖິງ ຊະນິດພັນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອໃຫ້ຊະນິດພັນອື່ນມີຊີວິດຢູ່ລອດ ຢູ່ໃນທົ່ວເຂດຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ໂດຍອາໄສສະພາບແວດລ້ອມອັນດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ, ເສືອໂຄ່ງບໍ່ສາມາດມີຊີວິດລອດ ໂດຍປາສະຈາກ ກວາງ ຫຼື ຟານ, ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ແມ່ນຢ່າງອະນຸລັກກວາງ ຫຼື ຟານ, ແຕ່ກໍຕ້ອງຈຳເປັນໄດ້ອະນຸລັກເພື່ອເປັນອາຫານ ໃຫ້ແກ່ເສືອໂຄ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນົກກົກ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອກະຈາຍແກ່ນໄມ້ (ດ້ວນການກິນໝາກໄມ້), ດັ່ງນັ້ນ ການອະນຸລັກນົກກົກ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຍາວ.

ສິ່ງໜຶ່ງອີກ, ພວກເຮົາອາດເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການອະນຸລັກຊະນິດພັນໃດໜຶ່ງ ຫຼາຍກວ່າຊະນິດພັນອື່ນ ເພາະມັນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ພວກເຮົາເອງ ເຊັ່ນມະນຸດ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ປາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ. ຊ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນຸລັກ ເພາະອາດແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານວັດທະນາທຳປະເພນີ ສຳລັບປະຊາຊົນລາວ.

3.2 ສັດເລືອຄານ

ສະຖານະພາບຂອງສັດເລືອຄານ (ແລະ ສັດເຄິ່ງປົກເຄິ່ງນ້ຳ) ຖືວ່າເປັນສັດທີ່ຮູ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຈຳນວນສັດປ່າທັງໝົດຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ສັດຈຳພວກດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດຈຳ ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເພາະສະນັ້ນ ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຊະນິດສັດເລືອຄານທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ປະເພດເຕົ້າ

ເຕົ້າເນສັດປ່າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີການຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ໃນແຕ່ລະປີມີການຄ້າຂາຍເປັນລ້ານໂຕນ. ເຕົ້າແຕ່ລະຊະນິດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່.

ເຕົ້າທຸກຊະນິດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ສູງ ຈາກການຄ້າຂາຍ. ຜ່ານມາໄດ້ມີການປະເມີນວ່າ, ໃນແຕ່ລະປີ ປະເທດຈີນໄດ້ນຳເຂົ້າເຕົ້າຈາກທຳມະຊາດ ປະມານ ສິນພັນໂຕນ. ເຕົ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ຖ້າຫາກມີການສືບຕໍ່ຄ້າຂາຍລັກສະນະນີ້ ເຕົ້າທຳມະຊາດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ກໍຈະໝົດໄປໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້.

ເມື່ອຊ້ຳຊາແລ້ວ, ເຕົ້າສາມາດມາດຕິຖືວ່າເປັນຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ລາຄາຂອງເຕົ້າຄຳ ກິໂລໜຶ່ງ ອາດສູງກວ່າ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການອະນຸລັກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ແບບຍືນຍານຕໍ່ຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມທ້າທາຍສູງທີ່ສຸດ. ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດເລືອຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແລ ຖັດລົງໄປກໍໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດປ່າທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ຢູ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ຄຳໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຄວນໄດ້ຄຳນຶງວ່າ, ຍ້ອນເຕົ້າທຸກຊະນິດໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກການຄ້າຂາຍ ສະນັ້ນເຕົ້າທຸກຊະນິດໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຊະນິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ.

1. ເຕົ່າກຸຍ (ເຕົ່າຫົວໃຫຍ່) *Platysternon megacephalum*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຕົ່າຊະນິດນີ້ ສ່ວຍໃຫຍ່ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຂດພູດອຍ ທົ່ວ ສ ປ ປ ລາວ. ມັນອາໄສຢູ່ ໃກ້ກັບຫ້ວຍນ້ຳທີ່ມີຫີນ. ຫົວຂອງມັນໃຫຍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ ຮູບສາມຫຼ່ຽມ ຊຶ່ງອາດໃຫຍ່ເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂະໜາດອາໄສຂອງມັນເອງ. ອາໄສຂອງມັນມີລັກສະນະເປັນສີເຫຼືອງ ຈົນເກືອບກາຍເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ, ສ່ວນຫຼັງຂອງມັນບາງຄັ້ງຈົນກາຍເປັນສີໝີ່ນ, ແຕ່ພື້ນທ້ອງຂອງມັນແມ່ນຍັງ ຮັກສາເປັນສີເຫຼືອງປົກກະຕິ. ໃນເວລາກາງເວັນມັນອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ, ສ່ວນ ກາງຄືນແມ່ນຂຶ້ນຫາກິນອາຫານເຊັ່ນ: ປູ, ຫອຍ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນ ຢູ່ຕາມ ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ລີ້ຕາມປ່າໄກ້ຫ້ວຍນ້ຳ. ລັກສະນະພິເສດຂອງເຕົ່າຊະນິດນີ້ ແມ່ນມັນບໍ່ສາມາດຫູບຫົວຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນອອງໄດ້. ມັນມີຫາງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ໄດ້. ໄຂ່ຂອງມັນເປັນສີຂາວ ຊຶ່ງຈະອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະ 1 ຫຼື 2 ໜ່ວຍ.



<http://www.unc.edu/~dtkirkpa/stuff/bigheads.html>

<http://www.unc.edu/~dtkirkpa/stuff/bighead2.html>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (EN);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ຍ້ອນວ່າມັນອອກໄຂ່ຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສພິເສດນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຕົ່າ ກຸຍ ຫຼື ປູລູ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ນອກນີ້, ມັນຍັງເປັນສັດຊະນິດທີ່ເປັນ ການຄ້າ ແລະ ເຫັນຢູ່ໃນຄອບຄອງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ. ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບເຕົ່າຊະນິດອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈະສູນພັນຍ້ອນການຄ້າ ຫຼາຍກວ່າການສູນເສຍ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ່າຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໄດ້ມີການບັນທຶກ ກ່ຽວກັບການພົບ ເຫັນ ຢູ່ບ້ານນາແປ, ຢູ່ລ້ອງນ້ຳຍວງ ແລະ ເຂດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທິນ, ນອກຈາກນີ້ມີລາຍ ງານວ່າ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ກໍຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່.

*2. ເຕົ້າຮັບເຜິ້ງ (*Cuora galbinifrons*)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ສ່ວຍໃຫຍ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມສາຍພູ ແລະ ຕົນພູ ຂອງສາຍພູຫຼວງ ທັງໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ນອກນີ້ກໍມີຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ. ໂຕຂອງມັນມີສີແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງອາດມີທັງສີດຳ ສີເຫຼອງ ແລະ ສີນ້ຳຕານ, ແຕ່ພື້ນທ້ອງຂອງມັນແມ່ນມີສີດຳ ແລະ ສີເຫຼອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕົ້າຮັບ ທົ່ວໄປ, ມັນສາມາດຫຼຸບຫົວເຂົ້າໄປຊ້ອນໄວ້ໃນອອງຂອງມັນໄດ້. ໂດຍທຳມະ ຊາດຂອງເຕົ້າຮັບທົ່ວໄປແມ່ນອອກໄຂ່ ແລະ ລູກບໍ່ຫຼາຍ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ມີປະ ຊາກອນຫຼາຍພໍທີ່ຈະສາມາດຫາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ແມ່ນເຕົ້າປ່າ ບໍ່ອາໄສຢູ່ນ້ຳ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ ແລະ ຫາກິນສັດນ້ອຍ ຈຳພວກຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ແມງໄມ້ ເປັນອາຫານ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທສຸດ (CR);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ມັນເປັນເຕົ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ ແລະ ນອນໃນຈຳນວນເຕົ້າ 10 ຊະນິດ ທີ່ມີການຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນອົງກົງ ແລະ ຈີນ. ນາຍພານ ນຳໃຊ້ ໝາເປັນເຄື່ອງມືຊອກຄົ້ນຫາ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ການສູນພັນທີ່ສຸດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າມີໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການສູນພັນທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າ ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຖິ່ນແຕ່ກະຈາຍນ້ອຍຢູ່ໃນໂລກ.

ການແຕ່ງກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ອາດມີຢູ່ສະເພາະ ແຕ່ໃນປ່າໄມ້ທີ່ລົມບູນຕາມສາຍພູຫຼວງ. ມີລາຍ ງານການພົບເຫັນ ຈາກເຂດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈາດນ້ຳປ່ັນ.

*3. ເຕົ້າຄຳ (*Cuora trifasciata*)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຄວາມຫຍາກຫຼາຍ ຈົນບໍ່ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ເລີຍໃນເວລາ ດຳເນີນການສຳຫຼວດສັດປ່າ, ແຕ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລາຍງານວ່າຍັງມີ ຢູ່ຕາມສາຍພູຫຼວງ, ນອກນັ້ນກໍຍັງມີລາຍງານວ່າຍັງມີຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ. ໂຕຂອງມັນມີສີດຳແກມສີແສດ (ສີ ໝາກກຸ້ງ) ແລ້ວ ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, ເທິງຫົວຂອງມັນເປັນ

ສີໝາກກຽງເລື້ອມ ແລະ ເປັນສີໝາກກຽງແກມດຳຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. ມັນບໍ່ຄືກັບປະເພດເຕົ້າຖັບອິນໂດຈິນ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ກຽງກັບຫ້ວຍນ້ຳ (ປ່ອນທີ່ມັນສາມາດຫາກິນພືດ ແລະ ສັດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ຂຽດ and carrion). ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຫາກຫຼຸດລົງ ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງມັນກໍອາດຫຼຸດລົງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ການຫາໄດ້ ງ່າຍກວ່າ. ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ວາງໄຂ່ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພຶດສະພາ ແລະ ອອກໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 5 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ (CR);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ເມື່ອເບິ່ງເຖິງສະຖານະພາບການມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນທັນວ່າ, ເປັນເຕົ້າຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຊະນິດ ທີ່ມີການຄ້າຂາຍຫຼາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນນີ້, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງນອນໃນຈຳນວນຊະນິດ 10 ຊະນິດ ທີ່ມີການຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຮົງກົງ ແລະ ຈີນ. ລາຄາຂອງມັນ ປະມານ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ 1 ກິໂລ (ໃນຕະຫຼາດປະເທດຈີນ ຊຶ່ງຖືວ່າເລືອດຂອງມັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງ). ຍ້ອນລາຄາຂອງ ມັນແພງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ສູນພັນໄປຈາກ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການຫາແບບຊະຊາຍ. ຍ້ອນວ່າ ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຖິ່ນແຜ່ກະຈາຍນ້ອຍ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນພັນສູງຢູ່ໃນໂລກ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ເປັນຊະນິດຫາຍາກຫຼາຍ

ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີການບັນທຶກກ່ຽວກັບການພົບເຫັນຈາກການສຳຫຼວດສັດປ່າ, ມີພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ. ໂດຍອີງໃສ່ການລາຍງານນັ້ນ, ຈຶ່ງສັນນິຖານວ່າມັນອາດຍັງມີຢູ່ໃນເຂດນ້ຳ ຈາດ-ນ້ຳປັ້ນ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນເຂດນ້ຳຈວນ.

*4. ເຕົ້າສາມຫຼ່ຽມກົງ (*Pyxidea mouhotii*)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີເຂດແຜ່ກະຈາຍນ້ອຍ ຊຶ່ງພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ໃນບາງພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ມັນເປັນເຕົ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ອອກຂອງມັນມີ ຄວາມ ສູງເຖິງ 19 ຊັງຕີແມັດ. ໂຕຂອງມັນເປັນສີໝີນແກ່ເກືອບເປັນສີແດງ. ບໍລິເວນເຂດຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ມີລັກສະນະເປັນປ່າໃນເຂດພູຫີນປູນ. ເປັນ ສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ອາຫານຂອງມັນມີຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ມັນ ມັກກິນປະເພດຫອຍທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ.



ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);
ເຊັ່ນດຽວກັບເຕົ້າງບຸຊະນິດອື່ນໆ, ມັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຄ້າ-ຂາຍ. ມັນມີເຂດຖິ່ນ
ຢູ່ອາໄສສະເພາະ, ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີປະຊາກອນຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍໃນທຳມະຊາດ ແລະ
ຍ້ອນແນວນັ້ນມັນຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນພັນ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຈາກ 2 ແຫຼ່ງ: ບ່ອນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບ່ອນທີສອງແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

5. ເຕົ້ານ້ຳ *Cyclemys sp.*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຕົ້າຂະນິດນີ້ ມີເຂດແຜ່ກະຈາຍນ້ອຍ ຊຶ່ງພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທົດຕາເວັນອອກ ສ່ຽງເໜືອ
ຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ໃນບາງພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ມັນເປັນເຕົ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ອອງຂອງມັນມີ ຄວາມສູງເຖິງ 19 ຊັງຕີແມັດ.
ໂຕຂອງມັນເປັນສີໝີ່ແກ່ເກືອບເປັນສີແດງ. ບໍລິເວນເຂດຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ມີລັກສະ
ນະເປັນປ່າໃນເຂດພູຫີນປູນ. ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ອາຫານຂອງມັນມີຫຼາຍ ຢ່າງ
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ມັກກິນປະເພດຫອຍທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ.

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);
ເຊັ່ນດຽວກັບເຕົ້າງບຸຊະນິດອື່ນໆ, ມັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຄ້າ-ຂາຍ. ມັນມີເຂດຖິ່ນ
ຢູ່ອາໄສສະເພາະ, ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີປະຊາກອນຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍໃນທຳມະຊາດ ແລະ
ຍ້ອນແນວນັ້ນມັນຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນພັນ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຈາກ 2 ແຫຼ່ງ: ບ່ອນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບ່ອນທີສອງແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.



ຢູ່ພາກພື້ນນີ້ ມີເຕົ້ານ້ຳ ມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍບໍ່ສາ
ມາດກຳນົດຂອບເຂດການແຜ່ກະຈາຍສະເພາະຂອງແຕ່ລະຊະນິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງມັນໄວ້ໃນປື້ມຫນ້າ. ເຕົ້ານ້ຳມີຢູ່ໃນ
ພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໃນນີ້ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຕົ້າ
ເຫຼົ່ານີ້ ມີສີນ້ຳຕານແກ່, ຫົວຂອງມັນເປັນສີນ້ຳຕານແດງ ຫຼື ເຂັ້ມ, ສ່ວນລຳໂຕ
ຈະມີສີແຕກຕ່າງກັນ ແລະມີຄວາມຍາວ ເຖິງ 22 ຊັງຕີແມັດ. ເຕົ້າເຫຼົ່ານີ້

ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ, ຊຶ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນເວລາແດດອອກ ຕາມຫ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ແມ່ນ້ຳ
ມທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງປານກາງ ຫຼື ລະດັບຕ່ຳ. ມັນກິນພືດ, ໝາກໄມ້ ແລະ
ສັດບໍ່ມີກະດູກ ຢູ່ໃນນ້ຳ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ເຕົ້ານ້ຳ ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ທາງດ້ານການນຳມາເປັນອາຫານ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງ ຈາກປາຝາອອງ ຫຼື
ເຕົ້າຖັບທີ່ນຳໄປຂາຍເພື່ອເຮັດຢາພື້ນເມືອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມ ມັນກໍຍັງມີທ່າອ່ຽງຖືກລ່າ ແລະ
ຂາຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ມັນກໍຍັງສູນ ເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສທຳມະຊາດ (ຈາກການຕັ້ງເຄື່ອນໄຟຟ້າ)
ກໍອາດເປັນໄປໄດ້.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້ານ້ຳມີແຜ່ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕາມສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຊ້າ ແລະ ໃນຫ້ວຍນ້ຳ ຫຼື
ແມ່ນ້ຳເຂດທົ່ງພຽງ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ,
ນອກນັ້ນກໍຍັງເຫັນມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຫຼັກ 20 ເມືອງຄຳເກີດ.

6. ເຕົ້າຫວາຍ *Heosemys grandis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຕົ້າຂະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດອິນໂດຈີນ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ມັນຈັດຢູ່ໃນປະເພດເຕົ້ານ້ຳ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດສູງປານກາງ

ທີ່ມັນສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຫ້ວຍ, ໜອງ ແລະ ເຂດປ່າປະສົມ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ

ມັນອາໄສເທິງໜ້າດິນ ໂດຍລີ້ຊ່ອນຢູ່ຕາມພູມໄມ້. ອອງຂອງມັນເປັນແຜນດຽວກັນເລີຍ ແລະ

ມີລັກສະນະເປັນໂນນຄົມຂຶ້ນໄປຫາສັນຫຼັງ. ເຕົ້າຂະນິດນີ້ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 48 ຊັງຕີແມັດ.

ມັນມີສີນ້ຳໝາກກຽງແກມດ້ວຍເມັດຈຸດສີດຳ, ສ່ວນພື້ນທ້ອງເປັນສີເຫຼືອງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນສີດຳ

ແລະ ສີນເບື້ອງໜ້າ ແລະ ເບື້ອງຫຼັງ ຂອງພື້ນທ້ອງ ມີລັກສະນະແຫຼມເປັນເດືອຍ ເຕົ້າຂະນິດນີ້

ເປັນສັດກິນອາຫານທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ພືດ, ໝາກໄມ້ ແລະ ສັດນ້ອຍຂະນິດຕ່າງໆ.

ເຕົ້າໂຕແມ່ນອອກໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 5 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ເຊັ່ນດຽວກັບເຕົ້າທີ່ມີອອງແຂງຂະນິດອື່ນໆ ມັນຖືກລ່າ ແລະ ຄ້າຂາຍ ເພື່ອເປັນຢາຈີນ,

ເປັນອາຫານ ແລະ ການບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ. ເຕົ້າຂະນິດນີ້ ແລະ ປາຝາຂະນິດຕ່າງໆ

ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ການ ຄ້າ-ຂາຍ,

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນຫຼຸດລົງ ຢ່າງໜ້າວິຕົກ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີບັນທຶກໃດໆເທື່ອ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄາດວ່າຄົງຈະມີຢູ່ໃນເຂດຕ່ຳ ແລະ ສູງປານກາງ. ຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ຮັບການບັນທຶກຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.

7. ເຕົ້າສາມສູນ *Malayemys subtrijuga*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ເຕົ້າຊະນິດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນ, ປະເທດໄທ ແລະ ບາງພາກຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ. ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕ່ຳ ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີຫຍ້າຕົບໜາ (ຮິກເຮື້ອ) ທີ່ມີຄວາມໄຫຼຊ້າໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໜອງ, ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ທົ່ງນານ້ຳຖ້ວມ. ຫົວຂອງມັນ ມີແຊກສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ, ສ່ວນລຳໂຕເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ (ໝົນ) ຊຶ່ງມີແຖບສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ ຢູ່ຕາມຂ້າງ. ອອກຂອງມັນມີຄວາມຍາວເຖິງ 21 ຊັງຕີແມັດ. ມັນເປັນສັດກິນຊີ້ນ, ອາຫານຂອງມັນແມ່ນຫອຍ, ກຸ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະ ສູນພັນ (ARL);

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ຖືກຄ້າ-ຂາຍ ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຢາຈີນ, ບາງຄັ້ງກໍເຫັນມາຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ລະດັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຄ້າ-ຂາຍ ຊະນິດພັນນີ້ ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ກໍສັນນິຖານວ່າ ອາດຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຄືກັນກັບເຕົ້າຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ມີອອງແຂງ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີແຜ່ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປໃນປະເທດລາວ.

ຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນມີບັນທຶກວ່າພົບເຫັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຕ່ມັນໜ້າຈະມີເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ເຄີຍຖືກພົບເຫັນ ທັງຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ..

8. ເຕົ້າຫົວສີຕາ *Sacalia quadriocellata*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ເຕົ້າທີ່ຫາຍາກ ໃກ້ຈະສູນພັນຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກທິດຕາເວັນອອກຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ເທົ່ານັ້ນ. ເຕົ້າຊະນິດດັ່ງກ່າວນີ້ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ ແລະ ເຂດພູ, ເປັນເຕົ້າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ກິນພືດ, ໝາກໄມ້ ແລະ ສັດນ້ອຍເປັນອາຫານ. ມັນສາມາດປົນຂຶ້ນກິນໄປໄດ້. ມັນມີ ຈຸດສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂຽວແຈ້ງ 2 ຫຼື 4 ຈຸດ ຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ ມີແຖບສີ ເຫຼືອງເຂັ້ມ ເສັ້ນ ຢູ່ຂ້າງຄໍເບື້ອງເທິງ. ອອກຂອງມັນຕ່ຳ ແລະ ກົມ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ. ເຕົ້າໂຕແມ່ ອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະ 2 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ turtles p. 42

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (VU);

ມີການຄ້າ-ຂາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕົ້າຊະນິດພັນອື່ນໆ, ມີເຂດແຜ່ກະຈາຍນ້ອຍ ແລະ ຍ້ອນວ່າຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນຈຳກັດ ຈຶ່ງມີທ່າອ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ກໍພົບເຫັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເຊັ່ນກັນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ ແລະ ນ້ຳຈວນ.

*9. ເຕົ້າເພັດ *Indotestudo elongata*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕັ້ງແຕ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດເນປານ ລົງມາທາງໃຕ້ຈົນຮອດປະເທດມາເລເຊຍ. ມັນເປັນເຕົ້າທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ຕາມປ່າໂຄກຫ່າງ ແລະ ແຫ້ງ. ມັນມີຊີວິດຕາມລັກສະນະພັນຂອງມັນ ຄືເປັນເຕົ້າທີ່ມີອາຍຸຍາວ ແລະ ແຄບ. ອາຍຸຂອງມັນມີສີໝົ້ນແກມດຳ ຫຼື ເປັນສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ເກືອນເປັນສີນ້ຳຕານໃໝ່ ແລະ



ມີສີດຳເປັນຈຸດໃຫຍ່ຢູ່ຕາມແຄມອອງແຕ່ລະຂ້າງ, ລຳໂຕໃຫຍ່ເຖິງ 36 ຊັງຕີແມັດ. ຫົວຂອງມັນເປັນສີເຫຼືອງເຂັ້ມ. ອາຫານຂອງມັນແມ່ນ ໝາກໄມ້, ຫຍ້າ ແລະ ເຫັດ, ເວລາຍັງນ້ອຍມັນອາໄສກິນຂີ້ກະເດືອນເປັນອາຫານ. ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຕົ້າຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເນີນສູງປານກາງ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (EN);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ຍ້ອນວ່າມັນອາໄສຢູ່ໃນປ່າໂຄກຫ່າງ ຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃຫ້ຫາໄດ້ງ່າຍ.

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ

ສ່ວນໜຶ່ງກໍນຳມາຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ກ້ວຍເຫດນັ້ນ

ຈຶ່ງເຫັນວ່າຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນອາດຈະຫຼຸດລົງ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ກໍຕ້ອງມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການດຳເນີນການສຳຫຼວດເຕົ້າໂດຍລວມ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນມີການບັນທຶກໃດໆທີ່ອ. ເຖິງໃດກໍຕາມ ໃນເວລາດຳເນີນການສຳຫຼວດຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີບັນທຶກວ່າໄດ້ພົບເຫັນເຕົ້າຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.

*10. ເຕົ້າເດືອຍ *Manouria impressa*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພູຊອງພາກພື້ນອິນໂດຈີນ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ມາເລເຊຍ, ເຕົ້າທີ່ອາໄສຢູ່ໜ້າດິນນີ້ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າດົງດິບ ທີ່ມີ ຄວາມສູງ 800 ແມັດຈາກລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງຂຶ້ນໄປ. ມັນມີອາຍຸແປ ເປັນ ສີເທົາເຂັ້ມ ແລະ ດຳ, ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວເຖິງ 31 ຊັງຕີແມັດ. ຂາຂອງມັນເປັນລັກ ສະນະກົມ, ສ່ວນຕີນເປັນແຜນລວມກັນບໍ່ມີນິ້ວ ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບຕີນຂ້າງ ແລະ ມີເກັດໃຫຍ່ໜຶ່ງອັນຢູ່ກົກຂາ, ເຕົ້າຊະນິດນີ້ກິນພືດເປັນອາຫານ ເຊັ່ນ : ເຫັດ, ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (EN);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ຖືກລ່າ ເພື່ອເປັນອາຫານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົ່ງຂາຍຕາມຕະຫຼາດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນອາດຈະຫຼຸດລົງ. ໃນຊຸມທ້າຍປີ ຂອງທົດສະວັດທີ່ເກົ່າສິບ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຂາຍເຕົ້າຊະນິດນີ້ ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຕ່າງຊາດ ໃນລາຄາໂຕລະປະມານ 0,38 ຫາ 0,50 ໂດລາສະຫະລັດ.

ການແຕ່ງກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຕົ້າຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ ເໜືອສຸດ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ) ຈົນຮອດໃຕ້ສຸດ (ແຂວງອັດຕະປື) ແລະ ແນ່ນອນກໍອາດມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ກໍບໍ່ທັນມີການບັນທຶກໃດໆ ຍ້ອນຂາດການສຳຫຼວດ.

11. ປາຝາອາຊີ *Amyda cartilaginea*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ປາຝາອາຊີຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ ທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໜອງບຶງໃນທົ່ງພຽງຈົນຮອດຫວນນ້ຳຢູ່ເຂດພູ. ມັນມີອາຍຸທີ່ມີຄວາມຍາວເຖິງ 83 ຊັງຕີແມັດ, ອອກຂອງມັນເປັນສີມື່ນ ຫຼື ສີນ້ຳຕານ ແກມດ້ວຍຈຸດສີເຫຼືອງ ແລະ ດຳ ຢູ່ທົ່ວອອກ, ຕາມສັນຫຼັງມີວົງເມັດເປັນຈຸດໆ. ໃນເວລາຍັງນ້ອຍ ຈະມີຈຸເມັດສີເຫຼືອງຫຼາຍ. ມັນກິນອາຫານທົ່ວໄປ, ລວມທັງສັດນ້ຳທັງໝົດທີ່ມັນສາມາດກິນໄດ້, ແມງໄມ້, ໝາກໄມ້ ແລະ ແກ່ນໄມ້. ປາຝາໂຕແມ່ນ ອອກໄຂ່ຄັ້ງລະ 3 ຫາ 4 ຮັງ ຊຶ່ງມີຈຳນວນປະມານ 5 ຫາ 30 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (VU);

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ປາຝາອາຊີໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ສູງ ຈາກການລ່າເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ ການຄ້າ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);
ສັດເລືອຄານຊະນິດນີ້ ຖືກລ່າ ແລະ ຄ້າ-ຂາຍ ເພື່ອເປັນອາຫານ, ການລ່າແມ່ນໃຊ້ໝາໄລ່.

ການແຕ່ງຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາໄດ້ມີການປັບທຶກ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນຢູ່ທີ່ໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ
ແລະກໍໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບແຂວງຄຳມ່ວນ
ຊຶ່ງຜ່ານມາແມ່ນຍັງມີຫຼາຍຢູ່ໃນບາງບ່ອນ, ສະນັ້ນ
ຈຶ່ງຄາດວ່າອາດມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ເໝາະສົມໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍເປັນໄດ້.

*14. ແລນ BENGAL MONITOR *Varanus bengalensis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ສັດເລືອຄານຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ
ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າໂລ່ງ, ເຊັ່ນ: ປ່າໂຄກ ຫຼື ປ່າໄມ້ແປກ. ສັດຊະນິດນີ້ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຕໃຫຍ່ເຕັມໄວ ມີສີດຳ, ໝີ່ນເຂັ້ມ ຫຼື ສີເທົາ ປະປົນກັບເມັດທີ່ມີລາຍແຕກຕ່າງກັນຕາມກາງຫຼັງ.
ສັດຊະນິດນີ້ຫາກິນຕາມໜ້າດິນ, ແລະ ຍ້ອນມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ມັນຈຶ່ງມັກລີ້ຊ່ອນດັກກິນອາຫານ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແມງໄມ້ປົກແຂງ, ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ປແມງຕ່າງໆ), ຫອຍ, ມົດ ແລະ ອື່ນໆ
ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ປະເທດໄທ ແມ່ນມີຄວາມຍາວ
ປະມານ 100 ຊຸງຕິແມັດ. ໂຕຜູ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂຕແມ່.
<http://mampam.50megs.com/monitors/bengalensis.html>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);
ເປັນສັດປັນຊີ I ຂອງ CITES (CA I).
ສັດເລືອຄານຊະນິດນີ້ ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການຄ້າຂາຍຊີ້ນ ແລະ ຫັງຂອງມັນ.
ການລ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໝາ.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສັດຊະນິດນີ້ອາດມີຫຼາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,
ແຕ່ກໍມີຢູ່ເປັນບ່ອນສະເພາະແຕ່ໃນຖິ່ນຢູ່ອາໄສທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ.
ເຄີຍພົບເຫັນສັດດັ່ງກ່າວຖືກຄ້າຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ຫຼັກຊາວ,
ນອກນັ້ນກໍຍັງເຫັນຢູ່ໃນທຳມະຊາດໃກ້ກັບພູພຽງນາກາຍ.
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາມລາຍງານວ່າ
ໄດ້ພົບເຫັນສັດຊະນິດນີ້ທີ່ນັ້ນ.

*15. ເຫັຍ WATER MONITOR *Varanus salvator*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເຫັຍ ແມ່ນສັດເສືອຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຊະນິດໜຶ່ງ ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສັດຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນມີສີໝີ່ນ, ມີຂະໜາດຄວາມຍາວຮອດ 2 ແມັດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກເຖິງ 25 ກິໂລ. ຖິ້ມຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ແມ່ນຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຫ້ວຍ ໃນເຂດປ່າດົງດິບ ບ່ອນທີ່ມີອາຫານຫຼາຍຢ່າງສຳລັບມັນ ເຊັ່ນ: ສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງມີຊີວິດ ແລະ ຕາຍແລ້ວ. ອາຫານຂອງມັນ ແມ່ນ: ນົກ, ໝູ, ງູ, **carrion**, ແມງໄມ້, ປູ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຟານນ້ອຍກໍອາດເປັນໄດ້. ມັນມີຂາທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້ເກັ່ງ. ເຫັຍ ປະສົມພັນຕະຫຼອດປີ, ເຫັຍໂຕແມ່ວາງໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 3 ຫາ 25 ໜ່ວຍ ໃສ່ຜັງຈູມປວກ ຕາມ **along rotting logs or in hollow stumps or burrows.** http://www.naturia.per.sg/buloh/verts/monitor_lizard.htm



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);
ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).
ສັດເສືອຄານຊະນິດນີ້ ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການລ່າ ເພື່ອຂາຍ.

ການແຕ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສັດຊະນິດນີ້ອາດມີຫຼາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເຄີຍພົບເຫັນສັດດັ່ງກ່າວມີຂາຍເລື້ອຍໆ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ຫຼັກຊາວ, ນອກນັ້ນກໍຍັງເຫັນຢູ່ໃນທຳມະຊາດໃກ້ກັບພູພຽງນາກາຍ. ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາມລາຍງານວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນສັດຊະນິດນີ້ທີ່ຫີນນັ້ນ.

16. ງູເຫຼືອມ ພະມ້າ BURMESE PYTHON *Python molurus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ງູເຫຼືອມຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ຈົນຮອດພາກເໜືອຂອງຈີນ ແລະ ບາງເກາະດອນໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ຖິ້ມຢູ່ອາໄສຂອງມັນແມ່ນ ເຂດປ່າໄມ້ແຄມນ້ຳ ໃນປ່າຊຸ່ມຊື່ນ, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມເຂດພູ. ມັນອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ ແລະ ເທິງຕົ້ນໄມ້, ນອກຈາກນັ້ນ ມັນຍັງສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້ດີ. ມັນມີນ້ຳໜັກເຖິງ 90 ກິໂລ ແລະ ມີຄວາມຍາວກວ່າ 6 ແມັດ. ມັນກິນ ກະຕ່າຍ, ໝູ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຕ່າງໆ, ນອກນັ້ນກໍສາມາດກິນງູຊະນິດອື່ນ ແລະ ນົກອີກດ້ວຍ.

<http://nationalzoo.si.edu/Support/AdoptSpecies/AnimalInfo/BurmesePython/default.cfm>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ງູເຫຼືອມຖືກຂ້າ ເພື່ອເອົາຊີ້, ຂາຍສູ່ຕະຫຼາດຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າຊາວບ້ານຄິດວ່າມັນກິນໝາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການແຕ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ງູເຫຼືອມຊະນິດນີ້ອາດມີຢູ່ໃນປ່າດົງດິບທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ເຄີຍໄດ້ຮັບບັນທຶກ ກ່ຽວກັບງູຊະນິດນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຫຼັກຊາວ, ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາການ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ. ປະຊາຊົນລາຍງານວ່າ ງູເຫຼືອມດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

17. ງູຫຼາມ RETICULATED PYTHON *Python reticulatus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ງູເຫຼືອມຊະນິດນີ້ເປັນງູທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນພິເສດ, ມັນມີຄວາມຍາວເຖິງ 9 ແມັດ ແລະ ກະຈາຍຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ, ໃນນີ້ລວມທັງປ່າເຊື້ອມໂຊມ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທີ່ໃກ້ນ້ຳ. ທົ່ວຂອງມັນ ມີລັກສະນະເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ລຳໂຕມີຮູບຄ້າຍກັບ ຮູບເລຂາຄະນິດ ສີເຫຼືອງເຂັ້ມ, ໝີ່ນ ແລະ ດຳ. ພື້ນທ້ອງຂອງມັນເປັນສີເຫຼືອງ. ງູຊະນິດນີ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເທິງດິນໄມ້, ລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳ, ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ທັງໃນ meadows, ຟາມ, ບາງຄັ້ງກໍພົບຢູ່ໃນກາງບ້ານ ແລະ ໃນຕົວເມືອງ. ມັນເປັນສັດກິນຊີ້ນ, ອາຫານຂອງມັນມີຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງລວມມີທັງ

ນົກ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງຄົນ. *It is not venomous, however, killing its prey through suffocation.* ມັນອອກໄຂ່ ຫຼາຍ ເຖິງ 100 ໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ.

Campden-Main, 1970.

<http://www.britannica.com/ebi/article-9313193>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ອາດມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ງູເຫຼືອມຊະນິດນີ້ ຖືກຂ້າ ເພື່ອເອົາຊີ້ນເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າສັດປ່າ, ບາງຄັ້ງກໍຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຄິດວ່າມັນກິນໝາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການແຕ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ງູຊະນິດນີ້ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຖິງມັນຈະມີການບັນທຶກນ້ອຍກໍຕາມ.

ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ

ລາຍງານວ່າເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນງູຊະນິດນີ້ຢູ່ເຂດນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

18. INDOCHINESE RAT SNAKE *Ptyas korros*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ງູຊະໜາດໃຫຍ່ຊະນິດນີ້ ຍາວເຖິງ 1, 8 ແມັດ, ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າແຈ້ງ ແລະ ຕາມພື້ນທີ່ດິນກະສິກຳ. ລຳໂຕເປັນສີໝີ່ນ ຄ້າຍສີນ້ຳຕານແກ່, ພື້ນທ້ອງມີສີຂາວ ຂ້ອນຂ້ອງເຫຼືອງ.

ອາຫານຂອງມັນແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດນ້ອຍ, ນົກ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ງູຊະນິດອື່ນ.

ມັນອອກໄຂ່ປະມານຄັ້ງລະ 12 ໜ່ວຍ ແລະ ເປັນງູທີ່ບໍ່ມີພິດຮ້າຍແຮງ.

Campden-Main, 1970.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ງຸຊະນິດນີ້ ຖືກລ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ ຂ້າໃຫ້ພໍ້ຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ງຸຊະນິດນີ້ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າມີຢູ່ໃນເຂດພູຫີນປູນ.

19. ງູເຫົ່າ MONOCELLATE COBRA *Naja kaouthia*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ງູເຫົ່າຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ທັງໃນປ່າດົງດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ຊຸດໂຊມ. ມັນສາມາດອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບທີ່ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກຳ. ມັນມີຄວາມຍາວປະມານ 1, 5 ແມັດ ແລະ ເປັນງູມີພືດຮ້າຍແຮງ. ອາຫານສ່ວນ ໃຫຍ່ຂອງມັນແມ່ນສັດ ປະເພດໜູ, ນົກ ແລະ ສັດເຄິ່ງປົກເຄິ່ງນ້ຳ. ໃນເວລາຕື່ນ, ມັນຈະຍົກລຳໂຕ ແລະ ພົງຄໍອອກ. ງູເຫົ່າຊະນິດນີ້ ມີຮູບຮອຍສີດຳ ຫຼື ວົງມົນ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແສດ ຢູ່ບ່ອນຄໍພົງ..

http://banglapedia.search.com.bd/HT/C_0301.htm

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ອາດມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ງຸຊະນິດນີ້ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

20. ງູຈິງອາງ KING COBRA *Ophiophagus hannah*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ງູຈິງອາງ ເປັນງູທີ່ມີພືດຮ້າຍແຮງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມັນມີຄວາມຍາວເຖິງ 5, 5 ແມັດ ແລະ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າເກືອບທຸກປະເພດ ຊຶ່ງລວມທັງປ່າໄມ້ປ່ອງ. ເວລາມັນຕື່ນ, ມັນສາມາດຍົກລຳຕົວສ່ວນຫົວຂອງມັນຂຶ້ນ ແລະ ພົງຄໍອອກ. ງູຈິງອາງທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ ມີສີດຳເຫຼັ້ມ ຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍສີເທົາ, ມີແຖບເປັນວົງຢູ່ຫົວ ແລະ ຄໍ, ສ່ວນໂຕທີ່ຍັງນ້ອຍມີແຖບທົ່ວລຳຕົວ. ອາຫານຫຼັກຂອງມັນແມ່ນງຸຊະ ນິດຕ່າງໆ. ງູຈິງອາງສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເລືອຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້, ລອຍນ້ຳ ແລະ ເລືອຕາມ ດິນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

http://banglapedia.search.com.bd/HT/C_0301.htm

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ I ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ງູຈິງອາງ ຖືກລ່າເພື່ອຂາຍໄປປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ຊຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອ ວ່າເປັນຢາຈີນ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ມັນອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,

ເຄີຍມີການບັນທຶກວ່າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

21. ແຂ້ SIAMESE CROCODILE *Crocodylus siamensis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ແຂ້ຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນປະເທດບຣູໄນາຍ, ກຳປູເຈຍ, ອນໂດເນເຊຍ (ລວມທັງໃນເກາະ ບໍ່ນຽວ ແລະ ອາດມີຢູ່ເກາະຊາວາ), ສ ປ ປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມ, ແຕ່ມັນກໍຖືວ່າເກືອບສູນພັນໄປຈາກທຳມະ ຊາດແລ້ວໃນບາງປະເທດເຫຼົ່ານີ້. ມັນມີຄວາມຍາວ ເຖິງ 4 ແມັດ ແລະ ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈືດ ທີ່ໄຫຼຊ້າໆ ເຊັ່ນ: ໜອງ (ບຶງ), ແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳ. ອາຫານຫຼັກຂອງມັນ ແມ່ນປາ, ແຕ່ກໍສາມາດກິນສັດເຄິ່ງບຶກເຄິ່ງນ້ຳ, ສັດເລືອຄານ ແລະ

ສັດລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດນ້ອຍ. ລະດູປະສົມພັນຂອງມັນແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ ແລະ ວາງໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 20 ຫາ 50 ໜ່ວຍ ໃສ່ຮັງທີ່ສ້າງເອງ.

http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/brittoncrocs/csp_csia.htm

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ I ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ໃນທີ່ຜ່ານມາ, ແຂ້ຊະນິດນີ້ຖືວ່າມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ປະຊາກອນຂອງມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ (ກະທັນຫັນ) ແລະ ໃນປັດຈະບັນຖືວ່າເປັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ສຸດ. ປະຊາກອນແຂ້ດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງມີເຫຼືອຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຖືວ່າເປັນຈຳນວນສຳຄັນສູງໃນລະດັບໂລກ, ເພາະຄາດວ່າຍັງມີແຂ້ຊະນິດນີ້ເຫຼືອຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ແຕ່ສະເພາະໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍເທົ່ານັ້ນ. ມັນຖືກລ່າ ເພື່ອເອົາຊີ້ນ ແລະ ໜັງ, ນອກນັ້ນກໍຈັບຂາຍເຂົ້າສູ່ຟາມລ້ຽງແຂ້ຢູ່ປະເທດໄທ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ມັນອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,

ເຄີຍມີການບັນທຶກວ່າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ມີການເລົ່າວ່າ ໃນຮ້ອຍປີກ່ອນແຂ້ຊະນິດນີ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື ດອນ ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນນ້ຳຂອງສາຍຕ່າງໆ.

ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນເກືອບຈະໝົດໄປຈາກແຂວງແລ້ວ ຍ້ອນເຫດວ່າມີການລ່າເກີນຂອບເຂດ.

ໃນປີທ້າຍຂອງຊຸມປີເກົ່າສິບ, ໄດ້ມີລາຍງານວ່າພົບເຫັນແຂ້ຢູ່ໃນແມ່ນນ້ຳງຸ່ມ ແລະ

ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ. ໃນປີ 2001

ສາມາດຖ່າຍຮູບແຂ້ທຳມະຊາດໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ.

3.3 BIRDS

22. ນົກຊ້ຳຄາງດຳ BLUE BREASTED QUAIL *Coturnix chinensi*

ຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ນັບແຕ່ປະເທດອິນເດຍ ຈີນຮອດປະເທດ ອິນໂດເນເຊ [stocky](#), ໂດຂອງມັນປ້ອມ ຫຼັງຂອງມັນມີສີນ້ຳຕານແກມດຳ, ເອິກສີນ້ຳເງິນ (ສີຟ້າ), ມີຂີ້ມີແຖບສີຂາວປົນດ້ວຍສີດຳ ຢູ່ລຸ່ມຄາງຂອງມັນ. ກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ນົກຈຳພວກມັນອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ ໃນທົ່ງຫຍ້າ ຫຼື ເຂດປ່າມັນເປັນນົກຢູ່ສາມາດອາໄສຢູ່ທັງໃນທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູ (ສູງເຖິງ 1.300 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ). ມັນກິນເມັດພືດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປວກ. ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ໃສ່ຮັງຕາມດິນ ແລະ ອອກໄຂ່ຕາມລະດູການ ປະມານ ຄັ້ງລະ 4-7 ໜ່ວຍ. [It is nomadic](#) ແລະ ປົກກະຕິແມ່ນຈະພົບເຫັນໝູ່ໜຶ່ງປະມານ 6 - 10 ໂຕ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ສະຖານະພາບຂອງນົກຊະນິດນີ້ ອາດໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຍ້ອນບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ເຄີຍໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ກ່ຽວກັບນົກຊະນິດນີ້ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ.

ຖ້າວ່າມັນຫາກມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍຖືວ່າມັນມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສອັນກວ້າງຂວາງ.

23. ໄກ່ຂວານົນ SIAMESE FIREBACK *Lophura diardi*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ໄກ່ຂວານົນ ຊະນິດນີ້ ເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນປະເທດໄທ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນອິນໂດຈີນ. ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ, ສະຖານະໂດຍລັກສະນະພື້ນທີ່ທຳມະຊາດແວ່ ແຂວງອື່ນໆ ຂອງ ສ ປ ປ ລ ແມ່ນອາດມີຫຼາຍກວ່າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໂຕຂອງມັນມີສີໝີ່ນ, ຫົວເປັນສີແດງແຈ້ງຄາງຂອງມັນເປັນສີດຳ ແລະ ຫາງກໍເປັນສີດຳແກມດ້ວຍສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າ. ສ່ວນກາງຂອງສັນຫຼັງ ມີສີເຫຼືອງເຫຼື້ອມ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ ເປັນນົກ “ຫຼັງໄຟ”. ມັນອາໄສຢູ່ທັງໃນປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປ່າເຊື້ອມໂຊມ ໃນເຂດປ່າດົງດິບປະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ບໍ່ເກີນ 800 ແມັດ (ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ). [It is omnivorous](#), ກິນໝາກໄມ້ທີ່ລົ້ນຕາມດິນ, ແມງໄມ້ ແລະ ໜອນຕາມດິນ. ນົກຊະນິດນີ້ປະສົມພັນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນ ມິຖຸນາ, ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ໃສ່ຮັງທີ່ເສ້າງໄວ້ຕາມໜ້າດິນ ແລະ ອອກໄຂ່ ປະມານຄັ້ງລະ 4-8 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ I ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ຈຳນວນຂອງນົກຊະນິດນີ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ໃນປະເທດໄທ. ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ ບໍ່ກ້ວາງຂວາງຄືກັບໄຂ່ຂວາຫຼວງ Silver Pheasant ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ເຫັນວ່າຍິ່ງໜ້າເປັນຫ່ວງຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຮັກສາຊະນິດພັນນົກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງໂລກນີ້ໄດ້. ຫົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການໃສ່ແຮ້ວ.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໄດ້ມີການບັນທຶກ ວ່າເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ນ້ຳກະດິງ.

*24. ນົກວູ່ວາວ CRESTED ARGUS *Rheinardia ocellata*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສຢູ່ພຽງ 2 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວໂລກ ຄື: ສາຍພູຫຼວງ (ທັງເບື້ອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ) ແລະ ເຂດນ້ອຍໆຂອງປະເທດມາເລເຊຍ. ມັນມີສີໝ້າ-ນ້ຳຕານ-ດຳ ແກມດ້ວຍເມັດສີດຳທົ່ວໂຕ ແລະ ມີຄາງສີຂາວ.

ໂຕຜູ້ມີຫາງຍາວ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນນົກທີ່ມີຫາງຍາວກວ່ານົກຊະນິດອື່ນໆໃນໂລກ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ ເຖິງ 1.800 ແມັດ (ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ) ປົກກະຕິໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງມັນ ແຕ່ຈະເຫັນໂຕມັນຍາກ ເພາະມັນຍ້ານຄົນ. ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ໃນປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນ ຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ. ອາຫານຂອງມັນ ແມ່ນ crickets, ແມງໄມ້, ຊຽດ ແລະ ຝາກຕົ້ນໄມ້. ມັນເຮັດຮັງອອກໄຂ່ ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ, ນົກໂຕແມ່ ອອກໄຂ່ ພຽງ 2 ໜ່ວຍ ຕໍ່ຮັງ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ I ຂອງສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດມີທ່າອ່ຽງຈະສູນພັນ (VU)

ເປັນສັດປັນຊີ I ຂອງ CITES (CA I).

ນົກໂຕຜູ້ມັກເຂ່ຍໜ້າດິນ ເປັນວົງແຄບໆຕາມປ່າໄມ້ ຊຶ່ງປົກກະຕິເປັນບ່ອນກັບມາຫຼິ້ນຢູ່ເລື້ຍໆ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຖືກແຮ້ວໄດ້ງ່າຍ, ມີບາງຄັ້ງກໍເຫັນຄົນເອົານົກດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ມາຂາຍ ເພື່ອລ້ຽງສວຍງາມ.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໃນເວລາດຳເນີນການສຳຫຼວດ ໃນປີ 1990, ນົກດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ ໃນເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ່າ, ແຕ່ສະພາບໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ຮູ້. ນອກນີ້

ກໍຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ

ທີ່ກວມເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ຍ້ອນວ່າມັນເປັນນົກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສາຍພູຫຼວງທີ່ເປັນປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນນັ້ນ,

ຈຶ່ງສັນນິຖານວ່າອາດບໍ່ມີຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ນໆ.

25. ນົກຍຸງ GREEN PEA FOWL *Pavo muticus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຈີນຮອດປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ຮອດ 900 ແມັດ, ໂດຍມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນລວມທັງເຂດປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ. ໆໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ນ ແມ່ນມີສີແຈ້ງເໝືອນກັນ, ຊຶ່ງມີບາງບ່ອນກໍເປັນສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີດຳ. ໂຕແມ່ມີຫາງຍາວ ແລະ ງາມຫຼາຍ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ crickets, ປວກ, berries, ແກ່ນພືດ, ເກສອນດອກໄມ້ ແລະ moths. ໂຕແມ່ ໄຂ່ໃສ່ໜ້າດິນ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄັ້ງ ມີປະມານ 3 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ I ຂອງສ ປ ປ ລາວ;

ເປັນສັດມີທ່າອ່ຽງຈະສູນພັນ (VU)

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ໃນອາດິດ, ນົກຊະນິດນີ້ແມ່ນມີຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຫຼາຍທົ່ວໄປ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ປະຊາກອນຂອງມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ

ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນຈົນຖືວ່າເປັນນົກທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຊະນິດໜຶ່ງ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ເຊື່ອ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ປະຊາກອນນົກຍຸງ ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຊຶ່ງອາດຈະສູນພັນ ຢູ່ໃນໂລກ. ສາຍເຫດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກການລ່າ ເພາະວ່າມັນສາມາດລ່າໄດ້ງ່າຍເພາະມັນອາໄສຢູ່ຕາມປ່າທີ່ເຊື່ອມໂຊມ. ຖ້າຫາກມີການຄວບຄຸມການລ່າ ນົກຊະນິດນີ້ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ໄວ ແລະ ຈະມີຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ຄຽງຄູ່ກັບຄົນເຮົາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນປະຊາກອນນົກດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແມ່ນບ່ອນໜຶ່ງ ໃນຈຳນວນບ່ອນທີ່ຍັງມີນົກຍຸງ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ໃນຊຸມປີ 1990, ໄດ້ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ພົບເຫັນນົກຍຸງ ຢູ່ໃນເຂດ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ (ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຊື່ອໄດ້ເທື່ອ), ເພາະວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການສຶກສາລະອຽດເທື່ອ.

26. ນົກໃສ່ຄໍແດງ RED-COLLARED WOODPECKER *Picus rabieri*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກໃສ່ຊະນິດນີ້ ອາດເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນ. ມັນເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍພົບເຫັນຢູ່ ຕາມປ່າພື້ນພູ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ເຖິງ 700 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ໂຕຂອງມັນເປັນສີຂ້ອນຂ້າງດຳ ແລະ ມີສີຂຽວເຫຼື້ອມ, ສ່ວນຫົວ ແລະ ຄໍຂອງມັນເປັນສີແດງ ລົງມາຫາສ່ວນເອິກ. ອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນແມ່ນປະເພດມົດ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມກາບໄມ້,



ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນປະສົມພັນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ. ມັນເປັນນົກທີ່ໄດ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດເທື່ອ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ຍ້ອນວ່າ ນົກຊະນິດດັ່ງກ່າວມັກອາໄສຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ເຂດຕ່ຳ, ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຂຸດຄົ້ນໄມ້.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກໄສ່ ຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ. ນອກນັ້ນກໍຍັງມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ.

*27. ນົກກົກຄໍຄຳ GREAT HORNBILL *Buceros bicornis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ຈີນ ລົງມາຈົນຮອດອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ເຖິງ 1.500 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ມັນເປັນນົກຊະນິດໃຍ່ ຫົວຂອງມັນເປັນກະໂຫຼກໂນສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສີເຫຼືອງ, ສ່ວນໜ້າເປັນສີດຳ ແລະ ເຫຼືອງ, ຄໍສີເຫຼືອງ, ລຳໂຕເປັນສີດຳ ແກມດ້ວຍສີເຫຼືອງ, ສ່ວນຫ້າຍຂອງລຳໂຕ ແລະ ທາງເປັນສີຂາວ. ມັນກິນໝາກໄມ້ເປັນອາຫານ (ເຊັ່ນໝາກໄຮ, ຊຶ່ງກວມເຖິງ 73 % ຂອງອາຫານຂອງມັນ) ແລະ ແມງໄມ້. ມັນເຮັດຮົງໃສ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສູງແຕ່ 8 ຫາ 35 ແມັດ. ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະ 2 ໜ່ວຍ ໃນລະຫວ່າງ ດເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ເມສາ. ນົກດັ່ງກ່າວຢູ່ເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນຝຸງນ້ອຍໆ ຊຶ່ງອາດມີເຖິງ 10 ໂຕ. **It is also somewhat nomadic,** ດັ່ງນັ້ນ ໃນແຕ່ລະປີມັນຈຶ່ງອາໄສບໍລິເວນກວ້າງ ເພື່ອຊອກຫາຕົ້ນໃຫຍ່ ທີ່ມີໝາກສຸກເປັນອາຫານ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດຫວງຫ້າມ (ບັນຊີ I ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ)

ເປັນສັດກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ການລ່າ ແມ່ນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ນົກຊະນິດນີ້. ການ ຜິກຍິງຕາມຕົ້ນໄຮ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆນັ້ນ ແມ່ນການຫາຍິງໄດ້ງ່າຍ. ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຫັນວ່າມີ ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຄີຍມີການບັນທຶກວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາ ກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ນອກນັ້ນກໍຍັງມີຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ. ຮ່ອມອ່າງໂດ່ງນ້ຳກະດິງ ແລະ ນ້ຳເທີນ ອາດເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນຂອງປະຊາກອນຂອງນົກດັ່ງກ່າວ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເທົ່າ ນີ້ ຍັງອາດເປັນບ່ອນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນນີ້ ກໍເປັນໄດ້.

28. ນົກກົກແງກ BROWN HORNBILL *Anorrhinus austeni*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກແງກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງດິນເດຍ, ຈີນ –ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຊື່ຂອງມັນກໍ່ບົ່ງບອກແລ້ວວ່າ ມັນເປັນສີນ້ຳຕານ ທົ່ວທັງໂຕ with rufous cheeks and throat ແລະ ມີສີເປັນສີເຫຼືອງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ເປັນກຸ່ມຂອງອາດມີເຖິງ 20 ໂຕ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ກໍ່ອາດອາໄສປ່າໄມ້ພື້ນຟູທີ່ຢູ່ໃກ້ປ່າດົງດິບກໍ່ໄດ້. ອາຫານຂອງມັນ –ແມ່ນໝາກໄມ້, ແມງໄມ້, ເຈຍ, ກະປອມ ແລະ ໄຂ່ຂອງນົກຊະນິດອື່ນໆ. ນົກໂຕແມ່ໄຂ່ໃສ່ໂກນໄມ້ສູງປະມານ 5 ຫາ 18 ແມັດ ແລະ ອອກໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 2-3 ໜ່ວຍ ໃນຕົ້ນລະດູແລ້ງ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທວງຫ້າມ (ບັນຊີ I ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ)

ເປັນສັດກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II).

ເຊິ່ງດຽວກັບ ນົກຊະນິດອື່ນທີ່ອາໄສກິນໝາກໄມ້ ມັນຖືກເປັນເປົ້າໃນການຜິດກົດໄດ້ງ່າຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

*29. ນົກກົກຄໍແດງ RUFOUS-NECKED HORNBILL *Aceros nipalensis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າເຂດພູ (ໃນລະດັບຄວາມສູງ 600 ຫາ 800 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ) ນັບແຕ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ຮອດພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອິນໂດຈີນ. ໂຕຜູ້ ມີຫົວ ແລະ ລຳໂຕເປັນສີແດງຊ້ຳ ສ່ວນປີກຂອງມັນເປັນສີດຳ, ຫາງເປັນສີຂາວ, ສີບຂອງມັນເປັນສີ ເຫຼືອງ ແລະ ມີແຊກສີດຳຕັດຢູ່ເບື້ອງເທິງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະມັກພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ ເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນໝູ່ນ້ອຍໆ. ນົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ ໝາກໄມ້ ແລະ figs. ສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບເຫັນຢູ່ຕາມຍອດໄມ້ເປັນໝູ່ລະ 4 - 5 ໂຕ. ນົກໂຕແມ່ ເຮັດຮັງໃສ່ໂກນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອອກໄຂ່ຄັ້ງລະປະມານ 1-2 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງຈະສູນພັນ (VU)

ນົກຊະນິດນີ້ –ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍກວ່າຊະນິດອື່ນໆ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ກໍ່ພົບເຫັນໄດ້ຍາກທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນໂຕຂອງມັນໃຫຍ່ ຈຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການລ່າ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຮູ້ວ່າມີນົກຊະນິດນີ້ ຢູ່ສະເພາະແຕ່ຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມ ເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ ແລະ ບາງເຂດສູງຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ.

*30. ນົກກົກຄໍເອີມ WREATHED HORNBILL *Rhyticeros undulatus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ ມີເຂດແຜ່ກະຈາຍກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນ ປະເທດອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບາງຄັ້ງກໍສາມາດພົບເຫັນເປັນຝູງປະມານ 50 ໂຕ. ມັນເປັນນົກຊະນິດໃຫຍ່, ມີສີດຳ, ທາງເປັນສີຂາວ, ສ່ວນຄໍ ແລະ ສົບ ເປັນສີເຫຼືອງ. ນົກໂຕຜູ້ ມີຫົວເປັນສີຂາວ ແລະ ຄາງເປັນສີຂາວ, ສ່ວນໂຕແມ່ມີຫົວເປັນສີດຳ ແລະ ຄາງເປັນສີຟ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນົກກົກຄໍຄຳ, ມັນຫາກິນເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ບິນເວີນຊອກຫາໝາກໄມ້ທີ່ເປັນອາຫານຂອງມັນ. ມັນຫາກິນໝາກໄມ້, ສັດນ້ອຍ ແລະ ແມງໄມ້ (5%) ຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມຍອດຕົ້ນໄມ້. ນົກໂຕແມ່ ເຮັດຮັງໃສ່ໂກນຕົ້ນໄມ້ ທີ່ມີຄວາມສູງ ປະມານ 18 - 35 ແມັດ ແລະ ອອກໄຂ່ 2 ໜ່ວຍ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ມີນາ, ແຕ່ສາມາດລ້ຽງລູດໄດ້ພຽງແຕ່ໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດປັນຊີ II ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL);

ເປັນສັດປັນຊີ I ຂອງ CITES (CA I).

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນົກກົກຄໍຄຳ, ມັນຕ້ອງການພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອອາໄສ ແລະ ຫາກິນ, ມັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສູນພັນ ຍ້ອນການລ່າຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັນກິນໝາກໄມ້.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ແມ່ນບ່ອນໜຶ່ງທີ່ມີປະຊາກອນນົກຊະນິດນີ້ໝາຍກວ່າບ່ອນອື່ນ ແລະ ມີການພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ເປັນຝູງໃຫຍ່ ປະມານ 80 ໂຕ ຢູ່ໃນເຂດນ້ຳກະດິງ. ປະຊາກອນນົກດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳກະດິງ-ນ້ຳເທີນ ຖືວ່າເປັນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ຢູ່ມຮພາກພື້ນອິນໂດຈີນ.

31. ນົກເຕັນ BLYTH'S KINGFISHER *Alcedo hercules*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກເຕັນຊົວ ເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອິນເດຍ ຈົນມາຮອດ ປະເທດຫວຽດນາມ. ສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ນົກຊະນິດນີ້ ມັກອາໄສຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ ປະມານ 20 ແມັດ ທີ່ມີແຄມເປັນຫໍ່ມີດີ ຢູ່ໃນປ່າເລິກ. ໂຕຂອງມັນເປັນສີ **is brilliant cobalt blue**, ມີຫາງສີຟ້າແກ່ (ເຂັ້ມອັນຂ້າງດຳ), ສ່ວນເອິກເປັນສີແດງຊ້ຳ ແລະ ສົງຂອງມັນເປັນສີດຳ. ນົກຊະນິດນີ້ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນເຂດຕ່ຳ –ແລະ ເຂດສູງ (1.800 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປາ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍແມ່ນແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ມັນເຮັດຮັງໄຂ່ຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ. ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະປະມານ 4-6 ໜ່ວຍ, ໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ ຮ່ວມການພັກໄຂ່.

ສະນະພາບໃນນະຄອນລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ນົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ມັນເປັນນົກທີ່ຄົນມັກຍິງ ແລະ ມັນກໍໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການຖາງປ່າແຄມນ້ຳເພື່ອການກະສິກຳ ແລະ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າ ສະຫງວນ ນ້ຳຈາດບນ້ຳປ້ນ.

32. ນົກເຕັນແດງ RUDDY KINGFISHER *Halcyon coromanda*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກເຕັນຊະນິດນີ້ ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ. ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ມັງທັງນົກທີ່ອາໄສຢູ່ປະຈຳ ແລະ ນົກທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກແຫ່ງອື່ນຕາມລະດູ ການ. **It has a glossy azure-blue back and rump**, ຫຼັງຂອງມັນເປັນສີ ແດງເຂັ້ມ ແລະ ມີສີເປັນສີແດງ ຫຼື ແສດແດງ. ມັນອາໄສຢູ່ຕາມປ່າດົງດິບແຄມ ນ້ຳ – ໃນລະດັບຄວາມສູງ ເຖິງ 900 ແມັດ. ເຊັ່ນດຽວກັບນົກເຕັນຊະນິດອື່ນໆ, ບາງຄັ້ງກໍພົບເຫັນຢູ່ ໃນປ່າ ບ່ອນບໍ່ແມ່ນແຄມນ້ຳ. ອາຫານຂອງມັນແມ່ນ ແມງປີ, ແມງກະເບື້ອ, ແມງເຜິ້ງ, ຂີ້ກະເດືອນ, ຫອຍ, ຂຽດ ແລະ ປານ້ອຍ. ນົກໂຕແມ່ ໄຂ່ໃສ່ຮູແຄມນ້ຳ ແລະ ອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະປະມານ 4-6 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ສະຖານະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງນົກຊະນິດນີ້ – ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກດີ – ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ບໍ່ມີການບັນທຶກລະອຽດ ກ່ຽວກັບນົກຊະນິດນີ້ວ່າ ມີຢູ່ໃສແດ່, ແຕ່ກໍມີລາຍງານວ່າມີນົກຊະນິດນີ້ອາ ໄສຢູ່ໃນເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

33. ນົກກະຈົວຫາງສີຟ້າ BLUE-TAILED BEE-EATER *Merops philippinus*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ມີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳໃຫຍ່ ຊຶ່ງອາໄສແຄມນ້ຳເບີຍບ່ອນຫາກິນ. ມັນເປັນນົກກິນແມງໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດແມງເຜິ້ງ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ຕາມລັກສະນະການກິນອາຫານຂອງມັນ (ເຊັ່ນ: ແມງເຜິ້ງ, *wasps*, ຮັງເຜິ້ງ, ມິດ). ນອກນັ້ນມັນກໍຍັງກິນແມງໄມ້ອື່ນໆອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: *dragonflies* ແລະ ແມງກະເບື້ອ. ນົກຊະນິດນີ້ ຫາກິນຕາມບ່ອນເປີດແປນຕາມນ້ຳຈືດ. ມັນອາໄສຢູ່ເປັນຝູງໃຫຍ່ (ບາງຄັ້ງກໍສັງເກດເຫັນຝູງນົກດັ່ງກ່າວ ຮອດ 100 ໂຕ). ມັນເຮັດຮັງຕາມຮູ ແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ອອກໄຂ່ ປະມານ 5-7

ໜ່ວຍຕໍ່ຄັ້ງ ໃນເດືອນກຸມພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ.

http://www.naturia.per.sg/buloh/birds/Merops_philippinus.htm

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງປະຊາກອນນົກຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ພາກໃຕ້ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ແລະຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຫັນວ່າບໍ່ຖືສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຍັງມີນົກຊະນິດຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ, ແຕ່ມັນເປັນນົກທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອາໄສ ແລະ ເພາະພັນຢູ່ໃນເຂດນີ້.

34. ນົກເຄົ້າ (ນົກທິດ) SPOT-BELLIED EAGLE OWL *Bubo nipalensis*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ນັບແຕ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ ຈົນຮອດພາກພື້ນອິນໂດຈີນ ແລະ ປະເທດໄທ. ມັນແມ່ນນົກປະເພດນົກເຄົ້າ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂຕຂອງມັນເປັນສີນ້ຳຕານແກ່ ແກມດ້ວຍສີຂາວໝົນ, ສ່ວນເອິກເປັນສີນ້ຳຕານອ່ອນແກມສີຂາວ, ມີຂົນຍາວເປັນຮູບ V ສີດຳ ຢູ່ເທິງຕາ ຄ້າຍຄືກັນກັບຄໍຂອງມັນ. ນົກຊະນິດນີ້ພົບເຫັນໄດ້ຍາກ,

ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງມັນໃນຍາມກາງຄືນ. ມັນອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າປະສົມຜັດໃບ ໃນລະດັບຄວາມສູງເຖິງ 1.200 ແມັດ

ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ, ມັນກິນສັດປະເພດນົກໃຫຍ່ຊະນິດອື່ນ (ເຊັ່ນໄກ່ປ່າ ແລະ ໄຂ່ຂວາ) ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ແລະ ສັດເລືອຄານຂະໜາດນ້ອຍ. ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ໃສ່ຕາມໂກນຕົ້ນໄມ້ ເທື່ອລະ 1 ໜ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາ, ມັນຈະໄຂ່ໃສ່ຮັງເກົ່າສະເໝີ. ສຽງຮ້ອງຂອງມັນ ດັງ ຮູ.... ຮູ.... ເປັນສຽງແໜ້ນໜຸ່ງ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ນົກເຄົ້າຊະນິດນີ້ ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ກໍໄດ້ເຫັນຄົນເອົາມາລ້ຽງໄວ້.
ຍ້ອນຄົນມັກເອົາມາລ້ຽງ ມັນຈຶ່ງອາດອາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສູນພັນ ໃນທຳມະຊາດກໍເປັນໄດ້.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາໄດ້ຮູ້ວ່ານົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ
(ມີຂໍ້ມູນຈາກການບັນທຶກພຽງຄັ້ງດຽວ) ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.
ມັນອາດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ແລະ
ເຂດປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນແຫ່ງອື່ນໆ ຂອງແຂວງກໍເປັນໄດ້.

35. ນົກເຄົ້າກິນປາ TAWNY FISH OWL *Ketupa flavipes*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກເຄົ້າຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອິນເດຍ
ລົງມາພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໃຕ້ຫວັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ໂຕຂອງມັນເປັນສີນ້ຳຕານແກ່. ໜ້າຂອງມັນມີວົງສີໝາກກຸ້ງ ຫາແດງຊ້ຳ
ເປັນຂອບອ້ອມໜ່ວຍຕາ. ທາງຂອງມັນເປັນສີນ້ຳຕານໃໝ່ ຂ້ອນຂ້າງດຳ ແລະ
ຄາງຂອງມັນເປັນສີຂາວເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ນົກຊະນິດນີ້



ກໍ່ນອນໃນຈຳພວກນົກເຄົ້າໃຫຍ່ຊະນິດໜຶ່ງ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.
ນົກເຄົ້າຊະນິດພົບເຫັນແຕ່ຢູ່ໃນປ່າທີ່ໃກ້ແຄມນ້ຳ,

ຍ້ອນວ່າອາຫານຫຼັກຂອງມັນແມ່ນປາ. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງກິນ ປູ, ໝູ,
ສັດເລືອຄານແມງໄມ້ ແລະ ນົກອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ມັນໄຂ່ໃສ່ຮັງທີ່ນົກຊະນິດອື່ນສ້າງໄວ້
ແລະ ໂກນໄມ້ຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳ. ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ຄັ້ງລະ 2 ໜ່ວຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກ
ຫາເດືອນກຸມພາ. ສຽງຮ້ອງຂອງມັນ ດັງ ຮູວ... ຮູວ... ເປັນສຽງເຢັນໆ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ເປັນສັດບັນຊີ I CITES (CA I)

ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງນົກເຄົ້າຊະນິດນີ້.

ຜ່ານມາມີລາຍງານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້
ຊຶ່ງອາດເປັນຍ້ອນວ່າເປັນການຍາກໃນການຈຳແນກໄດ້ ຊະນິດພັນນົກເຄົ້າຕ່າງໆ.

ມັນອາດອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄົນຢູ່ໜ້ອຍ. ມັນສາມາດຖືກຍິງໄດ້ງ່າຍ,

ຍ້ອນວ່າມັນມັກອອກຫາກິນຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳທີ່ເປີດແປນ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ,

ຜ່ານມາແມ່ນເຫັນພຽງຂົນຂອງມັນຢູ່ຕາມຕູບລ່າສັດປ່າຂອງຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ຍ້ອນວ່າການເຂົ້າໄປເຖິງປ່າໄມ້ຕາມແຄມນ້ຳໄດ້ງ່າຍ ແລະ

ການບຸກເບີກປ່າແຄມນ້ຳ ເພື່ອການກະສິກຳ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສູນເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສ

ແລະ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຄີຍໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ
ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ, ແຕ່ກໍຄົງອາດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ບ່ອນອື່ນ

ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍ້ອນມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບນົກເຄົ້າຊະນິດອື່ນ
ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຈຳແນກ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ.

36. ນົກເຂົາ PALE-CAPPED PIGEON *Columba punicea*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ ແຜ່ກະຈາຍຢູ່ບາງບ່ອນ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອິນເດຍ
ຫາພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຈີນຮອດ ແຫຼມມາເລ. ຄຳເບື້ອງເທິງຂອງມັນເປັນສີໝີ່ນ,
ຫຼັງຂອງມັນເປັນສີແດງຊ້າ, ສ່ວນ ແລະ ພື້ນທ້ອງ ແລະ
ຫົວຂອງມັນເປັນສີຟ້າແກມໝີ່ນ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີ່ພື້ນດິນໃໝ່ ແລະ
ປ່າດົງດິບອຸດົມສົມບູນ, ບາງຄັ້ງກໍພົບເຫັນຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກຳ.
ມັນເປັນນົກທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ອາຫານຂອງມັນ ແມ່ນໝາກໄມ້,
ແຕ່ມັນກໍກິນແກ່ນພືດຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນປະເທດມຽນມາ ມັນປະສົມພັນ
ໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ຫາເດືອນ ສິງຫາ. ປົກກະຕິແລ້ວ,

ມັນໄຂ່ໃສ່ຮັງຕາມຕົ້ນໄມ້ ສູງຈາກໜ້າດິນ ປະມານ 2 ແມັດ, ຮັງໜຶ່ງຈະມີ 1-2 ໜ່ວຍ.

http://birdbase.hokkaido-ies.go.jp/rdb/rdb_en/colupuni.pdf

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL;)

ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (VU)

ນົກຊະນິດນີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນຂອງມັນ ຢູ່ໃນໂລກ,
ສະນັ້ນຈຳນວນທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນສຳຄັນ ຢູ່ໃນໂລກ.
ຍ້ອນວ່າມັນເປັນນົກຂະໜາດໃຫຍ່ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນເປົ້າຂອງການຖືກຍິງ ຂອງພວກນາຍພານ.
ໃນປັດຈະບັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກດີ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງມັນ ວ່າມັນອາໄສ ຢູ່ຕາມທາງໃນປ່າ ຫຼື
ປ່າທ່າງ, ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຄວບຄຸມການລ່າ ເພື່ອອະນຸລັກປະຊາກອນຂອງມັນ.
ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປ ຍ້ອນວ່າພື້ນທີ່ປ່າໄມ້
ໃນທົ່ວພາກພື້ນອິນດູຈີນແມ່ນນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນມີຢູ່ພຽງແຕ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງເທົ່ານັ້ນ,
ນອກນີ້ກໍອາດມີຢູ່ ບໍ່ເທົ່າໃດບ່ອນໃນປ່າໄມ້ຂອງ ສ ປ ບ ລາວ.

37. ນົກເປົ້າກິ້ນເຫຼືອງ YELLOW-VENTED GREEN PIGEON *Treron seimundi*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າດົງດິບ ໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນ, ປະເທດໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ໃນທັງເຂດຕ່ຳ ແລະ ເຂດສູງ ເຖິງ 1.500 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ.

ມັນເປັນນົກທີ່ມີຮູບຮ່າງສວຍງາມ, ທາງຂອງມັນຍາວ

ແລະໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ ປະປົນດ້ວຍເຫຼືອງເຫຼື້ອມ

ຢູ່ຕາມປີກຂອງມັນ. ເຊັ່ນດຽວກັບນົກເປົ້າໃຫຍ່ທົ່ວໄປ, ມັນສາມາດເຫັນຢູ່ເປັນຝູງ

ແລະ ອາໄສກິນໝາກໄມ້. ນົກຊະນິດນີ້ຫາພົບເຫັນຍາກ ແລະ

ສາມາດບິນທົ່ວໄປໃນໄລຍະໄກ ເພື່ອຊອກຫາອາຫານ. ມັນປະສົມພັນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ

ຫາເດືອນ ມິຖຸນາ ໂດຍເຮັດຮັງຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ສູງປະມານ 6 ຫາ 9 ແມັດ ຈາກໜ້າດິນ.

Gibbs, Barnes et al, 2001.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເຖິງແມ່ນນົກຊະນິດນີ້ຖືກລ່າ ແລະ ຖິ້ມຢູ່ອາໄສຂອງມັນກໍມີຈຳກັດ, ແຕ່ມັນກໍຍັງມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນ ສ ປ

ປ ລາວ ສະນັ້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

ການແຕ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປີ້ນ.

38. ນົກເປົ້າທ້ອງຂາວ WHITE-BELLIED GREEN PIGEON *Treron sieboldii*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນພາກອາເວັນອອກ ຂອງທະວີບອາຊີ (ເຊັ່ນ: ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ) ລົງມາທາງໃຕ້ຮອດ ພາກພື້ນອິນໂດຈີນ.

ມັນມີຂະໜາດ ປະມານ 36 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີຫາງຍາວ,

ປີກກະຕິມັນເປັນສີຂຽວເຫຼືອງເຫຼື້ອມ. ສ່ວນທ້ອງໄປຫາທາງ ເປັນສີຂາວ ຫຼື

ແດງເຫຼືອງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າໄມ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ປ່າດົງດິບ,

ປ່າປະສົມ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍພົບເຫັນຢູ່ຕາມປ່າຊຸດໂຊມ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນປ່າດົງອຸດົມສົມບູນ

ໃນລະດັບຄວາມສູງເຖິງ 900 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ **d**

cherries, grapes ແລະໝາກໄມ້ອື່ນໆ. ມັນເຮັດຮັງໃສ່ຕາມ ປ່າພຸ່ມ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ.

ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ເປັນສີຂາວ ຄັ້ງລະ 2 ໜ່ວຍ.

Gibbs, Barnes et al, 2001.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ນົກເປົ້າຊະນິດນີ້ ບໍ່ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງມັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນົກເປົ້າຊະນິດອື່ນໆ, ມັນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຖືກລ່າ ຂອງນາຍພານ.

ການແຕ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາມີການລາຍງານໜ້ອຍ ກ່ຽວກັບນົກຊະນິດນີ້ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ກໍຮູ້ວ່າມັນມີຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳກະດິງ ແລະ ນ້ຳເທີນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປີ້ນ.

39. ນົກຕູມ WATERCOCK *Gallinix cinerea*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ມີແຜ່ກະຈາຍຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນທະວີບອາຊີ. ມັນອາໄສຢູ່ຕາມໜອງບຶງ ແລະ ທົ່ງນາ (ຖ້າບໍ່ຍິ່ງມັນ), ຊຶ່ງມັນໄດ້ລີ້ຊ່ອນຢູ່ ແຕ່ກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະເຫັນໂຕມັນ. ນົດໂຕຜູ້ມີສີດຳ ມີຫອນສີແດງຢູ່ເທິງສົບທີ່ເປັນສີເຫຼືອງ, ສ່ວນໂຕແມ່ປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນສີນ້ຳຕານແກ່ ແລະ ມີຫົວເປັນສີນ້ຳຕານໝົ່ມ. It has mainly black-grey plumage with red legs, bill, forehead shield and horn. ນົກຊະນິດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກິນແມງໄມ້, ປານ້ອຍ, ແກ່ນພືດ ແລະ ຫຍ້າ ເປັນອາຫານ. ນົກໂຕແມ່ນ ອອກໄຂ່ ປະມານ 3-6 ໜ່ວຍ. ມັນເປັນນົກທີ່ລົງສຽງຮ້ອງດັງເນື່ອງນັ້ນ.

<http://www.yotor.org/wiki/en/wa/Watercock.htm>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL)

ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການບັນທຶກຫຼາຍ, ອາດເປັນຍ້ອນປະຊາກອນຂອງມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໜອງບຶງທີ່ເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກທຳລາຍ ໂດຍປະຊາຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການລ່ານົກຊະນິດນີ້ ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ການສູນເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ເພາະວ່ານົກຊະນິດນີ້ແມ່ນສາມາດອາໄສຢູ່ຕາມທົ່ງນາໄດ້.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ຮັບບັນທຶກ ພຽງສະເພາະຈາກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍເທົ່ານັ້ນ.

40. ນົກກະແຕ່ສົບຍາວ LONG-BILLED PLOVER *Charadrius placidus*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຖິ່ນປະສົມພັນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງທະວີບອາຊີ, ແຕ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລະດູການ ລົງມາຮອດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນພົບເຫັນໃນ ລະດູໜາວ ແລະ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດແຄມນ້ຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບ່ອນທີ່ມັນມັກອາໄສຢູ່ແທ້ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ

ມີພຽງຮູ້ແຕ່ວ່າມັນອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນນ້ຳເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນນົກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີສົບຍາວ ກວ່ານົກເຂົາຊາຍຊະນິດອື່ນໆ. ສ່ວນທ້ອງຂອງມັນເປັນສີຂາວ, ຫຼັງ ແລະ ຫາງ ເປັນສີນ້ຳຕານ, ສ່ວນຄໍຈະມີວົງອ້ອມເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ຫຼື ດຳ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ສົບຂອງມັນແມ່ນເປັນສີດຳ. ປົກກະຕິແລ້ວ ມັນເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ແບບໂດດດ່ຽວ ແລະ ມີສຽງຮ້ອງແຫຼມແຈ້ງ ພິວີ...ພິວີ... . ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ໃສ່ດິນ ໂດຍເຮັດຮູ ແລະ ເອົາຫຍ້າເຂົ້າໄປເຮັດຮັງ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ຊັດເຈນ ຂອງນົກດັງກ່າວ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາ ສ ປ ປ ລາວ ໃນລະດູໜາວນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ໄດ້. ມັນອາດໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການສູນເສຍບ່ອນອາໄສ ຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນ.

ການແຕ່ງຈະຍາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ການບັນທຶກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບ ວ່າມີຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳກະດິງ ເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

41. ນົກກະແຕ້ຫ້ວຍ RIVER LAPWING *Vanellus duvaucelii*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດດັງກ່າວ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນບ່ອນດຽວຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ຊຶ່ງແມ່ນສາຍນ້ຳໃຫຍ່ທີ່ໄຫຼຊ້າ ແລະ ແຄມປັນຫາດຊາຍ ແລະ ແຮ່. ມັນເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຕະຫຼອດປີ. ນົກຊະນິດນີ້ມີທົວ ແລະ ຄາງເປັນສີດຳ, ມີສີມັນຕາມຄໍ, ຫຼັງເປັນສີນ້ຳຕານຄ້າຍກັບສີຂີ້ຊາຍ, ທ້ອງເປັນສີຂາວ, ສ່ວນຂາ ແລະ ສົບເປັນສີດຳ. ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະພົບເຫັນຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນຝຸງໜ້ອຍໆ. ນົກຊະນິດນີ້ປະສົມພັນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ, ມັນວາງໄຂ່ໃສ່ຕາມຫາດຊາຍ ຫຼື ດິນແຫ້ງ ຕາມແຄມນ້ຳ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL)

ນົກຊະນິດນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ການລົບກວນຕ່າງໆຕາມແຄມນ້ຳ ບ່ອນທີ່ມັນເຮັດຮັງ (ປົກກະຕິແມ່ນຫາດຊາຍຕາມແມ່ນ້ຳ ຫຼື ສາຍນ້ຳໃຫຍ່ຕ່າງໆ). ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນອາດຫຼຸດລົງໄດ້ ຍ້ອນວ່າຫາດຊາຍແຄມນ້ຳມີການລົບກວນຈາກສັດລ້ຽງ (ຄວາຍ) ແລະ ການຕັ້ງແຄ້ມພັກຜ່ອນຂອງຄົນ. ສາຍເຫດທິພາບໃຫ້ປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດດັງກ່າວຫຼຸດລົງຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ອາດແມ່ນການສູນເສຍພື້ນທີ່ເຮັດຮັງໄຂ່ ຫຼາຍກວ່າການລ່າເອົານົກໂດຍກົງ. ການປ້ອງກັນສະຖານທີ່ວາງໄຂ່ຂອງນົກດັງກ່າວ ຈາກການທຳລາຍຕ່າງໆ ອາດມີຄວາມສຳຄັນສູງເພື່ອອະນຸລັກນົກຊະນິດນີ້.

ການແຕ່ງຈະຍາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ນົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ຕາມແມ່ນນ້ຳຂອງ. ນອກນີ້ ຍັງມີຢູ່ຕາມໜ້າກະດິງຕອນລຸ່ມ ລະຫວ່າງປາກນ້ຳມວນ ແລະ ປາກນ້ຳກະດິງ. ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ອາດອາໄສຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ກໍມີກະຈາຍຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳຍ່ວງ, ນ້ຳມວນ (ມີຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ) ແລະ ນ້ຳໄຮ.

42. ນົກແຕບແຕ້ (ຫົວໝີນ) (*Vanellus cinereus*)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກນົກແຕບແຕ້ຊະນິດອື່ນ ແມ່ນຍ້ອນມັນບໍ່ອາໄສ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວຕະຫຼອດປີ. ມັນປະສົມພັນຢູ່ ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງທະວີບອາຊີ (ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ), ແລະ ເຄື່ອຍຍ້ານມາຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ພຽງແຕ່ໃນລະດູໜາວເທົ່ານັ້ນ. ມັນເປັນນົກຊະນິດນ້ອຍທີ່ມີສີຂາວ ແກມເຫຼືອງ. ດັ່ງຊື່ຂອງມັນກໍ່ບົ່ງບອກວ່າ ມັນມີຫົວເປັນສີໝີນ, ປາຍສົບຂອງມັນມີສີດຳ, ມັນມີຂອງສີດຳຢູ່ເອິກ, ສ່ວນພື້ນທ້ອງຂອງມັນເປັນສີຂາວ. ມັນນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຫາກິນ ແລະ ອາໄສຄ້າຍຄືກັນກັບນົກແຕບແຕ້ ເຊັ່ນ: ອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະ ສາຍນ້ຳໃຫຍ່. ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກນົກແຕບແຕ້ຊະນິດອື່ນ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນສາມາດອາໄສຢູ່ ຕາມແຄມໜອງ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ນົກຊະນິດນີ້ ອາດຈະບໍ່ມີທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງອາດ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງປານໃດ ກ່ຽວກັບການເອົາໃນໃສ່ໃນການການອະນຸລັກສູງ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ ມັກພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳກະດິງ, ສາຂາຕ່າງໆຂອງນ້ຳກະດິງ (ເຊັ່ນ ນ້ຳມວນ) ແລະ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ. ບ່ອນທີ່ພົບເຫັນວ່າມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳກະດິງຕອນລຸ່ມ.

43. ນົກກະແຕ້ SMALL PRATINCOLE *Glareola lactea*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ນົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳໃຫຍ່, ຊຶ່ງຢູ່ລວມກັນເປັນຝຸງໃຫຍ່. ຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນແມ່ນໃນປະເທດອິນເດຍ, ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ນົກຊະນິດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເຊກອງ. ໂຕຂອງມັນເປັນສີໝີນ, ປີກຂອງມັນເປັນສີດຳ ແລະ ສີຂາວ, ຫົວເປັນສີໝີນ ແລະ ຫາງມີສີດຳ ແລະ ສີຂາວ. ມັນເປັນນົກກິນແມງໄມ້, ມີສຽງຮ້ອງເນື່ອງນັ້ນ ແລະ **animated. It is particularly active at dusk.** ນົກໂຕແມ່ເຮັດຮັງໄຂ່ໃສ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ໃນປັດຈຸບັນ, ນົກຊະນິດນີ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໜ້ອຍກວ່າໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າຍັງມີຢູ່ຫຼາຍ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ຍ້ອນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນອາໄສຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ, ສະນັ້ນການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຶ່ງອາດບໍ່ເປັນປັນຫາຫຼາຍ ຄືກັນກັບນົກນ້ຳຊະນິດອື່ນໆ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍລະເວນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຈຳນວນໜຶ່ງພົບເຫັນຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳກະດິງ, ນອກນີ້ ກໍ່ອາດມີຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳອື່ນອີກ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຊັນ, ແຕ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການສຳຫຼວດ.

44. ແຫຼວມຸມ BLACK KITE *Milvus migrans*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ແຫຼວ ຊະນິດນີ້ ມີຂະໜາດປານກາງ (47 ຫາ 55 ຊັງຕີແມັດ) ເປັນສັດກິນຊີ້ນ (raptor). ເມື່ອເບິ່ງຈາກບ່ອນໄກ ຈະສັງເກດວ່າມັນເປັນສັດດຳ

ຊ່ອງມືຂົນສົ່ງມີນຳຢູ່ຕາມລຳຄໍ. ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວໂຕຂອງມັນເປັນສີໝີນດຳ

ປະປົນດ້ວຍສີໝີນເຫຼື້ອມ ແກມແດງຊ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຫົວ, ລຳຄໍ ແລະ ພື້ນຫ້ອງ. ແຫຼວຊະນິດນີ້ຫາກິນ ກະປອມ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດນ້ອຍ

ແລະອມງໄມ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ grasshoppers. ມັນປະສົມພັນຕະຫຼອດປີ,

ແຕ່ປົກກະຕິແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ ຫາເດືອນພະຈິກ. ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ແຕ່ 1

ຫາ 3 ໜ່ວຍ. ເຖິງແມ່ນ ໂດຍປົກກະຕິຈະພົບເຫັນມັນຢູ່ເປັນໝູ່ນ້ອຍໆ,

ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ເຕົ້າໜຶ່ງກັນເປັນຝຸນໃຫຍ່ຫຼາຍ ຈົນຮອດຫຼາຍພັນໂຕ ກໍ່ເປັນໄດ້.

http://www.amonline.net.au/factsheets/black_kite.htm



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດບັນຊີ I ຂອງ CITES (CA I)

ຍ້ອນວ່າແຫຼວຊະນິດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຂໍ້ມູນໜ້ອຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ມີລາຍງານວ່າ ດົນໆ ຈຶ່ງພົບເຫັນແຫຼວຊະນິດນີ້ ຢູ່ເຂດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ,

ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ບ່ອນອື່ນອີກ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

45. ແຫຼວກິນປາ LESSER FISH EAGLE *Ichthyophaga humilis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ແຫຼວຊະນິດນີ້ ໂຕນ້ອຍ ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳ ແລະ ຫາກິນປາເປັນອາຫານ.

ມັນມີເຂດແຜ່ກະຈາຍ ແຕ່ພາກທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອິນເດຍ

ຕາມພູເຂົາຫີມະໄລ ລົງມາຫາປະເທດເນປານ, ມຽນມາ,

ພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອິນໂດຈີນ ໄປຮອດປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ

ເກາະບໍນຽວ. ມັນເປັນແຫຼວຂະໜາດນ້ອຍ, ເປັນສີນ້ຳຕານໝີນ,

ມັກອາໄສຢູ່ຕາມປ່າທີ່ມີສາຍນ້ຳ ຕາມຕົ້ນໝູ່ ແລະ ເທິງໝູ່. ມັນເຮັກຮັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ

ແໜ້ນໜາ ໃສ່ຕົ້ນໄມ້ສູງ ຢູ່ຕາມປ່າແຄມສາຍນ້ຳ ຫຼື ແມ່ນ້ຳ. ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ມັນປະສົມພັນ ໃນລະດູໜາວ (ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນມີນາ) ແລະ ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ 2 ຫາ 3 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT);

ເປັນສັດບັນຊີ II ຂອງ CITES (CA II)

ຍ້ອນວ່າແຫຼວຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ຕາມບ່ອນເປີດແປນແຄມແມ່ນ້ຳ

ມັນຈຶ່ງການເປັນເປົ້າໝາຍຍິງໄດ້ງ່າຍ. ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ບໍ່ມີແມ່ນ້ຳສາຍໃດມີປະຊາກອນຂອງແຫຼວຊະນິດນີ້ຫຼາຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຄີຍມີບັນທຶກວ່າ ມີແຫຼວຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍບນ້ຳເທີນ. ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຈຶ່ງບໍ່ມີລາຍງານວ່າພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ (ທັງໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄືພາຍຫຼັງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອຸ່ນ-ຫີນບູນ).

46. ແຫຼວແດງ RUFOUS-WINGED BUZZARD *Butastur liventer*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ



ແຫຼວຂະໜາດນ້ອຍ ຊະນິດນີ້ ມີກະຈາຍຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ໄປຫາພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງຈີນ ລົງມາທົ່ວພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນນີ້ລວມທັງບັນດາເກາະດອນຕ່າງໆຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຊັ່ນ ເກາະຊາວາ ແລະ ເກາະຊຸລາເວສີ. ມັນມີສີນ້ຳຕານ ຄ້າຍດັບສີໝໍ້ນາດຳ ໃນເວລາບິນ ແລະ ຫົວຂອງມັນ, ສ່ວນລຸ່ມຂອງທາງມີສີນ້ຳຕານ, ທ້ອງຂອງມັນເປັນສີຂາວ ແລະ ສົບເປັນສີເຫຼືອງແກມດ້ວຍແຊກສີດຳ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນເຂດເປີດແປນ, ປ່າຫ່າງ ແລະ ປ່າພຸ່ມ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳ ແລະ ໜອງບຶງ. ມັນກິນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດນ້ອຍ, ກະປອມ, ກົບ-ຂຽດ, ປູ ແລະ ແມງໄມ້ ເປັນອາຫານ. ມັນເຮັດຮັງໃສ່ຕາມເຮືອນຍອດຕົ້ນໄມ້ສູງທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິອອກໄຂ່ປະມານ 2 ຫາ 3 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ຫຼາຍເຂດໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ກໍ່ຍັງຖືວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍ. ສາຍເຫດໜຶ່ງກໍ່ອາດແມ່ນຍ້ອນມັນສາມາດອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າເຊື້ອມໂຊມໄດ້.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ບາງຄັ້ງໄດ້ສັງເກດເຫັນນົກຊະນິດນີ້ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ. ຜ່ານມາເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງເຊັ່ນກັນ.

47. ນົກອິນຊີປີກລາຍ GREATER SPOTTED EAGLE *Aquila clanga*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ແຫຼວໃຫຍ່ສີເມັກ ຊະນິດນີ້ຈັດເປັນນົກກິນຊີ້ນຂະໜາດໃຫຍ່. ໂຕຂອງມັນຍາວເຖິງ 65 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ດ້ານນອກມັນມີຂົນສີດຳ. ມັນມີເຂດແຜ່ກະຈາຍກວ້າງຂວງ ນັບແຕ່ພາກເໜືອຂອງທະວີບເອີຣົບ ຜ່ານມາທະວີບອາຊີ, ແລະ ໃນລະດູໜາວມັນອາໄສຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບເອີຣົບ, ພາກຕາເວັນອອກກາງ, ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ. ແຫຼວຊະນິດນີ້ອອກໄຂ່ 1-3 ໜ່ວຍ ໃສ່ຮັງເທິງຕົ້ນໄມ້. ມັນເປັນຊະນິດພັນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມປະເທດທີ່ມີປ່າໄມ້ ເພື່ອຫາລ່າສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆເປັນອາຫານ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ. ສຽງຮ້ອງຂອງມັນມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ ສຽງໝາຄາງ. <http://greater-spotted-eagle.foosquare.com/>

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

VU

ແຫຼວຊະນິດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນນົກເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຫາຍາກ (doubtless largely overlooked), ໃນລະດູໜາວຈຳນວນຂອງມັນມີໜ້ອຍ. ຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນຂອງທະວີບອາຊີ ບ່ອນມັນເຄີຍມີ ຖືວ່າໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການລົບກວນ ແລະ ຕາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນມົນລະພິດ ແລະ ການສູນເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສ.

http://www.rdb.or.id/view_html.php?id=76&op=aquiclan

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ ແມ່ນບ່ອນໜຶ່ງ ທີ່ເຄີຍມີແຫຼວຊະນິດນີ້ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

48. ແຫຼວປີ້ **PIED FALCONET** *Microhierax melanoleucus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ອາດເປັນ hawk ຂະໜາດນ້ອນທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ນົກຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ

ລົງມາທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຮອດພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ສ ປ ປ ລາວ.

ປົກຄຸມເທິງຂອງມັນເປັນສີດຳ, ສ່ວນລຳໂຕເບື້ອງລຸ່ມເປັນສີຂາວ,

ມີຂອງວົງດີດຳອ້ອມຕາທັງສອງຂ້າງ ແລະ ສົບຂອບມັນເປັນສີດຳ. ນົກຊະນິດນີ້

ສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະມັນມັກບິນເວັ້ນໃນລະດັບສູງ ເທິງຕົ້ນໄມ້ຕາຍ.

ມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມເຂດປ່າໄມ້ເນີນໝູ ແລະ ເຂດປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນເປີດແປນ.

ອາຫານຂອງມັນ ແມ່ນແມງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ນົກນ້ອຍ, ບາງຄັ້ງກໍຈັບກະປອມກິນເປັນກະຫານ.

ມັນໄຂ່ໄສ່ຕາມຮັງເກົ່າຂອງນົກຊະນິດອື່ນ ຫຼື ໂກນໄມ້ທີ່ນົກໃສ່ເຈາະໄວ້ ໃນລະດັບສູງ 13 ຫາ 30

ແມັດ ຈາກໜ້າດິນ, ມັນວາງໄຂ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນພຶດສະພາ.

ຈຳນວນໄຂ່ຂອງມັນບໍ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ມັນຈະແຕກເປັນໂຕ ໃນລະຫວ່າງ 3 ຫາ 4 ໂຕ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກບັນຊີ I ຂອງ CITES (CA I)

ຍ້ອນມັນເປັນນົກຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບິນເວັ້ນສູງ ແລະ ບໍ່ຢູ່ເປັນຝູງ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງອາດບໍ່ຖືກຍິງ. ການອະນຸລັກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ອາດເປັນຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ນົກຊະນິດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ພຽງແຕ່ –ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ, ແຕ່ມັນກໍອາດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແງ່ຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ.

49. ນົກຄຳ **ORIENTAL DARTER** *Anhinga melanogaster*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ຂະໜາດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ໄກ້ແມ່ນ້ຳ, ເຂດນ້ຳຖ້ວມ ແລະ

ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທົ່ວໄປ. ມັນຄ້າຍກັບ

ນົກນ້ຳທີ່ມີຂາຍາວ, ຫຼັງຂອງມັນເປັນສີໝ້ືນແຂກຂາວ ແລະ ມີພື້ນທ້ອງເປັນສີດຳ, ລຳ

ຄໍເປັນສີໝ້ືນ, ປົກມີສີຂາວ ແລະ ສົບເປັນສີໝ້ືນກຸ້ງຂ້ອນຂ້າງເຫຼືອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ມັນ

ກິນປາເປັນອາຫານ, ແຕ່ມັນກໍສາມາດກິນງູນ້ຳ, ປາຝານ້ອຍ, ແມງໄມ້ ແລະ ຫອຍ. ມັນ



ໄຂ່ໃສຕາມງ່າໄມ້. ມັນສາມາດປະສົມພັນໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ປະມານ 2 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດນີ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຈົນບາງບ່ອນໄດ້ສູນພັນໄປແລ້ວ. ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນຖືວ່າຍັງມີຢູ່, ແຕ່ກໍເກືອບສູນພັນເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນການສືບພັນບໍ່ຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາກອນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍ ແລະ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ອະນຸລັກ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເຄີຍມີການບັນທຶກ ວ່າພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍລິເວນສາຍນ້ຳກະດິງຕອນລຸ່ມ. ແຕ່ກໍມີພຽງຄັ້ງດຽວ ສະນັ້ນອາດຈະບໍ່ສາມາດພົບເຫັນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ.

50. ນົກກະສາ PURPLE HERON *Ardea purpurea*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກນີ້ຊະນິດນີ້ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ນັບແຕ່ປະເທດອິນເດຍ ລົງມາຫາຊົງເຂດອິນໂດຈີນ ໄປຮອດອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ. ມັນມີທັງສີດຳ, ສີແສດ, ສີເຫຼືອງ, ສີນ້ຳຕານ, ສີຂາວ ແລະ ສີໝີ່ນ, ສ່ວນສົບຂອງມັນເປັນສີເຫຼືອງຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍສີແສດ. ຫົວຂອງມັນເປັນສີແສດ ແລະ ສີດຳ, ກ້ອງຄາງລົງມາຫາສ່ວນເອິກມີສີຂາວ, ຂົນຂອງມັນເປັນສີນ້ຳຕານແກ່ ແລະ ໝີ່ນ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນໜອງບຶງນ້ຳຈືດທີ່ເປີດແປນ ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າຫຍ້າຮົກເຮື້ອ. ນອກນີ້ ມັນຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ຕາມທົ່ງນາ, ແຄມໜອງ ແລະ ເຂດປ່າທາມ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ ກົບ-ຂຽດ, ແມງໄມ້, ຫອຍ ຕະຫຼອດຮອດນົກ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດນ້ອຍ. ມັນເຮັດຮັງໃສ່ພຸ່ມໄມ້ຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຄມນ້ຳ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 3 ແມັດ. ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ປະມານແຕ່ 2 ຫາ 8 ໜ່ວຍ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL)

ຜ່ານມາ, ນົກຊະນິດນີ້ ມີແຜ່ຫຼາຍ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້, ຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອວ່າມັນຈະຫຼຸດລົງຮອດຂະໜາດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ນົກຊະນິດນີ້ອາດໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການສູນເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄວາມເປີເປື້ອນຂອງນ້ຳ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຄີຍມີການບັນທຶກ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນ ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

51. ນົກເຈົ້າ VON SCHRENCK'S BITTERN *Ixobrychus eurhythmus*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນໃສ່ ຕະຫຼອດຮອດແຫຼມມາເລ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ. ນົກໂຕຜູ້ມີຫຼັງເປັນສີນ້ຳສ່ວນທ້ອງເປັນສີໝີ່ນຈາງ, ຄາງເປັນສີຂາວ ແລະ ມີສີບຢາວສີເຫຼືອງ. ນົກໂຕແມ່ ມີສີຕ່ຳຫຼັງຂອງມັນເປັນສີໝີ່ນເຂັ້ມ ແລະ ມີເມັດສີຂາວ, ໂຕເປັນສີນ້ຳຕານ ຄຳ ແລະ ເອິກ ເປັນສີຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມໜອງ, ບຶງ ແລະ ເຂດຊຸ່ມຊື່ນ ທີ່ມີຫຍ້າປົກຄຸມ ຕາມຮ່ອມແມ່ນ້ຳ ຄັ້ງກໍຢູ່ໃນທົ່ງນາ. ມັນກິນປານ້ອຍດ ກົບ-ຊຽດ, ກຸ້ງ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ມັນເຮັດຮັງຕາມແຄມນ້ຳ ໃກ້ກັບໜ້າດິນ. ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ປະມານ 3 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (ARL)

ນົກຊະນິດນີ້ ເປັນນົກເຄື່ອນຍ້າຍມາຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ໃນລະດູໜາວ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ບ່ອນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍພົບເຫັນນົກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ.

52. ນົກແຕວແຈງອ່ອນສີຟ້າ BLUE-NAPED PITTA *Pitta nipalensis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອາຊີໃຕ້, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ບໍ່ມີທົ່ວໄປໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນ ແລະ ປະເທດມຽນມາ. ມັນເປັນນົກໃນຈຳພວກ ນົກແຕວແຈວ ຂະໜາດກາງ-ໃຫຍ່ ທີ່ມີໜ້າສີແດງຊ້ຳລຽບຕາມຂອບຕາ. ໂຕຜູ້ ມີງ່ອນເປັນສີນ້ຳເງິນເຫຼື້ອມ, ສ່ວນໂຕແມ່ນງ່ອນເປັນສີຂຽວ. ກາງຫຼັງເປັນສີຂຽວ. ມັນອາໄສຢູ່ໃນຖິ່ນຢູ່ອາໄສແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງລວມທັງໃນປ່າອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປ່າພື້ນພູໃໝ່ ຕະຫຼອດຮອດໃນປ່າເຊື້ອມໂຊມ. ໂດຍປົກກະຕິມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສູງ ຮອດ 2.150 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ມັນກິນແມງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງລວມທັງດ້ວງ, ກະປອມ ແລະ ໝູ່ທີ່ຢູ່ຕາມດິນ. ມັນເຮັດຮັງທີ່ແໜ້ນໜາ ແບບມີໂຄງສ້າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງມີປະຕູອອກສຸດຢູ່ທາງດ້ານ, ຮັງຂອງມັນປົກກະຕິແມ່ນເຮັດໃສ່ຕາມໜ້າດິນ. ນົກໂຕແມ່ອອກໄຂ່ ປະມານ ແຕ່ 3 ຫາ 7 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ (LKL)

ເພາະວ່າ ນົກແຕວແຈວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກແຮ້ວໄດ້ງ່າຍ, ສະຖານະພາບຂອງນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ. ໃນນີ້ ລວມທັງເຂດແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ຂອງມັນກໍບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເຊັ່ນກັນ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງນົກຊະນິດນີ້ ແລະ ນົກຊະນິດທີ່ຂຽນຢູ່ລຸ່ມຖັດລົງໄປນີ້ (ນົກແຕວແຈວ ກິນສີຟ້າ) ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ, ແຕ່ວ່າຊະນິດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຊະນິດນີ້ ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນເຂດປ່າໄມ້

ທີ່ຍັງດີ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ນົກແຕນແວນງ່ອນສີຟ້າ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ.

53. ນົກແຕວແຈວກິນສີຟ້າ BLUE-RUMPED PITTA *Pitta soror*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກແຕວແຈວຂະໜາດກາງ-ໃຫຍ່ ຊະນິດນີ້ ເປັນນົກທີ່ມັກລີ້ຊ່ອນຢູ່ ແລະ ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ພາກພື້ນອິນໂດຈີນ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະເທດໄທ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນົກແຕວແຈວຊະນິດອື່ນ, ເປັນການຍາກທີ່ຈະດຳເນີນການສຳຫຼວດນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າທີ່ມີຄວາມປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ. ຫຼັງຂອງມັນເປັນສີຂຽວ ຫາສີຂຽວເຫຼື້ອມ ແລະ ມີສີຟ້າຕາມສ່ວນທ້າຍຂອງຫຼັງ ແລະ ກິ້ນ. ຫົວຂອງມັນມີສີແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະເປັນສີມ່ວງຫຼື ຄຳ. ໂດຍລວມແລ້ວ ສີຂອງມັນຈະແຈ້ງກວ່າສີຂອງນົກແຕວແຈວງ່ອນສີຟ້າ. ນົກຊະນິດນີ້ ເປັນນົກທີ່ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໃນນີ້ລວມທັງປ່າພື້ນພູ ແລະ ປ່າທີ່ຖືກລົບກວນດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປ່າໄມ້ປ່ອງ. ມັນກິນແມງໄມ້, ຫອຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍກິນຂຽດເປັນອາຫານ. ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສໃນການວາງໄຂ່ຂອງມັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານມາກໍໄດ້ພົບຮັງຂອງມັນທີ່ເຮັດດ້ວຍກິ່ງ ແລະ ໃບໄມ້ແຫ້ງ ຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າດິນປະມານ 2 ແມັດ. ລະດູປະສົມພັນອາດແມ່ນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ມິຖຸນາ, ໃນຮັງຂອງມັນໄດ້ສັດວ່າມີລູກນ້ອຍ 2 ຫາ 3 ໂຕ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເພາະວ່າ ນົກແຕວແຈວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກແຮ້ວໄດ້ງ່າຍ, ສະຖານະພາບຂອງນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ. ໃນນີ້ ລວມທັງເຂດແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ຂອງມັນກໍບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເຊັ່ນກັນ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນເຂດປ່າໄມ້ ທີ່ຍັງດີ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ນົກແຕນແວນກິນສີຟ້າ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປັນ.

54. ນົກແສນດ່າງປີກລາຍຂາວ WHITE-WINGED MAGPIE *Urocissa whiteheadi*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຂະໜາດໃຫຍ່ຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ງໃຕ້ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ພາກເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດຈີນ. ມັນມີໂຄງສ້າງລຳຕົວທີ່ດີ ປະກອບດ້ວຍສີດຳ ແລະ ສີຂາວ ແລະ ມີສີບສີເຫຼືອງ. ມັນອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າປະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສູງຮອດ 1.400 ແມັດ. ມັນເປັນນົກທີ່ໃຊ້ສຽງເນື່ອງນັ້ນ ແລະ ອາໄສຢູ່ເປັນກຸ່ມຄອບຄົວໃຫຍ່. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນົກຊະນິດນີ້ຍັງມີຢ່າງຈຳກັດ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຊະນິດພັນທີ່ສາມາດພົບເຫັນທົ່ວໄປ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມັກເຫັນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຖືວ່າເປັນຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ຢູ່ໃນໂລກ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ແຕ່ສະເພາະຕາມສາຍພູຫຼວງ, ແລະ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ່າເທົ່ານັ້ນ.

55. ນົກແສນດ່າງປີກສີຂຽວ INDOCHINESE GREEN MAGPIE *Cissa hypoleuca* *Cissa hypoleuca*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກທີ່ສວຍງາມຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະເພາະພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ປະເທດໄທ ແລະ ພາກພື້ນອິນໂດຈີນເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີລຳໂຕເປັນສີຂຽວ ປົນດ້ວຍຂອບຕາສີດຳ, ສີບແດງ ແລະ ປີກສີສົ້ມເຫຼືອງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າດົງດິບປະສົມ (ໃນນິລວມທັງປ່າປະສົມກັບໄມ້ປ່ອງ) ໃນລະດັບຄວາມສູງຮອດ 1.500 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ມັນເປັນນົກທີ່ກິນແມງໄມ້ ແລະ ໃຊ້ສຽງເນືອງນັ້ນ. ມັນເດີນທາງເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເປັນທີ່ຫາເຫັນໄດ້ຍາກ ຍ້ອນລັກສະນະຂອງສີຂົນຂອງມັນ. ມັນເຮັດຮັງໃສ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ໄມ້ພຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ປົກກະຕິແມ່ນເຮັດຕາມງາມຕົ້ນໄມ້ ທີ່ມີສາມງ່າ ທີ່ກອດກ້ຽວດ້ວຍເຄືອເຂົ້າ. ນົກໂຕແມ່ນປົກກະຕິອອກໄຂ່ ປະມານ 4 ຫາ 6 ໜ່ວຍ.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ມັກຈະຖືກຍິງໃນເວລາພົບເຫັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນຊະນິດພັນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ກໍຖືວ່າເປັນຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຢູ່ໃນໂລກ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໃນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດບ່ອນທີ່ຮູ້ວ່າມີນົກຊະນິດນີ້ນັ້ນ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ່າ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ.

56. ນົກໄຟ SWINHOLE'S MINIVET *Pericrocotus cantonensis*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຂະໜາດນ້ອຍລຳໂຕບອບບາງຊະນິດນີ້ ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ ນົກໄຟກິນສີໝີນ, ນົກຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ລົງມາຮອດພາກຕາເວັນອອກຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ໃນລະດູໜາວ. ໂຕຜູ້ມີສີສັນຈະແຈ້ງກວ່າໂຕແມ່ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສີນ້ຳຕານໃນສ່ວນເອິກ ແລະ ຕາມຂ້າງ, ໜ້າຜາກສີຂາວ, ມີຫອນ ແລະ ໆອນສີດຳ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າດົງດິບໃບກວ້າງ ແລະ ປ່າປະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສູງຮອດ 1.200 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ມັນກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ, ອາໄສຢູ່ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຝູງໃຫຍ່.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຍ້ອນວ່າໂຕຂອງມັນນ້ອຍ, ແຕ່ມັນຄົງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການສູນເສຍພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍບນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

57. ນົກດຳນ້ຳ ສີນ້ຳຕານໃໝ່ BROWN DIPPER *Cinclus pallasii*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຫ້າວຫັນຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນເຂດໃກ້ຫ້ວຍນ້ຳ ຢູ່ຕາມເຂດພູ ໃນທຳທະວີນອາຊີ ລວມທັງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເບື້ອງຕາເວັນຕົກຮອດພູເຂົາຕິເບດ ແລະ ປະເທດ ອັຟການິສະຖານ. ມັນມີສີບນ້ອຍ ແລະ ສີນ, ໝົດທຸກສ່ວນຂອງລຳໂຕເປັນສີໝີ່ນ. ນົກຊະນິດນີ້ສາມາດລອຍດຳນ້ຳໄດ້ (ຄ້າຍຄືກັບນົກເບັງວິງ), ເພື່ອຊອກຫາແມງໄມ້ຢູ່ພື້ນນ້ຳ. ມັນອາໄສຢູ່ເປັນຄູ່ ເຄື່ອນທີ່ໄປມາຕາມແຫຼ່ງນ້ຳ. ມັນສ້າງຮັງຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ຕາມພູມແຄມນ້ຳ. ນົກໂຕແມ່ ອອກໄຂ່ປະມານ 4 ຫາ 5 ໜ່ວຍ.

Rasmussen and Anderton, 2005.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ. ມັນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນໜ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ. ຈຳນວນຂອງມັນຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອາດບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ສຳຄັນ ຄືຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.

58. ນົກກະຈີບ FUJIAN NILTAVA *Niltava davidi*

Natural history notes



ນົກນ້ອຍ ທີ່ສວຍງາມ ຊະນິດນີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ. ນອກຈາກພາກພື້ນອິນໂດຈີນແລ້ວ, ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຢູ່ຮົງກົງ ແລະ ປະເທດໄທ. ໂຕຜູ້ມີຫຼັງເປັນສີຟ້າທັງໝົດ, ດ້ານທ້ອງເປັນສີແດງຊ້ຳ ແລະ ໜ້າຂອງມັນເປັນສີດຳ. ໂຕແມ່ເປັນສີໝີ່ນແກມສີນ້ຳຕານແກ່ ແລະ ມີຫາງ ແລະ ປີກ ເປັນສີແດງຊ້ຳກ້ອນຂ້າງຄ້າຍສີໝີ່ນ. ມັນເຮັດຮັງຢູ່ໃນປ່າດົງດິບອຸດົມສົມບູນ ໃນຄວາມສູງ 1.700 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ຕາມແຄມອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ຄອງຕ່າງໆ.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ (PARL);

ນົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຖືກລ່າ, ແຕ່ມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳນ້ອຍໆ, ສະນັ້ນການຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳນ້ອຍຕາມທຳມະຊາດແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອອະນຸລັກນົກຊະນິດນີ້.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຖືວ່າເປັນການຍາກໃນການຈຳແນກນົກຊະນິດນີ້ ຈາກນົກຊະນິດໃນໝວດດຽວກັນ, ແຕ່ກໍມີການລາຍງານວ່າມີນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ, ຊຶ່ງອາດເຄື່ອນຍ້າຍມາໃນລະດູໜາວ.

59. GREEN COCHOA *Cochoa Viridis* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ ເປັນພາສາລາວ)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອິນເດຍ ຮອດພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ, ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຫົວຂອງມັນເປັນສີມ່ວງ ແລະ ຂອງມັນເປັນສີມ່ວງຈາງ, ຫຼັງຂອງມັນເປັນສີມື່ນ, ສ່ວນປີກສີດຳ ແລະ ໂຕຜູ້ມີຈຸດດ່າງສີຂາວ ສ່ວນໂຕແມ່ນມີຈຸດດ່າງສີຂາວແກມຂຽວ. ນົກຊະນິດນີ້ພົບເຫັນ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ ແຕ່ 900 ຫາ 2.700 –ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ, ມັນເປັນນົກທີ່ໃຊ້ສຽງບິນແຊວ ແລະ ກິນອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມງໄມ້ –ແລະ ໝາກໄມ້. ມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມຍອດຕົ້ນໄມ້ –ແລະເຮັດຮັງຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ຍ້ອຍ ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ. Rasmussen and Anderton, 2005.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ຍ້ອນມັນເປັນນົກຊະໜາດໃຫຍ່ ຈຶ່ງຕົກເປັນເປົ້າຍິງຂອງນາຍພານ.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

60. JERDON'S BUSHCHAT *Saxicola jerdoni* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ ເປັນພາສາລາວ)

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະໜາດກາງຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ງໃຕ້ ຈາກພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອິນເດຍ ຮອດພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ, ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນົກໂຕຜູ້ມີຫຼັງເປັນສີດຳ ແລະ ຫ້ອງເປັນສີຂາວລ້ວນ. ສ່ວນໂຕແມ່ ເປັນສີໝີນ ແລະ ມີສ່ວນກົ້ນເປັນສີແດງຊ້ຳໝົນ. ມັນເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະ ສາຍນ້ຳໃຫຍ່, ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນບ່ອນເຮັດຮັງຂອງມັນ ໃນລະດູນ້ຳຖ້ວມ ຕາມດອນຕ່າງໆ. ນົກຊະນິດນີ້ມັກບິນເຈັດຕາມທົ່ງຫຍ້າ ເພື່ອຈົບກິນແມງໄມ້. Mackinnon and Phillips, 2000.



ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນອາໄສຢູ່ປະຈຳ ໃນພາກເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ສະຖານະພາບຂອງມັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ, ຄົງຈະມີໜ້ອຍເກີນໄປ ສຳລັບການລ່າຂອງນາຍພານ.

ການແຕ່ງຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ນ.

61. ນົກອ້ຽງຫົວສີເຫຼືອງ *GOLDEN-CRESTED MYNA* *Ampeliceps coronatus*



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ມຽນມາ, ຈີນ ຈົນຮອດພາກໃຕ້ຂອງພາກພື້ນອິນດູຈີນ. ໂຕຂອງມັນເປັນສີດຳ, ມີຫອນຢູ່ໜ້າ ແລະ ຄາງເປັນສີເຫຼືອງຄຳ. ປີກຂອງມັນມີຈຸດດ່າງສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ ແລະ ສົບເປັນສີສົ້ມ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າດົງດິບເຂດລຸ່ມ, ປ່າຜັດໃບຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ເຂດກະສິກຳ ຊຶ່ງຍັງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ຢູ່. ມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມຍອດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຫາກິນໝາກໄມ້ເປັນອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ມັນກໍຍັງກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານນຳດ້ວຍ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ດ້ວຍກັນເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນໝູ່ນ້ອຍໆ. ມັນເຮັດຮັງໄຂ່ໃສ່ຕາມໂກນໄມ້. ມັນປະສົມພັນໃນເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນພຶດສະພາ, ຈຳນວນໄຂ່ຂອງມັນຕົງຈົງຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ, ແຕ່ໄດ້ສັງເກດໃນການລ້ຽງແມ່ນອອກໄຂ່ 4 ໜ່ວຍ. Feare and Craig, 1998.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ຍ້ອນວ່າມັນເປັນນົກທີ່ຫາຍາກ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງມັນ.

ການແຕ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບນົກຊະນິດນີ້. ແຕ່ກໍຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ.

62. BEAUTIFUL NUTHATCH *Sitta Formosa* (ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກຊື່ເປັນພາສາລາວ)



ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ເປັນນົກຊະນິດໃຫຍ່, ໃນເບື້ອງຕາເວັນຕົກມີນົບແຕ່ປະເທດອິນເດຍ ລົງມາຫາປະເທດມຽນມາ ແລະ ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ແມ່ນມີຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ນົກຊະນິດນີ້ບໍ່ຫຼົງກັບຊະນິດອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຍ້ອນສີສັນຂອງມັນ ເຊັ່ນ ມັນມີສີຟ້າແຈ້ງຢູ່ຕາມຫົວທີ່ເປັນສີດຳຂອງມັນ, ມີສີຟ້າຟ້າປະປົນຢູ່ສ່ວນກົ້ນ, ປີກ ແລະ ຫາງ, ມີຄາງສີຂາວ ແລະ ເປັນສີແດງຊ້ຳຢູ່ສ່ວນຫ້ອງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງ, ປ່າດົງດິບໃບກວ້າງ ເຂດພູ (ສູງ 950 ຫາ 2.300 ແມັດ ຈາດລະດັບນ້ຳທະເລ), ສ່ວນໃຫຍ່ມັກພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ເປັນໝູ່. ນົກຊະນິດນີ້ຫາກິນອາຫານຕາມຜາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຕາມຕົ້ນໄມ້ກາຝາກຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມລຳຕົ້ນ ແລະ ງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້. ຮັງຂອງມັນຢູ່ໂກນ ແລະ crevice ໃນຕົ້ນໄມ້. Rasmussen and Anderton, 2005.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (VU)

ນົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລ່າ, ແຕ່ອາດໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຕັດໄມ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະຊາກອນຂອງນົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນຖືກແບ່ງຂອງເປັນເຂດ ແລະ ຫຼຸດລົງເປັນລຳດັບ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍພື້ນທີ່ປ່າດົງດິບ ຊຶ່ງເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ.

ການແຕ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ,

ແຕ່ກໍອາດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ ແລະ ຈຳ້ຈວນ.

63. ນົກແອ່ນ ຫາງແງ່ມຍາວ WIRE-TAILED SWALLOW *Hirundo smithii*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ອາດເປັນນົກແອ່ນທີ່ງາມທີ່ສຸດ ໃນປະເພດນົກແອ່ນທັງໝົດ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ. ມັນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ (ເຂດໃກ້ເສັ້ນສູນສູດ) ຂອງທະວີບອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ. ຫຼັງຂອງມັນ ເປັນສີຟ້າຂາວ ແລະ ທ້ອງເປັນສີຂາວ, ຫົວສີແດງຊ້ຳ. ນົກຊະນິດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບເຫັນຢູ່ຕາມກ້ອນຫີນຢູ່ທ້ວຍ, ແມ່ນນ້ຳ ແລະ ມັນມັກເຮັດຮັງຢູ່ຕາມໜ້າຜາໃກ້ແຄມນ້ຳ. ມັນແຕກຕ່າງກັບນົກແອ່ນຊະນິດອື່ນ ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດຮັງຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ບໍ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ 2 ຫາ 5 ໜ່ວຍ, ມັນຫາກິນຕາມແຄມນ້ຳ ໃກ້ໆກັບຮັງຂອງມັນ.

Turner and Rose, 1994.

ການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ສາມາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ (PARL)

ນົກຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕາມແມ່ນນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ - ແມ່ນນ້ຳດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ນົກຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນົກຊະນິດນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຕ່ມັນກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. (David-Beaulieu 1949-1950, Thewlis et al. 1998).



ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສາຍນ້ຳກະດິງ ເຂດໃຕ້ປາກນ້ຳມວນ ແມ່ນບ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນສຳຄັນຂອງນົກດັ່ງກ່າວ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ບ່ອນອື່ນອີກ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊທີ່ມີນົກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

64. ນົກກະຈົບຫົວເຫຼືອງ YELLOW-VENTED WARBLER *Phylloscopus cantator*

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກວາຍງານຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ຫາທິດໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ທິດເໜືອຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນມີສີແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ມີສີເຫຼືອງແຂກດຳຢູ່ຫົວ ຜ່ານຕາ ແລະ ມີສີເຫຼືອງຢູ່ຄາງ ແລະ ເອິກ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ປ່າໄມ້ປ່າຕຶບ ແລະ ປ່າດົງແຄມນ້ຳ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ເຖິງ 2000 ແມັດ. ມັນຫາກິນຕາມພຸ່ມໄມ້ ແລະ ງ່າໄມ້. ສ່ວນໃຫຍ່ມັນກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ, ມັກພົບເຫັນຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ເປັນຄູ່ ແລະ ຢູ່ເປັນຝຸງໃນລະດູໜາວ. ມັນເຮັດຮັງຢູ່ໜ້າດິນ ໂດຍອາໄສໃບໄມ້ ແລະ ໂກນຂອນໄມ້ ຕາມແຄມນ້ຳ



ການອະນຸລັກ

ຍ້ອນວ່າ ນົກຊະນິດນີ້ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍ ຈຶ່ງຄົງບໍ່ມີການລ່າຫຼາຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຄີຍມີບັນທຶກຢູ່ເຂດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປ້ັນ.

65. GREY LAUGHINGTHRUSH *Garrulax maesi* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)



ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ້ ແລະ ມີເຂດແຜ່ກະຈາຍຈາກຈີນ ໄປສູ່ໂລກ
ຊຶ່ງມີຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ
ຫວຽດນາມ. ມັກອາໄສຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ 600-1700

ແມັດຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ. ມັນເປັນນົກຂະໜາດກາງ ທີ່ມີຂົນນຸ້ມ ແລະ ມີຂາທີ່ແຂງແຮງ.
ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານ, ການປະສົມພັນ,
ແຕ່ກໍອາດຄືກັບນົກທີ່ອາໄສຕາມດິນຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມດິນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ນົກຊະນິດນີ້
ເປັນນົກທີ່ໃຊ້ສຽງເນື່ອງນັ້ນ, ຢູ່ເປັນໝູ່ເຖິງ 12 ໂຕ, ເປັນການເຫັນໄດ້ຍາກ
ຍ້ອນວ່າມັນມັກລີ້ຢູ່ໃນປ່າຕຶບໜາ

<http://en.wikipedia.org/wiki/Laughingthrush>

ການອະນຸລັກ

ເປັນນົກທີ່ຖືວ່າໃກ້ຈະສູນພັນໃນໂລກ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດ
ນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປີ້ນ. ນອກນີ້ ມັນຍັງອາດມີຢູ່ໃນເຂດປ່າປ່ອນອື່ນຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມສາຍພູຫຼວງ.

66. RED-TAILED LAUGHINGTHRUSH *Garrulax milnei* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)



ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ເປັນນົກສະເພາະຖິ່ນຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ,
ມຽນມາ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ກໍ່ພົບເຫັນຢູ່ ໃນເຂດປ່າດົງດິບ,
ປ່າພັນພູ, ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ບາງຄັ້ງຢູ່ຕາມປ່າພຸ່ມຕຶບໜາ.
ມັນເປັນນົກທີ່ສວຍງາມ ມີຫົວ ແລະ ສີບສີດຳ, ລຳໂຕມີສີໝີ່ນຈາງ ແລະ
ຫາງແຊກສີແດງອ່ອນແກມສີດຳ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ

ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານຂອງ ແລະ ການປະສົມພັນຂອງມັນ,
ແຕ່ກໍຄືກັບນົກທີ່ອາໄສຕາມດິນຊະນິດອື່ນໆ ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ຕາມໜ້າດິນເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ມັນເປັນນົກທີ່ໃຊ້ສຽງເນື່ອງນັ້ນ ແລະ ອາໄສຢູ່ເປັນໝູ່ ຊຶ່ງອາດມີເຖິງ 12 ໂຕ,
ຄືງ່າຍການຍາກທີ່ຈະຊອກຫາປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໄສ.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Laughingthrush>

ການອະນຸລັກ

ມັນເປັນນົກທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າມີຢູ່ຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງ ສ ປ
ປ ລາວ ແລະ ຕາມເຂດສາຍພູຫຼວງ.

ການແຜ່ກະຈາຍ ຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ
ໜ້າຈາດ-ນ້ຳປີ້ນ.

67. ນົກປີລົມຫາງສັ້ນ **SHORT-TAILED SCIMITAR BABBLER *Jabouilleia danjoui***

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ເປັນຊະນິດພັນສະເພາະຖິ່ນຂອງສາຍພູຫຼວງ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ແລະ ມັນອາດອາໄສຢູ່ໃນສະເພາະເຂດປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນ. ຫຼັງຂອງມັນມີສີໝົນເຂັ້ມ, ສ່ວນທ້ອງເປັນສີຂາວ ແກມສີນ້ຳຕານຢູ່ເອິກ ແລະ ມີຫາງສັ້ນ. ມັນມີສີບຢາວຫຼາຍ ແລະ ກິ່ງ. ມັນອາໄສຢູ່ຕາມພືດຊັ້ນລ່າງ ຕາມປ່າດົງດິບ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນມັນຢູ່ໃກ້ກັບໜ້າດິນ ຢູ່ຕາມລະດັບຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນ.



ນົກຊະນິດນີ້ກໍຄ້າຍກັບນົກຈຳພວກດຽວກັນນີ້ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫາກິນຕາມໃບໄມ້ຕາມໜ້າດິນ ໂດຍເຂ່ຍຫາກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ.

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຖິ່ນຢູ່ອາໄສ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍພັນ ແມ່ນຍັງມີນ້ອຍ

Eames, June 2001.

ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ

ເປັນຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ;

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ມັນມີເຂດແຜ່ກະຈາຍນ້ອຍ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຂຸດຄົ້ນ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາໄດ້ຮັບລາຍງານ ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປຸ້ນ.

68. ນົກກະຈົບໂຕລາຍ **SPOTTED WREN BABBLER *Spalaeornis formosus***

ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ ຈາກປະເທດເນປານ ຮອດປະເທດຈີນ ແລະ ພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນມີຫາງສັ້ນ ແລະ ມີສີໝົນເຂັ້ມ, ມີເມັດສີຂາວຢາຍຢູ່ທົ່ວໂຕ ແລະ ມີແຊກຫ່າງຢູ່ຕາມປີກ ແລະ ຫາງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມພືດຊັ້ນລ່າງ ໃນເຂດປ່າດົງດິບໃບກວ້າງ ແລະ ປ່າພຸ່ມຊຸ່ມຊື່ນ. ມັນຫາກິນຕາມໜ້າດິນ. ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ມັນປະສົມພັນໃນເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍເຮັດຮັງໃສ່ຕາມໜ້າດິນ ຫຼື ແຄມຫ້ວຍ.



Rasmussen and Anderton, 2005.

ການອະນຸລັກ

ມີການບັນທຶກຢູ່ເລື້ອຍໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ຄິດວ່າຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການລ່າ ເພາະມັນໂຕນ້ອຍ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການບັນທຶກວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ.

69. SOOTY BABBLER *Stachyris herberti* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)



ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ຕາມຜາຫີນຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນໃກ້ກັບຊາຍແດນພາກກາງຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ແຕ່ 50 ຫາ 610 ແມັດຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ. ນົກວິທະຍາສາດ ໄດ້ຄົ້ນພົບນົກຊະນິດນີ້ຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 1920 ໃນເຂດບໍລິເວນທີ່ໃນປັດຈຸບັນເປັນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ. ນົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນອີກ ນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຕຂອງມັນມີສີໝໍ້ນ້ຳເຂັ້ມ, ສ່ວນທ້ອງເປັນສີຂາວ ແລະ ມີສີເປັນສີຂາວເຫຼືອງກ ມັນອາໄສຢູ່ເປັນຝຸງນ້ອຍ. ປັດຈຸບັນ ຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບຖິ່ນຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ການແຜ່ພັນຂອງມັນ.

ການອະນຸລັກ

ເປັນສັດທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ (NT)

ນົກຊະນິດນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການລ່າ ແລະ ການສູນເສຍຖິ່ນຢູ່ອາໄສ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຂດແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນແມ່ນມີໜ້ອຍຢູ່ໃນໂລກ, ສະນັ້ນການສ້າງຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ພູຫີນປູນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະມັດລະວັງ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການບັນທຶກຢູ່ເຂດພູຫີນປູນ ບ້ານນາດີ ເມືອງວຽງທອງ, ເຂດພູຫີນປູນຕາມສາຍພູຫຼວງ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 8 ໃກ້ກັບຫຼັກຊາວ ແລະ ຕາມເຂດພູຫີນປູນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ.

70. SPECTACLED FULVETTA *Alcippe ruficapilla* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)



ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະນິດນີ້ມີຂະໜາດກາງ ພົບເຫັນຢູ່ ນັບແຕ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງພູຕິເບ ລົງມາພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ພາກພື້ນຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຫົວຂອງມັນເປັນສີແດງຊ້ຳ ແລະ ມີຄີວສີຂາວ, ສ່ວນທ້ອງເປັນສີຂາວໝົ່ນ, ຫຼັງ ແລະ ຫາງເປັນສີນ້ຳຕານ-ໝົ່ນ.

ມັນອາໄສຢູ່ໃນລະດັບສູງ 1250 ຫາ 2500 ແມັດ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ.

ການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ດັງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ.

ການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໜຶ່ງໃນຈຳນວນເຂດຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ ແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ.

71. RUFOUS-THROATED FULVETTA *Alcippe rufogularis* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)

ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກຊະໜາດໃຫຍ່ຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ໃນພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນມີທາງສັນ ແລະ ເປັນສີໝີນ, ມີຊແກສິດຳ, ພື້ນຫ້ອງເປັນສີຂາວ ແລະ ມີແຖບຢູ່ກ້ອງຄາງ. ມັນເປັນນົກທີ່ຫາກິນຕາມໃບໄມ້ທີ່ປົກຄຸມໜ້າດິນ ໃນເຂດປ່າດົງດິບໃບກວ້າງ, ປ່າພື້ນພູ ແລະ ປ່າໄມ້ປ່ອງ. ມັນຫາເຂົ້າໄມ້ຕາມໜ້າດິນ ເພື່ອຫາອາຫານ. ໂດຍປົກກະຕິຈະພົບເຫັນຢູ່ເປັນຄູ່, ເຮັດຮັງຢູ່ຕາມພູມໄມ້ຕາມໜ້າດິນ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງ ຕ່ຳກວ່າ 1 ແມັດ.



ການອະນຸລັກ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜ່ານມາພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຍໆ, ອາດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຜ່ານມາຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳຈາດ-ນ້ຳປິ່ນ.

72. LESSER RUFOUS-HEADED PARROTBILL *Paradoxornis astrosuperciliaris* (ບໍ່ທັນຮູ້ຊື່ເປັນພາສາລາວ)

ຂໍ້ມູນທາງທຳມະຊາດ

ນົກປະເພດນົກແກ້ວຂະໜາດກາງຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ ນັບຈາກປະເທດອິນເດຍ, ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ ແລະ ພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນມີສີຂາວໝີນຄ້າຍສີນ້ຳນົມ, ຫົວຂອງມັນເປັນສີແດງຊຳ ແລະ ເປັນສີແດງຈາງລົງມາຫາລຳໂຕ. ໃນພາກເໜືອຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມັນອາໄສຢູ່ຕາມເຂດປ່າໄມ້ປ່ອງ ຫຼື ປ່າດົງດິບໃບກວ້າງ. ນົກຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ເປັນໝູ່ນ້ອຍ ປະກອບດ້ວຍ 6 ຫາ 12 ໂຕ, ຫາກິນແມງໄມ້ ແລະ ແກ່ນໄມ້ ຕາມໃບໄມ້ປ່ອງ. ເຄີຍພົບເຫັນນົກຊະນິດນີ້ ປະພັນຢູ່ກັບນົກຊະນິດອື່ນ. ມັນປະສົມພັນໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ ຫາເດືອນກໍລະກົດ ໂດຍເຮັດຮັງຕາມພູມໄມ້ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 2 ແມັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນ. Rasmussen and Anderton, 2005.



ກອະນຸລັກ

ຍ້ອນວ່ານົກຊະນິດນີ້ ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກ.

ການແຕ່ງຈະຈາຍຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ນົກຊະນິດນີ້ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ.

1.1 ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ:

73 ລິ້ນຈີນ ຫລື ລິ້ນງົວ ແລະ ລິ້ນຊັນດາ ຫລື ລິ້ນຄວາຍ (Chinese Pangolin)

Manis pentadactyla and (Sunda Pangolin) *Manis javanica*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ລິ້ນມີຮ່າງກາຍຍາວ ແລະ ບາງ, ທົ່ວໂຕຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍເກັດ. ເກັດຕິດຢູ່ໃນສັນຫນັງທີ່ໜາ ຊຶ່ງເປັນຈຸດກຳເນີນຂອງເກດ; ອາໄສຢູ່ໃນປ່າໄມ້, ຝຸ່ມໄມ້ທີ່ຕີບໜາ ຫລື ບາງຄັ້ງກໍ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ປະເທດທີ່ມີປ່າໄມ້ເກີດປະສົມກັບທົ່ງຫຍ້າ, ແລະ ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມັກຢູ່ເປັນຄູ່. ລິ້ນເປັນສັດທີ່ມັກອອກເຄື່ອນໄຫວຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ, ແລະ ຈະນອນຢູ່ໃນໂຄນຕາມພື້ນດິນໃນເວລາກາງເວນ. ເປັນສັດທີ່ບໍ່ມີແຂ້ວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດໂດຍອາໄສລິ້ນທີ່ຍາວ ເພື່ອກິນມິດ, ປວກ ແລະ ແມງໄມ້. ຕົວແມ່ຈະອອກລູກພຽງ 1 ໂຕ/ປີ.

ການອະນຸລັກ:

M. pentadactyla - NT; *M. Javanica* - NT ; CA II

ລິ້ນເປັນສັດທີ່ມີການຄ້າຂາຍຫລາຍທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເຊື່ອຖືກັນວ່າ ເກັດ ແລະ ເລືອດຂອງລິ້ນເປັນຢາ. ການຄ້າຂາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜິດລະບຽບກົດໝາຍ, ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັດການເປັນຢ່າງດີ ແລະ ລິ້ນທີ່ຍັງມີຊີວິດບາງຄັ້ງຖືກຂົນສົ່ງໄປເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ປະມານ 100 ໂຕ ອອກໄປທາງບໍລິຄຳໄຊ ຫາ ສສ ຫວຽດນາມ. ເພາະວ່າ ລິ້ນເປັນສັດທີ່ຂະຫຍາຍພັນຂ້ອນຂ້າງຊ້າ. ການຄ້າອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການສູນພັນຂອງລິ້ນຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕ້ານການລ່າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖືເອົາການອະນຸລັກລິ້ນເປັນບັນຫາສຳຄັນ.

ການປະກົດມີລິ້ນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ລິ້ນອາດຈະປະກົດມີຢູ່ທົ່ວແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ໜຶ່ງ ຫລື ສອງຊະນິດພັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ນ້ຳຈັດ, ນ້ຳປັນ.

74 ລົງລົມທຳມະດາ ແລະ ລົງລົມ NORTHERN SLOW LORIS *Nycticebus coucang* INTERMEDIATE LORIS AND PYGMY LORIS *Nycticebus pygmaeus*



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ມີລົງລົມຢູ່ປະມານ 3 ຊະນິດພັນ, ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ. ມີພຽງສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ, ຫລື ອານາເຂດຂອງພວກມັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ລົງລົມມີຂະໜາດຄວາມຍາວແຕ່ 265 - 380 ມມ ໃນຂະນະທີ່ລົງລົມ ມີຂະໜາດ 180 - 210 ມມ; ມີຂົນສັ້ນໜາ ແລະ ຂົນມີສີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ແລະ ເຖົາ ໄປຈົນເຖິງ ສີ ນ້ຳຕານແດງຊ້າ. ປົກກະຕິແລ້ວ ລົງລົມ ຈະສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າໄມ້ ຫລື ປ່າໄມ້ປ່ອງຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ມັກອາໄສຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ອອກຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນຕາມເທິງຕົ້ນໄມ້. ລົງລົມ ມັກນອນຢູ່ຕາມກົງ, ງ່າໄມ້ ຫລື ຢູ່ຕາມຝຸ່ມໃບໄມ້ທີ່ຕີບໜາໃນເວລາກາງເວນ. ອາຫານຂອງລົງລົມໄດ້ແກ່ຈຳພວກ ຫອຍ, ແມງໄມ້, ສັດເລືອຄານຂະໜາດນ້ອຍ, ນົກ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໝາກໄມ້. ຕາມປົກກະຕິຈະມີລູກພຽງໂຕດຽວ, ແລະ ແມ່ຂອງມັນຈະເອົາລູກນ້ອຍໃສ່ຫລັງ.

ການອະນຸລັກ:

N. Coucang - DD; *N. pygmaeus* - VU; CA II

ການລ່າລົງລົມ ອາດຈະບໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ບາງພາກໄດ້ມີການຊີ້ - ຂາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງ. ຜູ້ຂາຍຢາພື້ນເມືອງຢູ່ຕະຫລາດເຊົ້າ ໄດ້

ວາງຂາຍໜັງລົງລົມ ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ

ການປະກົດມີລົງລົມຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ລົງລົມອາດຈະມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຍົກເວ້ນບໍລິເວນເຂດສູງ. ຢູ່ເຂດນ້ຳຈວນ ໄດ້ມີການ ຍັງຢືນວ່າມີປະຊາກອນລົງລົມອາໄສຢູ່.

75 ລົງກັງ (Northern Pig - tailed Macaque) *Macaca nemestrina*

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນລົງທີ່ມີຂະໜາດກາງ ມັກເຄື່ອນຍ້າຍໄປ - ມາຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຍັງບ່ອນອື່ນໆ ຫລາຍກວ່າທີ່ຈະ ຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ບາງຄັ້ງອາດຈະພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນເວລາພຽງ 2 - 3 ເດືອນ. ຕາມປົກກະ ຕິ ເປັນລົງທີ່ມີສັນຕິທານເຫລືອງຢູ່ສ່ວນເທິງ ແລະ ມີສີທີ່ຈາກກວ່າຢູ່ສ່ວນລຸ່ມ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລົງ ບາງຊະນິດແມ່ນຢູ່ຕົ້ນໄມ້. ພວກມັນຈະເຄື່ອນໄຫວໄປ - ມາເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໆ. ຊຶ່ງພວກມັນເປັນຊະນິດ ພັນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຕ່ຳເປັນຕົ້ນຕໍ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍມັກອາໄສຢູ່ເຂດປ່າດົງດິບຕຶບໜາ, ບ່ອນທີ່ສາມາດ ຊອກຫາແກ່ໄມ້, ໝາກໄມ້ກິນໄດ້ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍກິນສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ. ລົງຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວຈະ ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນສປປ ລາວ.

ການອະນຸລັກ:

VU; CA II

ມັກອາໄສຢູ່ຕາມຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເຂດຕ່ຳ, ບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດສຸມໃນການສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດຈາກມະນຸດ - ຊຶ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພໃນລະດັບສູງຂອງປະຊາກອນ ລົງລົມ.

ການປະກົດມີລົງກັງຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ.

76 ລົງອາຊາມ (Assamese Macaque) *Macaca assamensis*

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ເປັນລົງຂະໜາດກາງ ຈະປະກົດມີຢູ່ແຕ່ໃນ ປະເທດ ເນປານ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປ ຈີນ ຈີນມາ ຮອດເຂດອາຊີຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້. ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າງກັບລົງກັງ, ຊຶ່ງມັກອາໄສຢູ່ຕາມພູເຂົາ, ຈະ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນປ່າເຄິ່ງເຂດຮ້ອນ ຫລື ຕາມປ່າດົງດິບ ໂດຍທົ່ວໄປມັກຈະພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຫ່າງຈາກນ້ຳທະເລ 2,000 ແມັດ ຫລື ຫລາຍກວ່ານັ້ນ. ມັກຊອກຢູ່ຫາກິນຕາມ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ, ແຕ່ຈະອາໄສຢູ່ຕາມພື້ນດິນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝຸງແຕ່ 10 - 100 ໂຕ. ອາຫານຂອງພວກມັນໄດ້ແກ່ຈຳພວກ ໝາກໄມ້, ເມັດເຂົ້າ, ສາລີ, ໃບໄມ້ ແລະ ຕາໄມ້ທີ່ ປົ່ງໄໝ້, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍກິນພວກ ແມງໄມ້ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫລັງຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມທີ່ພວກມັນ ສາມາດຫາໄດ້. ຕາມປົກກະຕິ ລົງແມ່ຈະອອກລູກເທື່ອລະໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

VU; CA II

ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບລົງທຸກຊະນິດ, ມັນຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຈາກການລ່າ

ການປະກົດມີລົງອາຊາມຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ສາມາດພົບເຫັນລົງຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ່ັນ.

77 ລົງວອກ (Rhesus macaque), *Macaca mulatta*



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນລົງທີ່ມີຂະໜາດກາງ ປະກົດມີຢູ່ໃນອານາເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຈາກ ທິດຕາເວັນອອກຂອງ ປະເທດ ປາກີສະຖານ ມາເຖິງ ເຂດປາຊີຟິກ ຈົນມາຮອດທາງທິດເໜືອຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ພວກມັນເຄື່ອນໄຫວທາງກິນຕາມພື້ນດິນ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ບໍ່ມັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຫາກິນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້. ຈາກການບັນທຶກກ່ຽວກັບລົງຊະນິດນີ້ຂອງສປປ ລາວ ຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກມັນມີການພົວພັນຢ່າງສະນິດແໜ້ນກັບ

ແມ່ນ້ຳ. ພວກມັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ຕາມບໍລິເວນໄກ້ຄຽງກັບບ່ອນທີ່ມະນຸດຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຊຶ່ງກໍ່ຄ້າຍຄືກັບລົງຊະນິດອື່ນໆ ທົ່ວໄປ, ເປັນລົງທີ່ມັກກິນພວກພືດ, ກິນໝາກໄມ້, ເມັດເຂົ້າ, ສາລີ, ໃບໄມ້ ແລະ ຕາໄມ້ທີ່ປົ່ງໄໝ້, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ກິນຈຳພວກແມງໄມ້ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້. ພວກມັນມັກອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງນ້ອຍສຸດແຕ່ 8 ໂຕ ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງຝູງໃຫຍ່ສຸດ 180 ໂຕ. ຕາມປົກກະຕິ ລົງແມ່ຈະອອກລູກພຽງໂຕດຽວ.

ການອະນຸລັກ:

NT; CA II

ເນື່ອງຈາກວ່າ ລົງຊະນິດດັ່ງກ່າວມັກຈະຖືກພົບເຫັນຢູ່ຕາມ ລຽບແຄມແມ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ມະນຸດມັກເດີນທາງໄປ - ມາ ແລະ ອາໄສຢູ່, ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ລົງຊະນິດນີ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງຈາກການລ່າ ແລະ ຄວາມກົດດັນປະເພດຕ່າງໆ ຈາກມະນຸດ ຫລາຍກວ່າລົງຊະນິດອື່ນໆ.

ການປະກົດມີລົງວອກຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີ ສາມາດພົບເຫັນລົງຊະນິດດັ່ງກ່າວຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

78 ລົງ ທີ່ບໍ່ມີຊື່ (Bear Macaque), *Macaca arctoides*

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນລົງທີ່ມີຂະໜາດປານກາງ ປະກົດມີຢູ່ນັບແຕ່ທັງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ຫາ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດສປ ຈີນ ຈົນມາຮອດທາງໃຕ້ສຸດຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພວກມັນອາໄສ ແລະ ຊອກຢູ່ທາງກິນຕາມພື້ນດິນເປັນຕົ້ນຕໍ. ພວກມັນອາໄສຢູ່ປ່າໄມ້ຫລາຍປະເພດ, ຈາກປ່າພື້ນພູໄປຈົນເຖິງປ່າປະສົມຜັດປ່ຽນໃບ ແລະ ປ່າດົງດິບທີ່ສົມບູນ, ແລະ ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດພູເຂົາ ຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລະດູການຈາກເຂດພູເຂົາແຫ່ງໜຶ່ງໄປຫາແຫ່ງອື່ນ. ຄ້າຍຄືກັນກັບລົງຊະນິດອື່ນໆ, ເປັນລົງທີ່ມັກກິນພວກພືດ, ກິນໝາກໄມ້, ເມັດເຂົ້າ, ສາລີ, ໃບໄມ້ ແລະ ຕາໄມ້ທີ່ປົ່ງໄໝ້, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ກິນຈຳພວກແມງໄມ້ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້. ພວກມັນມັກອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງແຕ່ 20 ໂຕ ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງ 100 ໂຕ, ຕາມປົກກະຕິຈະມີໂຕຜູ້ ເປັນຫົວໜ້າຝູງ. ລົງແມ່ຈະອອກລູກພຽງໂຕດຽວ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:

VU; CA II

ການປະກົດມີລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ລົງຊະນິດນີ້ຖືກບັນທຶກວ່າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

79 ລົງ ???????.(Lao Leaf Monkey) *Trachypithecus laotum*

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ຊະນິດພັນນີ້ແມ່ນສາຍພັນໜຶ່ງຂອງພວກ “ໂຄ່ງ” ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລົງຊະນິດນີ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເປັນຊະນິດພັນທີ່ມີຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂັ້ນຕ່ຳກວ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທັງໝົດຂອງລົງຊະນິດນີ້ ອາໄສຢູ່ໃນສປປ ລາວ ຫລື ສສ ຫວຽດນາມ (ຫລືຢູ່ສ່ວນນ້ອຍໆໜຶ່ງທາງຕອນໃຕ້ຂອງສປ ຈີນ). ໂດຍລວມ ລົງຊະນິດນີ້ຈະມີສີດຳເປັນບໍລິເວນກວ້າງ, ໜ້າຜາກສີຂາວ. ມັກອາໄສຢູ່ຕາມພູຫີນປູນ ແລະ ໄກ້ໆກັບປ່າໄມ້ເປັນພິເສດ; ພວກມັນມັກກິນໝາກໄມ້ ແລະ ໃບໄມ້ ທີ່ຢູ່ໄກ້ໆປ່າ ແລະ ຈະກັບຄືນມາຫາຝູງ ເພື່ອນອນຮ່ວມກັນໃນເວລາກາງຄືນ ທີ່ໜ້າຜາ ຕາມພູຫີນປູນ.

ການອະນຸລັກ:

DD

ໃນທົ່ວໂລກສາມາດຮັບຮູ້ລົງຊະນິດນີ້ວ່າມີຢູ່ສະເພາະແຕ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຂອງສປປ ລາວ, ຊຶ່ງປະຊາກອນຂອງພວກມັນຕົກຢູ່ໃນການສ່ຽງໄພສູງຈາກການລ່າ ແລະ ການສູນເສຍ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ


ການປະກົດມີລົງຊະນິດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ລົງຊະນິດນີ້ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ສະເພາະແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນທາງທິດຕາເວັນຕົກໄກ້ໆກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

80 ລົງ ???????. (Phayre's Leaf Monkey) *Trachypithecus phayrei*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ລົງຊະນິດນີ້ຈະປະກົດມີຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອິນດູຈີນ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຂອງປະເທດ ອິນເດຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງມີຂໍ້ມູນພຽງໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສປປ ລາວ ຫລື ສສ ຫວຽດນາມ. ເປັນລົງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດ ປານກາງ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສີ ນ້ຳຕານ, ສີເຖົ້າແກ່ ຫລື ສີດຳ. ຢູ່ບໍລິເວນຕາເວັນຕົກສີຂາວ; ໂດຍທົ່ວໄປ ພວກມັນມັກອາໄສຢູ່ບໍລິເວນປ່າໄມ້ເຂດສູງ ຫ່າງໄກຈາກມະນຸດ ແລະ ມັກກິນໃບໄມ້, ດອກໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້. ພວກມັນຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງແຕ່ 10 ຫາ 30 ໂຕ/ຝູງ; ຕາມປົກກະຕິລົງແມ່ ຈະອອກລູກພຽງໂຕດຽວ/ຄັ້ງ.



ການອະນຸລັກ:

ARL; CA II

ໃນປະເທດ ອິນເດຍ, ປະຈຸບັນ ລົງຊະນິດນີ້ແມ່ນຫາຍາກ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຄວາມກົດດັນຈາກການລ່າ ແລະ ການຫລຸດລົງຂອງປ່າໄມ້ທີ່ເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເໝາະສົມຂອງພວກມັນ. ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນລະດັບໂລກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ຄາດວ່າປະຊາກອນຂອງພວກມັນຍັງມີຈຳນວນຫລາຍຢູ່

ການປະກົດມີລົງຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ປະຊາກອນສັດຊະນິດນີ້ຈຳນວນຫລາຍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ແລະ ຕາມບໍລິເວນໄກ້ຄຽງກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ. ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ປະຊາກອນສັດຊະນິດນີ້ບາງສ່ວນຈະປະກົດຢູ່ຢ່າງກະແຈກກະຈ່າຍໃນປ່າໄມ້ຂອງ

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

81 ຄ່າງຂາແດງ. (Red - Shanked Douc Langur) *Pygathrix nemaeus*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:



ສັດຊະນິດນີ້ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອິນດູຈີນ. ພວກມັນມັກອາໄສຢູ່ຕາມປ່າເຂດຝົນ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 2,000 ແມັດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຫົວຂອງມັນຈະມີສີນ້ຳຕານ, ໜ້າມີສີເທລືອງອ່ອນ ແລະ ແກ້ມມີສີຂາວ; ລຳໂຕມີສີຂີ້ເຖົາ, ຂາໂຕ້ ແລະ ຫາງມີສີຂາວ ແລະ ແຂນດ້ານເທິງ, ຂາ ແລະ ຕີນມີສີດຳ; ແຂນດ້ານໜ້າມີສີຂາວ ແລະ ຂາດ້ານລຸ່ມມີສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ; ເປັນສັດທີ່ອາໄສ ແລະ ຫາກິນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ໃນເວລາກາງເວນ, ມັກກິນໃບໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ. ມັກອາໄສຢູ່ລວມກັນເປັນຝູງ ຕາມປົກກະຕິຈະມີປະມານ 50 ໂຕ/ຝູງ ຫລື ອາດຫລາຍກວ່ານັ້ນ; ໂຕແມ່ຈະອອກລູກພຽງໂຕດຽວ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:


EN; CA I

ເປັນຊະນິດພັນທີ່ຫວງຫ້າມ, ຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຢ່າງໜັກຈາກການລ່າ, ປະຊາກອນທັງໝົດຂອງສັດຊະນິດນີ້, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກໃນລະດັບໂລກ.

ການປະກົດມີຄ່າງຂາແດງຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເຂດຂະຫຍາຍທາງທິດເໜືອຂອງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ອາດຈະເປັນອານາເຂດຂອງປະຊາກອນ ຄ່າງຂາແດງ ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ຊຶ່ງສັດຊະນິດນີ້ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທາງແຂວງພາກເໜືອເຊັ່ນ: ຫົວພັນ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ໂດຍສະເພາະ ມັກຈະຖືກພົບເຫັນຢູ່ຕາມບໍລິເວນສາຍພູຫລວງ ແລະ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

82 ທະນີແກ້ມຂາວ (White - Cheeked Crested Gibbon) *Hylobates leucogenys*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ທະນີຊະນິດນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຖືກຢັ້ງຢືນວ່າປະກົດມີຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຕ່ຊະນິດທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ ທະນີແກ້ມຂາວທີ່ສຸດ. ຊຶ່ງບໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບທະນີຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນຂອງທະນີ, ທະນີເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອານາເຂດແບບເປັນຝູງນ້ອຍໆ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພວກມັນຈະຢູ່ສະເພາະແຕ່ເປັນຄອບຄົວມີ ໂຕຜູ້, ໂຕແມ່ ແລະ ລູກ. ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນແມ່ນຢູ່ເຂດທີ່ມີລົມມ່ລະສຸມ ແລະ ເຂດປ່າດົງດິບ, ຕົ້ນຕ່ຳຈະຢູ່ບໍລິເວນຕ່ຳຕາມພູ. ທະນີເປັນສັດທີ່ມີຄູ່ພຽງໂຕດຽວ, ຊຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກມັນ. ທະນີແກ້ມຂາວໂຕຜູ້ມີສີດຳ ແລະ ໂຕແມ່ມີສີຂີ້

ເຖົາ ຫລື ສີນ້ຳຕານ ທອງ. ແລະ ມີຂົນເປັນວົງສີຂາວເປັນບໍລິເວນກວ້າງຢູ່ແກ້ມຂອງມັນ. ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບທະນີຊະນິດອື່ນໆ ໃນຕະກູນຂອງທະນີຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ. ທະນີເປັນສັດທີ່ບໍ່ມີຫາງ. ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຫາກິນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ດ້ວຍການໃຊ້ແຂນທີ່ຍາວທັງສອງຂ້າງ ໃນການຫ້ອຍໂຫນໄປຕາມກົງໄມ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ທະນີເປັນສັດທີ່ກິນໝາກໄມ້, ໃບໄມ້, ພືດ ແລະ ແມງໄມ້. ໂຕແມ່ອອກລູກພຽງໂຕດຽວ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:

DD

ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ທະນີຊະນິດນີ້ຈະປະກົດຢູ່ທາງຕອນເໜືອສຸດຂອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ຕາມສັນຂອງ ສາຍພູຫລວງ ທາງທິດເໜືອ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນຂອງພວກມັນເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ. ຖ້າຫາກມີການຕັດແຍກເອົາຊະນິດພັນທີ່ຢູ່ທາງທິດເໜືອ ແລະ ຖ້າຂອບເຂດຊາຍ ແດນທາງທິດໃຕ້ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າ, ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງທະນີຊະນິດ ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຖ້າຈະມີພຽງແຕ່ທະນີແກ້ມເຫລືອງ ຍັງ ເຫລືອຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງປະຊາກອນຂອງພວກມັນກໍ່ຈະຍັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກໃນ ລະດັບສາກົນ. ຈາກການສັງເກດ ຕີລາຄາໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ແນະນຳວ່າ ປະຊາກອນຂອງທະນີຖືກຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການລ່າຫລາຍເກີນໄປ, ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ມີຄວາມໜ້າແໜ້ນຍັງເຫລືອຢູ່ສະເພາະ ແຕ່ໃນເຂດຫວງຫ້າມໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ. ຊຶ່ງຢູ່ໃນເຂດຫວງຫ້າມນີ້, ເບິ່ງຄືຈັງວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນຍັງຄົງ ມີຈຳນວນເທົ່າກັນກັບ ຈຳນວນທີ່ໄດ້ມີການສຳຫລວດໃນ ເມື່ອກ່ອນ.


ການປະກົດມີທະນີແກ້ມຂາວຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ທະນີຊະນິດນີ້ ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານະ ພາບຂອງມັນຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ.

83 ໝາໃນ. (Dhole) *Cuon alpinus*.

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການພົບເຫັນ ໝາໃນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນ ອອກສູ່ງໃຕ້ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດທະເລ ຊາຍ, ແຕ່ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີ ຈຳນວນຫລຸດລົງ. ເປັນໝາໃນທີ່ມີຂະໜາດກາງທີ່ມີສັງຄົມ, ອາໄສຢູ່ ລວມກັນເປັນກຸ່ມ ແລະ ລວມກັນໃນການລ່າເນື້ອຕາມພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່. ມີສີແດງ ຫລື ສີນ້ຳຕານ; ເປັນສັດທີ່ມີການປະສົມພັນຕະຫລອດປີ ຕາມປົກກະຕິຈະເກີດລູກຄັ້ງລະປະມານ 4 - 9 ໂຕຕາມ ໂກນໃຕ້ດິນ ຫລື ໃນຖ້ຳ. ພວກມັນອອກລ່າເນື້ອເປັນກຸ່ມໃນເວລາກາງເວັນ, ຊຶ່ງອາຫານ ຫລື ເຍື່ອຂອງມັນຄືພວກກວາງ, ຟານ, ພູ ແລະ ກະຕ່າຍ. ຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນຂອງສປປ ລາວ, ໃນປະຈຸ ບັນ ເສື້ອໂຄ່ງຄືສັດທີ່ຊ່ວຍໃນການຫລຸດຈຳນວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນ ຕາມການລາຍງານ ໝາ ຈອກ ຄືສັດທີ່ມັກລ່າສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຫລາຍທີ່ສຸດ.



ການອະນຸລັກ:

EN

ໝາໃນເປັນສັດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການລ່າດ້ວຍບືນ, ເຊິ່ງດຽວກັນຖິ້ມທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ ຖືກ ບຸກລຸກທຳລາຍ. ໃນສະຖານະພາບຂອງໂລກ ສັດຊະນິດນີ້ຖືກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງໜັກ ເພາະວ່າ ຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງເດີນທາງເປັນໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າໃນປະຈຸບັນຍັງມີ ໝາ ໃນຢູ່ປະມານ 2,500 ໂຕໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງສປປ ລາວກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 2 - 3 ປະເທດທີ່ຍັງມີປະ ຊາກອນຂອງໝາຊະນິດດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ສປປ ລາວຈຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຸດໃນ ລະດັບໂລກ ໃນການອະນຸລັກຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ.

ການປະກົດມີໝາໃນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ອາດຈະມີການພົບເຫັນສັດຊະນິດດັ່ງກ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ໝາໃນ ໄດ້ຖືກບັນ ທິນວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າ

84 ໝີຄວາຍ (Asiatic Black Bear) *Ursus thibetanus*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:



ໝີຄວາຍເປັນສັດປ່າທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວ ອາຊີເໜືອ, ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ເປັນສັດທີ່ມີສີດຳ ແລະ ມີຫົວຂະໜາດໃຫຍ່ ມີລຳໂຕທີ່ ໃຫຍ່, ຂາໃຫຍ່. ຢູ່ໜ້າເອິກມີຂົນສີຂາວ ຫລື ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ເປັນຮູບໂຕ “ວີ”. ມັນ ມັກອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີພູມສັນຖານເປັນພູ, ມີປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ແລະ ເປັນສັດທີ່ມີ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້. ອາຫານ

ຂອງພວກມັນມີຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດ ຈົນເຖິງແມງໄມ້, ສັດເລືອ ຄ້າງໜຶ່ງ 2 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

ARL; VU; CA II

ໝີຄວາຍຊະນິດນີ້ ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າ ຈະອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດໃນປ່າໄມ້.

ການປະກົດມີໝີຄວາຍຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໝີໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນຂອງແຂວງ, ແຕ່ມັກອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງ ມະນຸດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນບໍ່ໜາແໜ້ນ. ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

85 ເໝືອຍ. (Sun Bear) *Ursus malayanus*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເໝືອຍເປັນສັດປ່າທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຕະກູນໝີ ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນພາກໃຕ້ຂອງສປ ຈີນ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນ ອອກສຽງໃຕ້. ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລຳຕົນບໍ່ເກີນ 1,4 ແມັດ ແລະ ມີຂົນ ສີດຳສັ້ນໆ, ແລະ ມີຂົນສີຂາວ ຫລື ສີນ້ຳຕານອ່ອນເປັນຮູບໂຕ “ຢູ” ຢູ່ໜ້າເອິກ, ຄ້າຍຄືກັນກັບໝີຄວາຍ. ເປັນສັດທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຕາມປ່າທີ່ມີຄວາມສູງ ລະດັບຕ່າງໆ. ມັກອອກເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ, ກິນອາຫານ

ທຸກຊະນິດນັບແຕ່ ຊາກສັດຕາຍ ໄປຈົນຮອດໝາກໄມ້ສຸກປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ພືດ; ເໝືອຍຍັງ ອ່ອນສາມາດມີລູກພຽງ 2 ໂຕ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:

ARL; CA I

ເໝືອຍຊະນິດນີ້ ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າ ຈະອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດໃນປ່າໄມ້.

ການປະກົດມີເຢູ່ໃນເໝືອຍຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເໝືອຍຈະຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນທົ່ວແຂວງ, ແຕ່ມັກອາໄສຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນຢູ່ ຂອງມະນຸດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນບໍ່ໜາແໜ້ນ. ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

86 ຈອນຟອນສີນ້ຳຕານ, (Stripe - Backed Weasel), *Mustela strigidorsa*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ມີຂໍ້ມູນໜ້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບສັດຊະນິດນີ້, ພວກມັນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າໄມ້ແຕ່ເຂດ ບູຖານ ຈົນມາຮອດສສ ຫວຽດນາມ, ຊຶ່ງມີການບັນທຶກລົງໃນເອກະສານພຽງ 2 - 3 ສະບັບ. ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ລະບຸວ່າມີສັດຊະນິດດັ່ງກ່າວປະກົດຢູ່ທົ່ວໄປ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນສັດທີ່ມີສີນ້ຳຕານດຳ, ແກ້ມ, ຄ່າງ ແລະ ຄໍມີສີເທລືອງອ່ອນ. ມີລາຍລູກສອນສີຂາວຢູ່ກາງຫລັງ. ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນປ່າດົງດິບທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລແຕ່ 1,200 - 2,200 ແມັດ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບອາຫານ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການສືບພັນຂອງສັດຊະນິດນີ້ແມ່ນໜ້ອຍຫລາຍ,



ການອະນຸລັກ:

VU

ການປະກົດມີຈອນຟອນສີນ້ຳຕານຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໄດ້ມີການພົບເຫັນສັດຊະນິດນີ້ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຈະປະກົດມີຢູ່ບໍລິເວນເຂດປ່າໄມ້ເທິງພູເຂົາ.

87 ໝູລື້ງ, (Hog Badger) *Arctonyx collaris*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ສັດຊະນິດນີ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຂດສູງຂອງປະເທດສປ ຈີນ ລົງມາເຖິງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ມຽນມາ, ສປປ ລາວ ແລະ ທາງພາກເໜືອຂອງສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ມັນແມ່ນສັດທີ່ມີຮູບຮ່າງອ່ອນ ທາງສັ້ນ. ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໝູປ່າ ຊຶ່ງມີຫູ ແລະ ຕານ້ອຍ, ຂົນສັ້ນຢູ່ທົ່ວຕີນໂຕ ທີ່ມີສີເທລືອງອ່ອນ, ນ້ຳຕານອ່ອນ, ຂີ້ເຖົາອ່ອນ ແລະ ສີດຳ; ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ກາງເວນ ແລະ ມັກອາໄສຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຕາມປົກກະຕິອາໄສ ແລະ ອອກຫາກິນຕາມລຳພັງຕົວດຽວ; ອາຫານປະກອບດ້ວຍ ຮາກໄມ້, ຂີ້ກະເດືອນ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຂະໜາດນ້ອຍຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຕຂີ້ເຂັບ, ບັງກີ. ການປະສົມພັນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ເມສາ (4) ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ (9) ແລະ ຈະເກີດລູກໃນເດືອນ ກຸມພາ (2). ໂຕທີ່ຍັງອ່ອນຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 2 ຫາ 3 ໂຕ/ຄັ້ງ.



ການອະນຸລັກ:

LKL

ໃນສປປ ລາວ (ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ຢູ່ໃນອິນດູຈີນ), ທີ່ສັດຊະນິດນີ້ອາໄສຢູ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກຫລຸດລົງ ສາເຫດອາດມາຈາກການລ່າ, ໂດຍສະເພາະ ການລ່າແບບໃຊ້ໝາພານ. ສຳລັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວນານ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປະຊາກອນຂອງ ໝູລື້ງ ຕ້ອງຮັກສາຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນໄວ້ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກການລ່າພວກມັນ.

ການປະກົດມີໝູລື້ງຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໝູລື້ງ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນ.

88 ນາກນ້ຳໃຫຍ່ທຳມະດາ ແລະ ນາກນ້ຳໃຫຍ່ຂົນລຽບ. (Eurasian Otter) *Lutra*

Lutra and (Smooth - Coated Otter) *Lutrogale perspicillata*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ນາກນ້ຳທັງສອງຊະນິດພັນນີ້ເປັນນາກຂະໜາດໃຫຍ່ ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊີ ແລະ ນາກນ້ຳໃຫຍ່ທຳມະດາ ຈະປະກົດມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນຂົງເຂດ ຢູຣີບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນປະຊາກອນຂອງ ນາກນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຈະຫຼາຍກຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊີ. ນາກ ຢູຣາເຊຍ ເປັນນາກທີ່ມັກກິນແຕ່ປາ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ. ຈະສາມາດພົບເຫັນພວກມັນໄດ້ຢູ່ບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຈືດ ແລະ ບໍລິເວນເປັນຕົມ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພວກມັນຈະຢ້ານມະນຸດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປະກົດມີຢູ່ແຕ່ບໍລິເວນເຂດທີ່ມີລະດັບສູງ ຕາມ ຫ້ອຍນ້ຳ ແລະ ເຂດທ່າງໄກຊອກຫລີກ

ອື່ນໆ. ນາກນ້ຳໃຫຍ່ຂົນລຽບ ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຄວາມສັ້ນຂອງຮ່າງກາຍ, ແລະ ຄິດວ່າເປັນສັດທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນຂົງເຂດ ອາຊີ. ພວກມັນອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຄອບຄົວນ້ອຍໆ ແລະ ສາມາດພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລາຍປະເພດ, ແຕ່ເຂດບໍລິເວນ ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ທີ່ເປັນນ້ຳຈືດໄປຈົນເຖິງບໍລິເວນເຂດປ່າ ຊາຍເລີນ (mangroves) ແລະ ເຂດມີແມ່ນ້ຳ ໃນປ່າໄມ້.

ການອະນຸລັກ:

L. *Lutra* - NT; L. *perspicillata* - VU

ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ນາກນ້ຳໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງໜັກຈາກການລ່າ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ. ໜັງຂອງນາກນ້ຳໂຕໜຶ່ງສາມາດຂາຍໃຫ້ພໍ້ຄ້າໃນລາຄາ 1,000,000 ກີບ. ໄພຂົ່ມຂູ່ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງນາກນ້ຳທີ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຄືການສູນເສຍ ຫລື ທຳລາຍເຂດບໍລິເວນເປັນຕົມ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ທີ່ເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ, ເນື່ອງຈາກ ປັດໃຈທາງດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.

ການປະກົດມີນາກນ້ຳທັງສອງຊະນິດຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ນາກທັງສອງຊະນິດຈະປະກົດມີຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ນັບແຕ່ການເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນາກທັງສອງຊະນິດດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຈ້ແຍກປະເພດນາກທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ.

89 ນາກນ້ຳນ້ອຍເລັບສັ້ນ. (Asian Small - Clawed Otter) *Aonyx cinerea*

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ນາກຊະນິດນີ້ຈະອາໄສຢູ່ແຕ່ປະເທດ ອິນເດຍ, ສປ ຈີນ ຈົນມາຮອດຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຊຶ່ງເປັນນາກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂຕທີ່ມີນ້ຳໜັກຫລາຍກວ່າ 5 ກິໂລ ແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະສາມາດພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນນາກຊະນິດທີ່ມັກຢອກຫລິ້ນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ມັນມີອະໄວຍະວະຄ້າຍຄືແຂນ ທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບອີງຕີນຢູ່ຂ້າງໜ້າ, ຊຶ່ງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແລະ ມີອີງເລັບຂະໜາດນ້ອຍຮຽວ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບຈັບເຍື່ອຂອງມັນເຊັ່ນ: ກຸ້ງ, ຫອຍ ແລະ ປາຂະໜາດນ້ອຍ. ທັງໝົດຂອງຝູງນາກຈະມີຈຸດກຳເນີດມາຈາກ ການປະສົມພັນຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່ພຽງຄູ່ດຽວ ແລະ ຕົກມາຮອດລຸ້ນລູກຂອງພວກມັນ ການສືບພັນຈຶ່ງມີຜົນສຳເລັດໜ້ອຍ.

ການອະນຸລັກ:

NT

ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງສັດຊະນິດນີ້ນັບມື້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈາກສາເຫດການທຳລາຍ ພື້ນທີ່ບໍລິ

ເວນເປັນຕົວ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ຊຶ່ງເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ການລ່າເພື່ອເປັນສິນຄ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກໍ່ໄດ້ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເຖິງ 2 - 3 ຄັ້ງໃນການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງສັດໃນຕະກູນນາກຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຍັງແຕ່ສປປ ລາວພຽງປະເທດດຽວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງນາກທຸກຊະນິດພັນ. ແຕ່ ຈາກຂໍ້ມູນການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງນາກບາງສ່ວນ ເປັນຂໍ້ມູນພຽງເຫລັກໜ້ອຍ ທີ່ສາມາດໃຫ້ການແນະນຳວ່າ ນາກນ້ຳຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ ອິນດູຈີນ ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ປະຊາກອນນາກນ້ຳທີ່ມີຄວາມສົມບູນແມ່ນອາໄສຢູ່ບໍລິເວນອ່າງໂຕ່ງເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຍິ່ງຍືນວ່າໄດ້ມີປະຊາກອນນາກນ້ຳອາໄສຢູ່ບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເຂດ ພຽງ 2 - 3 ແຫ່ງ.

ການປະກົດມີນາກນ້ຳໜ້ອຍເລັບສັນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳເທີນ ແລະ ນ້ຳກະດິງ ເປັນອ່າງໂຕ່ງນ້ຳທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສປປ ລາວ ແລະ ພົບວ່າມີປະຊາກອນນາກນ້ຳອາໄສຢູ່, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຈາກການບັນທຶກໃນເວລາລົງສຳຫລວດຄັ້ງລ້າສຸດພົບວ່າປະຊາກອນຂອງພວກມັນຫລຸດລົງ, ແມ່ນ້ຳຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ໄດ້ກາຍເປັນພຽງຕຳນານ “ສະຫວັນຂອງນາກນ້ຳ”. ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ປະຊາກອນນາກນ້ຳ ນັບມື້ນັບຫາຍາກ ຍ້ອນສາເຫດມາຈາກການລົບກວນຂອງມະນຸດ, ຄວາມທຸກຈົນຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລຽບຕາມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ຍັງມີຫລາຍ; ນາກນ້ຳໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນເຊັ່ນກັນ.

90 ເຫງັນອີຕັນ. (Owston's Palm Civet) Chrotogale Owstoni.

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ເປັນສັດປ່າທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ຊຶ່ງຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນທາງພາກໃຕ້ຂອງສປປ ຈີນ ແລະ ພາກເໜືອຂອງສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ເຫງັນຊະນິດດັ່ງກ່າວມີຂົນສີນ້ຳຕານ ແລະ ສີນ້ຳໝາກກຽງອ່ອນ, ຊຶ່ງມີແທບສີດຳໃຫຍ່ຢູ່ເທິງຫລັງຂອງມັນ ແລະ ມີຫາງພວງສີດຳຄ້າງຜຸ່ມໄມ້. ມັນມັກອາໄສຢູ່ບໍລິເວນເຂດຊຸ່ມຊື່ນເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້ຕາມຮອມພູ, ຕາມພູໜ້ອຍ ແລະ ຕີນພູ ທີ່ມີຫວຍນ້ຳ, ໜອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳ. ບາງຄັ້ງກໍ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນເຂດປ່າໄມ້ແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ເຂດກະສິກຳ. ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງບົກ, ແຕ່ສາມາດປີນໄຕໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຂວ ໂດຍສະເພາະການຊອກຫາອາຫານຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້. ອາຫານຂອງມັນໄດ້ແກ່ຂີ້ກະເດືອນ, ບວກກັບໝາກໄມ້ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ສັດປ່າເຊັ່ນ: ສັດເລືອຄານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນົກ. ເຫງັນຊະນິດນີ້ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມແຂງຂັນໃນເວລາກາງຄືນ ຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນແລ້ວຈະຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້, ກ້ອນຫີນ ຫລື ຢູ່ພື້ນດິນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອການພັກຜ່ອນໃນເວລາກາງເວນ ແລະ ການສ້າງຮັງ. ໂຕແມ່ຈະມີລູກສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ, ແລະ ຈະເກີດລູກແຕ່ໜຶ່ງໂຕ ຫາ ສາມໂຕ/ຄັ້ງ.



ການອະນຸລັກ:

VU

ໃນ 2 - 3 ທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການບຸກລຸກອານາເຂດຂອງ ສັດຊະນິດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການລ່າ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຫລຸດລົງຂອງປະຊາກອນເຫງັນດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ໃນລະດັບໂລກ ໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບເຫງັນຊະນິດນີ້ວ່າເປັນສັດທີ່ຕົກຢູ່ໃນ ອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ການປະກົດມີເຫງັນອີຕັນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເຫງັນຊະນິດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍືນວ່າ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຕ່ໄດ້ຖືກ

ພົບເຫັນຢູ່ເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນ ແລະ ນ້ຳຈວນ.

91 ໝີຂໍ ຫລື ໝີກະຮອກ. (Binturong) Arctictis binturong.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ຕາມປົກກະຕິມັກຈະເອີ້ນສັດຊະນິດນີ້ວ່າແມ່ນ ໝີເສືອ, ມັນແມ່ນເຫງິນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນກັບໝີນ້ອຍ. ເຫງິນອີ່ຕົ້ນຖືກພົບເຫັນຢູ່ແຕ່ ບູຖານ ແລະ ອິນເດຍ ມາທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອາຊີ ແລະ ຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນຂອງຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນເຂດ ບໍ່ນຽວ ແລະ ປະເທດ ຟີລິບປິນ. ເຫງິນອີ່ຕົ້ນມີຂົນຍາວສີດຳ ແລະ ມີຫາງຍາວ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ໃນປ່າດິບດົງໜາ ແລະ ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດອື່ນໆ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນສັດທີ່ຂະຫຍັນໃນເວລາການຄືນ. ອາຫານຂອງມັນໄດ້ແກ່ ໝາກໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ນົກ, ໝູ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດເລືອຄານທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້. ມັນຈະປະສົມພັນຕະຫລອດປີ ແລະ ມີລູກແຕ່ 1 - 3 ໂຕ; ເຫງິນອີ່ຕົ້ນສາມາດປົນໄຕ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ລອຍນ້ຳໄດ້ດີ.

ການອະນຸລັກ:

ARL

ຢູ່ໃນ ອິນດູຈີນ, ການປະກົດມີສັດຈຳພວກເຫງິນຊະນິດນີ້ ກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກສັດຈຳພວກ ໝູ່ລຶ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາຍາກ, ບາງທີ່ອາດຈະຍ້ອນມີການລ່າຫລາຍ. ເພາະວ່າເປັນສັດທີ່ຕິດພັນກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີນິໄສຂີ້ຄ້ານ ແລະ ມັກເຄື່ອນໄຫວທາງກິນໃນຕອນກາງເວນແຕ່ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ໄວ້ ຄ້າຍຄືກັນກັບ ໝູ່ລຶ້ງ, ການປົກປັກຮັກສາຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດກວ້າງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການອະນຸລັກປະຊາກອນສັດຊະນິດນີ້ໃນໄລຍະຍາວນານ.

ການປະກົດມີໝີຂໍ ຫລື ໝີກະຮອກຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ມັນອາດຈະປະກົດມີຢູ່ເກືອບທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ໆ ມີປ່າໄມ້ສົມບູນຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງ. ມັນໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ.

92 ເສືອກິນປາ. (Fishing Cat) Prionailurus viverrina.

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ເສືອກິນປາຊະນິດນີ້ ຖືວ່າເປັນເສືອທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊະນິດອື່ນທີ່ມີຢ່າງກະແຈກກະຈາຍຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແຕ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ມາຈົນຮອດຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ໄປຈົນເຖິງ ອິນໂດເນເຊຍ. ເປັນສັດທີ່ມີສີ ຂຽວໝາກກອກເຖົາ, ມີຮູບລັກສະນະເປັນແຖວຂະໜານ ກັນໄປທົ່ວລຳໂຕ, ມີຈຸດສາມມືຕິສີດຳ ໄປຕາມລຳກະດູກສັນຫລັງ. ລຳໂຕເປັນສີມືດ ແລະ ມີຫາງສັ້ນ. ມັນອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີ່ມີຄວາມປົກຫຸ້ມໜາ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຢູ່ໄກໆກັບແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳ. ມັນມັກລ່າເຍື່ອຢູ່ສອງບ່ອນຄື ຢູ່ເທິງປີກ ແລະ ດ້ວຍການລອຍນ້ຳໃນເວລານ້ຳໄຫລ. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ ປາ, ກຸ້ງ, ຫອຍນ້ຳຈັດ, ສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ, ນົກ, ກິບ, ຊຽດ ແລະ ແມງໄມ້. ໂຕແມ່ຈະອອກລູກເທື່ອລະ 1 - 4 ໂຕ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:

VU

ການປະກົດມີເສືອກິນປາຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຈະພົບເຫັນຢູ່ພຽງ 2 - 3 ແຫ່ງຢູ່ໃນສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດຊະນິດ

ນີ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເຊັ່ນ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນ.

93 ເສືອໄຟ. (Asian Golden Cat) *Catopuma temminckii*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເສືອໄຟຊະນິດນີ້ເປັນເສືອທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນບັນດາເສືອຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນອາຊຽນ ແລະ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ນັບແຕ່ປະເທດ ເນປານ ເຖິງ ພາກໃຕ້ຂອງສປ ຈີນ, ພາກໃຕ້ຂອງມາເລເຊຍ ໄປຈົນເຖິງ ຄາບສະໝຸດມາເລ ແລະ ຊູມາດຕາ. ມີສີແດງຫລື ສີຄຳປົນນ້ຳຕານ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ມີສີດຳ, ນ້ຳຕານ ຫລື ສີຂີ້ເຖົ້າ. ພວກມັນອາດມີຈຸດ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດຕາມລຳໂຕ, ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງມີສີຂາວ ຊຶ່ງມີຈຸດສີດຳປົນຢູ່ນຳ. ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ ຊຶ່ງດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ມີຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ໃນປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຄິ່ງເຂດຮ້ອນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນປ່າຜັດປ່ຽນໃບແຫ້ງແລ້ງ. ອາຫານຂອງພວກມັນໄດ້ແກ່ຈຳພວກ ໝູ່ປ່າ ແລະ ກວາງ, ຟານ, ບາງຄັ້ງກໍ່ກິນໝູ, ກະຕ່າຍປ່າ, ຟານເຂົ້າໃຫຍ່ ແລະ ໂຕຊາຍ. ມີຂໍ້ມູນດ້ານອຸປະນິໄສພຽງເຫລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບເສືອໄຟຊະນິດນີ້, ແຕ່ຄິດວ່າພວກມັນຕ້ອງແມ່ນສັດທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ.



ການອະນຸລັກ:

VU


ການປະກົດມີເສືອໄຟຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເສືອຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ.

94 ເສືອລາຍຫີນອ່ອນ. (Marbled Cat) *Pardofellis marmorata*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນເສືອທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ມີອາໄສເຂດຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ທົ່ວ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ນັບແຕ່ ພາກເໜືອ ຫາ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ເນປານ ໄປຈົນເຖິງ ເກາະຊູມາດຕຣາ ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບໍ່ນຽວ. ຂົນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບ ຂົນເສືອດາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະມີຈຸດສີດຳຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງລຳໂຕ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈຸດດຳມີເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອຸປະນິໄສ, ອາຫານ ແລະ ນິເວດຂອງພວກມັນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ມັກຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າຊຸ່ມຊື່ນເຂດຮ້ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄັ້ງກໍ່ມັກພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ບໍລິເວນ ປ່າປະສົມຜັດປ່ຽນໃບ ແລະ ປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງ. ອາຫານຂອງພວກມັນໄດ້ແກ່ ໝູ, ນົກ, ກະຮອກ ແລະ ກະແຕ; ແຕ່ຄິດວ່າພວກມັນຕ້ອງແມ່ນສັດທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ.



ການອະນຸລັກ:

VU; CA I

ການປະກົດມີເສືອລາຍຫີນອ່ອນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ດົນນານມາແລ້ວທີ່ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າໄດ້ພົບເຫັນປະຊາກອນເສືອລາຍເມກຢູ່ບໍລິເວນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ, ແຕ່ບາງທີ່ມັນອາດຈະປະກົດມີຢູ່ເຂດອື່ນໆ ຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

95 ເສືອລາຍເມກ. (Clouded Leopard) *Neofelis nebulosa*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນເສືອທີ່ສວຍງາມ ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເສືອດາວ ແຕ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ເສືອອື່ນໆ ໃນຕະກູນເສືອຂອງ ອາຊຽນ. ສາມາດພົບເຫັນປະຊາກອນຂອງພວກມັນທົ່ວໄປຢູ່ແຜນດິນ ໃຫຍ່ ແລະ ຄາບສະໝຸດຂອງ ອາຊີ, ນັບແຕ່ປະເທດ ເນປານ ຫາ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ຜ່ານມາຮອດ ອິນດູຈີນ ມາຈີນເຖິງ ມາເລເຊຍ, ບໍ່ນຽວ ແລະ ຊູມາດຕາ. ຂົນຕາມ ລຳຕົວຂອງມັນມີລັກສະນະຄ້າຍກັອນເມກ, ເປັນຮູບລາຍຄ້າຍດອກກຸຫລາບໃຫຍ່ທີ່ມີສີປໍ້ຄື ກັນ ຊຶ່ງມີຂອບດອກສີດຳ. “ກັອນເມກ” ຢູ່ເທິງ ຫລື ຂ້າງຫລັງປ່າໄຫລ່ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ; ເສືອ ລາຍເມກ ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອອກເຄື່ອນໄຫວຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ມັນ ເປັນສັດທີ່ມັກຢ້ານກົວ ແລະ ຊ່ອຍໂຕເມື່ອຖືກພົບເຫັນ, ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສອັນແນ່ ນອນຂອງພວກມັນຈຶ່ງມີໜ້ອຍ. ອາຫານຂອງມັນໄດ້ແກ່ນົກ, ລີງ, ສັດປ່າຊະນິດນ້ອຍ ແລະ ໆ. ຕາມ ປົກກະຕິໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 2 - 4 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

VU

ເສືອລາຍເມກແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍຫລາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໜັງຂອງມັນສູງຫລາຍ, ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນນັບມື້ຫລຸດລົງ, ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າ ປະຊາກອນຂອງພວກມັນຕົກຢູ່ໃນໄພອັນ ຕະຫລາຍ ຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ.

ການປະກົດມີເສືອລາຍເມກຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ມີສະຖານະພາບຄ້າຍຄືກັນກັບເສືອຊະນິດອື່ນໆ ຍົກເວັ້ນເສືອໂຄ່ງ, ເສືອລາຍເມກ ເປັນເສືອທີ່ພົບ ເຫັນຍາກໃນພາກສະໜາມ ນອກຈາກຈະນຳໃຊ້ເຕັກນິກສະເພາະທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ກ້ອງດັກຖ່າຍ ຮູບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າພົບເຫັນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ.

96 ເສືອດາວ ຫລື ເສືອດຳ. (Leopard) Panthera pardus.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:



ເສືອດາວແມ່ນມີກະຈາຍຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວໄປໃນ ອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ. ມັນເປັນເສືອທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຂົນທີ່ສວຍງາມ ສີພັນເປັນສີເຫລືອງປົນເຖົາ ແລະ ມີຈຸດດຳໆ ທົ່ວໂຕເປັນກຸ່ມ. ບາງໂຕຈະມີສີດຳທົ່ວໂຕ ແລະ ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ເສືອດາວດຳ; ເສືອຊະນິດນີ້ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ອາໄສຢູ່ເຂດປ່ານ້ຳຝົນເຂດຮ້ອນ, ບາງຄັ້ງກໍຢູ່ໃນປ່າຜັດປ່ຽນໃບ. ເປັນສັດນັກລ່າອະເນປະລິງຄື ລ່າໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ເຍື່ອຂອງມັນມີຫລາຍຊະນິດ ນັບແຕ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ສັດຕົນກີບ

ຂະໜາດກາງ ແລະ ສັດລ້ຽງພວກງົວ, ຄວາຍ ລົງໄປຈົນເຖິງໂຕໜູ. ມັນເປັນສັດທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວ ຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາກາງເວນພັກຜ່ອນຢູ່ເທິງງ່າໄມ້. ຕາມປົກກະຕິໂຕແມ່ຈະ ອອກລູກຄັ້ງລະ 2 - 3 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

ARL; CA I

ການປະກົດມີເສືອດາວຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ສັດຊະນິດນີ້ ຈະປະກົດມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄວາມໜ້າແທ້ໝາຍຂອງ ປະຊາ ກອນພວກມັນຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ. ປະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍັງມີປະຊາກອນຂອງເສືອ ດາວພຽງ ໜ້ອຍດຽວອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ແລະ ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່

97 ເສືອໂຄ່ງ. (Tiger) *Panthera tigris*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເສືອໂຄ່ງເປັນເສືອທີ່ຖືກຮັບຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນເສືອທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນບັນດາຕະກູນເສືອ. ອານາເຂດຂອງພວກມັນກວ້າງຂວາງຫລາຍ ຊຶ່ງນັບແຕ່ ອາຊີຕາເວັນອອກ ເຖິງ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະ ປະຊາກອນຂອງພວກມັນທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ ນັບແຕ່ປະເທດ ອິນເດຍ ມາເຖິງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູ່ໃນ ຊຸມາດຕາ, ສປ ຈີນ ແລະ ຢູ່ປະເທດ ລັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໄກ. ເປັນສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ມີກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ, ມີພະລັງແຮງ ແລະ ມີສີແຕ່ສີນ້ຳໝາກກຸ້ງແດງໄປຈົນເຖິງສີເທລືອງດູ່ ແລະ ມີແຊກລາຍສີດຳຂາວຢູ່ພື້ນທ້ອງ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລາຍປະເພດ, ຢູ່ບໍລິເວນປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນຂອງ ອາຊີໃຕ້ ໄປເຖິງ ປ່າໄມ້ໃບເຂັມເຂດ ຊາບີເລຍ. ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມັນຕ້ອງການໄດ້ແກ່: ເຂດທີ່ມີພືດພັນປົກຫຸ້ມຕືບໜາ, ເຂດທີ່ມີສັດຕິນກີບຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງພຽງພໍ ທີ່ເປັນເຍື້ອຂອງມັນ ແລະ ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງ ແມ່ນ້ຳໄດ້ງ່າຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເສືອໂຄ່ງ ເປັນສັດທີ່ມັກຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແລະ ລ່າເຍື້ອຂອງມັນ ໂດຍການໄລ່ຊຸບຕາມຫລັງ. ເປັນສັດທີ່ສາມາດລອຍນ້ຳເກັ່ງ; ໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 4 ໂຕ.



ການອະນຸລັກ:

EN; CA I

ເສືອໂຄ່ງຖືກລ່າ ເພື່ອເອົາໜັງຂອງມັນ ແລະ ເຊື້ອກັນວ່າກະດູກ ແລະ ພາກສ່ວນໂຕຂອງມັນມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານການຢາ, ຢູ່ໃນທົ່ວ ອາຊີ ແລະ ເຂດອື່ນໆ ໄດ້ດຳເນີນການຄ້າຂາຍເສືອໂຄ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກມັນຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ເຊື້ອກັນວ່າບໍ່ເກີນ 5,000 ໂຕ.

ການປະກົດມີເສືອດາວຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າພົບເຫັນເສືອໂຄ່ງຢູ່ບໍລິເວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ພູສີທອນ, ເມືອງ ວຽງທອງ ບອກວ່າ ຍັງມີເສືອໂຄ່ງອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນ. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການພົບເຫັນເສືອໂຄ່ງຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າທຸກວັນນີ້ຍັງຈະມີປະຊາກອນເສືອໂຄ່ງອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນອີກ ຫລື ບໍ່.

98 ຊ້າງປ່າອາຊີ. (Asian Elephant) *Elephas maximus*.

ປະຫວັດທາງດ້ານທຳມະຊາດ:

ເປັນສັດປີກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຊ້າງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ກັນດີຢູ່ທົ່ວອາຊີ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນແມ່ຂະໜາດມະຫາມາ ທີ່ມີຫົວໃຫຍ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໃບຮູກວ້າງ, ງວງຍາວ ແລະ ງາສີຂາວ ປົ່ງ



ອອກມາທັງສອງຂ້າງຂອງງວງ ຢູ່ເທິງປາກພຽງເຫລັກໜ້ອຍ. ມີສີຂີ້ເຖົ້າທັງໂຕ, ໃນອາດີດພວກມັນ ອາໄສຢູ່ຕາມຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລາຍປະເພດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢູ່ໃນເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປະຈຸບັນ ຊ້າງປ່າຈະມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດຕາມປ່າໄມ້ ແລະ ຕາມທົ່ງຫຍ້າໂລ່ງແຈ້ງ. ຊ້າງປ່າສາມາດກິນອາຫານໄດ້ເຖິງ 150 ກິໂລ/ມື້ ແລະ ກິນຫຍ້າຊະນິດຕ່າງໆ, ກິນເປືອກໄມ້, ຮາກໄມ້ແລະ ໃບໄມ້. ພຶດກະສິກຳເຊັ່ນ: ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອ້ອຍມັນກໍ່ກິນ. ຊ້າງປ່າຈະອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສຳລັບຊ້າງຜູ້ທີ່ຍັງໜຸ່ມຈະມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ທັງໝົດຂອງຝູງຈະມີ

ຫົວໜ້າຝູງເປັນໂຕຜູ້ທີ່ແຂງແຮງ ຊຶ່ງຄອບຄຸມຝູງທີ່ມີໂຕແມ່ ແລະ ໂຕທີ່ຍັງນ້ອຍ. ຊ້າງໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະໂຕ, ຊຶ່ງລູກຂອງມັນຈະມີນ້ຳໜັກແຕ່ 50 - 150 ກິໂລ. ສຳລັບຊ້າງໂຕແມ່ຈະມີນ້ຳໜັກເຖິງ 2,270 ກິໂລ ໃນຂະນະທີ່ຊ້າງຜູ້ຈະມີນ້ຳໜັກເຖິງ 5,400 ກິໂລ.

ການອະນຸລັກ:

EN

ຊ້າງປ່າທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ສປປ ລາວ ແມ່ນອາໄສຢູ່ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນ 2 - 3 ບ່ອນ ຈຳນວນທີ່ມີຢູ່ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າສາມາດຈະຢູ່ລອດ ແລະ ກໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຕໍ່ໄປໄດ້. ປະຊາກອນຊ້າງທີ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າ ມີຈຳນວນປະຊາກອນຫລາຍກວ່າຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກແຫ່ງອື່ນໆ ແລະ ເປັນສັດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນອາດຈະບໍ່ຫລາຍເທົ່າກັບ ຈຳນວນປະຊາກອນຊ້າງຢູ່ເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ຫລື ຢູ່ໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ການປະກົດມີຊ້າງປ່າຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ປະຊາກອນຂອງຊ້າງປ່າໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນໄກ່ຄຽງເຂດ ນ້ຳຈວນ ເຂດສະເໜີເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຊ້າງເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ປະຊາກອນຊ້າງຢູ່ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ໄດ້ກາຍເປັນຝູງນ້ອຍໆປະມານ 2 - 3 ໂຕ/ຝູງ, ຊຶ່ງສະແດງວ່າ ມີການຊົມໃຊ້ ຫລື ລ່າຊ້າງຢ່າງໜັກ.

99 ແຮດນໍດຽວ ແລະ ແຮດສອງນໍ. (Lesser One - Horned Rhinoceros)

Rhinoceros Sondaicus anniamiticus and (Asian Two - Horned Rhinoceros)

Dicerorhinus sumatrensis.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນສັດປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຍັງມີປະຊາກອນ ແຮດອາໄສຢູ່ໃນສປປ ລາວ ຫລື ບໍ່. ແຮດ ເປັນສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ສີຂີ້ເຖົ້າ, ເປັນສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ມີຫົວຂະໜາດໃຫຍ່, ຂາສັ້ນ, ຕານ້ອຍ ແລະ ຕີນໂຕລຳສັ້ນ ທີ່ປົກຫຸ້ມດ້ວຍໜັງຄືຜ້າພັບໄວ້ ເບິ່ງແລ້ວຄ້າຍຄືກັບມັນນຸ່ງຊຸດປ້ອງກັນອາວຸດ. ຕາມປົກກະຕິ ແຮດ ຈະອາໄສຢູ່ໃນປ່ານ້ຳຝົນທີ່ຕົບໜາ, ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳຫລາຍ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ

ແລ້ວ ມັກສະຖານທີ່ເຂດຕ່ຳປະມານ 1,000 ແມັດ ຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ. ອາຫານຂອງມັນ ປະກອບດ້ວຍ ໝາກໄມ້, ໜໍ່ທີ່ພົ້ນອອກມາ, ກິ່ງໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແຮດ ມັກອາໄສຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ; ໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 1 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

CR; CA I

ແຮດ ອາຊີ ເປັນສັດທີ່ຕິກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ. ມັນຖືກຂ້າເພື່ອເອົານໍ້, ຊຶ່ງຍັງຢືນວ່າ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຢາ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເອົາພາກສ່ວນຂອງລຳໂຕ. ປະຊາກອນ ແຮດ ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ອາດຈະແມ່ນຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດໃນລະດັບ ໂລກ.

ການປະກົດມີແຮດທັງສອງຊະນິດຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຍິ່ງຍືນວ່າ ມີການບັນທຶກກ່ຽວກັບ ແຮດ ຢູ່ໃນສປປ ລາວ, ແຕ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກໍແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບ່ອນຢູ່ໃນສປປ ລາວ ທີ່ມີ ແຮດ ອາໄສຢູ່ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນ ທີ່ ມີການສືບຕໍ່ລາຍງານມາແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ຽວກັບ ແຮດ. ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຮ່ອງຮອຍຂອງ ແຮດ ທີ່ພົບເຫັນອາດເປັນຮອຍຂອງ ແຮດ ສອງນິ ຂອງ ອາຊີ ຊຶ່ງຖືກພົບຢູ່ເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ່ນ ໃນປີ 1988, ແລະ ໃນເວລາຄ້າຍຄືກັນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ແຮດ ຍັງປະກົດມີຢູ່ເຂດ ນ້ຳຈວນ ຊຶ່ງເປັນເຂດສະເໜີເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

100 ໝູ່ປ່າ. (Heude's Pig) *Sus bucculentus*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ໝູ່ປ່າຊະນິດນີ້ອາດເປັນໝູ່ປ່າສະເພາະຖິ່ນຂອງ ສາຍພູຫລວງ. ມີຂໍ້ມູນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບໝູ່ປ່າ ຊະນິດນີ້. ນັກຊີວະວິທະຍາ ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າມັນແມ່ນຊະນິດໃດກັນແທ້. ມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າ ເປັນຊະນິດພັນຢູ່ໃນສສ ຫວຽດນາມ ໃນຊ່ວງສັດຕະວັດທີ 19 ແລະ ບໍ່ມີການບັນທຶກ ກ່ຽວກັບສັດ ຊະນິດນີ້ ຫລາຍກວ່າ 100 ປີແລ້ວ ຈົນກວ່າວ່າ ກະໂຫລກຫົວຂອງໝູ່ຊະນິດນີ້ຈຳນວນ 2 ອັນ ຖືກ ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ່ນ ໃນປີ 1995. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໝູ່ປ່າ ແມ່ນສັດທີ່ມັກສັງຄົມ, ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງ ທີ່ມີຂະໜາດຝູງແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນຈະໃຊ້ສຽງດັງໃນເວລາເດີນທາງ ແລະ ກິນອາຫານ, ແລະ ຈະກິນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບແຕ່ ໝາກໄມ້, ພືດ ແລະ ພວກເຊື້ອລາ ຈົນເຖິງ ແມງ ໄມ້, ສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊາກສັດເນົ່າເປື່ອຍ. ເສື້ອໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ເສື້ອໂຄ່ງ ແລະ ເສື້ອດາວ ມັກກິນໝູ່ປ່າ.

ການອະນຸລັກ:

DD

ການປະກົດມີໝູ່ປ່າຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຊີວະວິທະຍາຈະມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ໝູ່ປ່າຊະນິດນີ້ ພຽງເຫລັກໜ້ອຍ, ແຕ່ຕາມ ການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໝູ່ປ່າຊະນິດນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງ, ຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ເຂດ ສາຍພູຫລວງ.

101 ກວາງ. (Sambar deer) *Cervus unicolor*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ກວາງໃຫຍ່ຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ລະຫວ່າງປະເທດ ອິນເດຍ ໄປຫາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນຂອງເກາະດອນຢູ່ ອິນ



ໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຈະມີສີນ້ຳຕານດຳ ຂາໂຕ້ຂາວ ແລະ ຢູ່ກ້ອງ ທາງມີສີຂາວ; ມີເຂົ້າທີ່ໃຫຍ່ຍາວ. ກວາງເປັນສັດທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຫລາຍປະເພດ, ແຕ່ມັນມັກຢູ່ບໍລິເວນປ່າໄມ້ ຕາມພູເຂົາທີ່ຊັນ ສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 3,700 ແມັດ. ມັກກິນໃບໄມ້, ຕາໄມ້, ຫຍ້າ, ແກ່ນໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ໝາກໄມ້. ເປັນສັດທີ່ມັກອອກເຄື່ອນໄຫວທາງກິນໃນເວລາກາງຄືນ. ລະດູການປະສົມພັນຕົ້ນຕໍຄື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກັນຍາ (9) ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ (1) ແລະ ໂຕແມ່ຈະອອກລູກພຽງໂຕດຽວ/ຄັ້ງ.

ການອະນຸລັກ:

PARL


ປະຊາກອນ ກວາງ ຖືກຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ທົ່ວ ອິນດູຈີນ ຍ້ອນການລ່າ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນລ່າເພື່ອເອົາເຂົ້າຂອງມັນ ເພາະມີລາຄາສູງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນຕະຫລາດ ຢາພື້ນເມືອງແຖບ ອາຊີຕາເວັນອອກ. ຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວນານ ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ ທີ່ເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ແລະ ວາງມາດຕະການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກການລ່າມັນ.

ການປະກົດມີກວາງຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ມັນຖືກພົບເຫັນເປັນຈຳນວນໜ້ອຍຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ທົ່ວແຂວງ. ກວາງຊະນິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍືນວ່າມີຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ້ນ.

102 ຟານເຂົ້າໃຫຍ່. (Large - Antlered Muntjac) Muntiacus

vuquanggensis.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ຟານຊະນິດນີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ ຟານ. ຟານເຂົ້າໃຫຍ່ ແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດໃນເຂດ ສາຍພູຫລວງ ແລະ ຕາມບໍລິເວນຕົ້ນພູ ໃນເຂດ ອິນດູຈີນ. ຂໍ້ມູນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງຊະນິດພັນນີ້ແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງແທ້ຈິງຂອງມັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ທົນຢູ່ໃນສະພາບຂອງປ່າໄມ້ທີ່ຖືກບຸກລຸກທຳລາຍ ແລະ ການລົບກວນຂອງມະນຸດ ຫລາຍກວ່າ ຟານຫລັງແດງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນສະຖານະພາບຄ້າຍຄືກັນກັບຟານຊະນິດອື່ນໆ. ຟານຊະນິດນີ້ມັກກິນຫຍ້າ, ໃບໄມ້, ໜໍ່ທີ່ປົ່ງຂຶ້ນໄໝ້ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ກິນໝາກໄມ້. ຕາມ

ປົກກະຕິແລ້ວ ລູກຂອງຟານ ມັກຈະເກີດຢູ່ບໍລິເວນປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ແລະ ມັກຊ້ອນໂຕຢູ່ຈົນວ່າມັນສາມາດ ເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ສະດວກຕາມແມ່ຂອງມັນ. ຊີ້ຂອງມັນມາຈາກສ່ວນເລິກ, ການເປບຄ້າຍຄືສຽງທີ່ມັນຕ້ອງການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ກ່າວເຕືອນໃຫ້ບັນດາສັດທີ່ເປັນເຍື່ອທັງຫລາຍຊາບວ່າ ໄພອັນຕະລາຍກຳລັງເຂົ້າມາ.

ການອະນຸລັກ:

DD

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຂົ້າຂອງຟານຊະນິດນີ້ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປຕາມບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງ, ແຕ່ຢູ່ພາກສະໜາມພັດມີການບັນທຶກວ່າຍັງມີຟານຊະນິດນີ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດຕາມທຳມະຊາດ, ຊຶ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມໜ້າແທ້ຂອງມັນຖືກຫລຸດລົງ. ການລ່າເນື້ອ ແມ່ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຟານຫລຸດລົງຢູ່ໃນທົ່ວທຸກບ່ອນຂອງສປປ ລາວ. ບວກກັບ ການສູນເສຍປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງບັນຫາໜັກສຳລັບຟານຊະນິດນີ້ ຫລາຍກ່ວາຟານຫລັງແດງ.

ການປະກົດມີຟານເຂົາໃຫຍ່ຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຟານຊະນິດນີ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນ. ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສເລີຍວ່າ ຟານຊະນິດດັ່ງກ່າວຈະປະກົດມີຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າໄມ້ ແຫ່ງອື່ນໆທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊເຊັ່ນ: ນ້ຳຈວນ ເຂດທີ່ສະເໜີເປັນປ່າ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

103 ຟານສາຍພູຫລວງ ແລະ ຟານໝໍຮູດສເວີນ (Annamite Dark Muntjac)

Muntiacus Truongsonensis and (Roosevelt's Muntjac) *Muntiacus*

rooseveltorum.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນຟານຊະນິດນ້ອຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໜ້ອຍຫລາຍກ່ຽວກັບພວກມັນ. ຟານເຂົາໃຫຍ່ ຖືກຮັບຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນສະເພາະແຕ່ເຂດສາຍພູຫລວງຂອງສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ລຳໂຕອາດມີສີດຳ ກັບທາງດ້ານເທິງມີສີດຳ. ຟານໝໍຮູດສເວີນມີ ສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີເຂົ້າສັ້ນຄ້າຍຄືກັນກັບຟານຊະນິດອື່ນ. ຟານຊະນິດນີ້ມັກກິນ ຫຍ້າ, ໃບໄມ້, ໜໍ່ຫຼົ່ງໄໝ້ ແລະ ບາງທີ່ກິນໝາກໄມ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ລູກ ຟານຊະນິດນີ້ຈະເກີດຢູ່ບໍລິເວນປ່າທີ່ຕຶບໜາ ແລະ ມັກຊ້ອນໂຕຢູ່ຈົນວ່າມັນສາມາດ ເຄື່ອນໄຫວ ໄປມາໄດ້ສະດວກຕາມແມ່ຂອງມັນ. ຊື່ຂອງມັນມາຈາກສ່ວນເລິກ, ການເປບ ຄ້າຍຄືສຽງທີ່ມັນ ຕ້ອງການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ກ່າວເຕືອນໃຫ້ບັນດາສັດທີ່ເປັນເຍື່ອທັງຫລາຍຊາບວ່າໄພອັນຕະລາຍ ກຳລັງເຂົ້າມາ. ສປປ ລາວ ເປັນພຽງປະເທດດຽວໃນໂລກ ທີ່ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າມີຟານຊະນິດ ນີ້ອາໄສຢູ່.



ການອະນຸລັກ:

M. truongsonensis - DD

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຟານ 2 ຊະນິດນີ້ມີພຽງໜ້ອຍດຽວ. ແຕ່ມັນຄື ຟານ ສະມັນພວກມັນຈຶ່ງມັກຖືກລ່າ ຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ພວກມັນປະກົດຕົວຢູ່ໄກ້ມະນຸດ.

ການປະກົດມີຟານສອງຊະນິດຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຟານສາຍພູຫລວງ ໄດ້ຖືກຍັງຢືນວ່າມີຢູ່ໃນເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັນ, ບາງທີ່ກໍ່ສາມາດພົບເຫັນພວກມັນ ຢູ່ບໍລິເວນປ່າໄມ້ເທິງພູເຂົາ ໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງສາຍພູຫລວງຢູ່ໃນແຂວງ. ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ ສະເພາະຢູ່ໃນສປປ ລາວ (ແລະ ໃນໂລກ) ບ່ອນທີ່ຟານໝໍຮູດສເວີນ ໄດ້ຮັບການຍັງຢືນວ່າ ຖືກພົບ ເຫັນຢູ່ໃນແຂວງ ຜົ່ງສາລີ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຊຶ່ງບໍ່ທ່າງໄກຈາກແຂວງ ບໍລິຄຳ ໄຊ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນຕ້ອງປະກົດມີຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

104 ເມີຍ. (Gaur) *Bos gaurus*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ສັດຊະນິດນີ້ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນຊະນິດພັນຂອງພວກງົວ ແລະ ຄວາຍ ຊຶ່ງຈະ ປະກົດມີຢູ່ໃນປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແລະ ມີການກະຈາຍຢູ່ທັງສອງເຂດໃນຈຳນວນເທົ່າກັນ, ຊ່ວງເວລາທີ່ ຜ່ານມາ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບສັດຈຳພວກ ງົວປ່າ, ເມີຍເປັນສັດປ່າທີ່ຕົກຢູ່ໃນ ໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງບັນດາສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ



ຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທັງສອງຊະນິດພັນທີ່ກວ່າມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຍັງມີຢູ່

ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍທົ່ວສປປ ລາວ, ແຕ່ໃນປະລິມານທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳຫລາຍ ແລະ ມີຢູ່ ໃນ 2 - 3 ພື້ນທີ່. ເປັນສັດປ່າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສີນ້ຳຕານແດງຊ້ຳ ໄປຈົນເຖິງສີນ້ຳຕານດຳ ຂາ, ຕີນ ແລະ ເຂົ້າມີສີຂາວ. ໂຕຜູ້ຈະມີໜ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງປ່າໄຫລ່; ເມີຍເປັນສັດທີ່ມັກອາໄສຢູ່ໃນປ່າເທິງພູ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າທີ່ມີຄວາມສູງຫ່າງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 1,800 ແມັດ. ມັນກິນຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້. ເປັນສັດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນທັງກາງເວນ ແລະ ກາງຄືນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກພື້ນທີ່ມັນອາໄສຢູ່ຫາກຖືກລົບກວນຈາກມະນຸດ ມັນ ຈະອອກເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາກາງຄືນ, ເປັນສັດປ່າທີ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງ; ໂຕແມ່ຈະອອກລູກ ຄັ້ງລະ 1 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

VU; CA I

ການປະກົດມີເມີຍຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເມີຍສາມາດຈະພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ. ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະສາມາດພົບເຫັນ ເມີຍ ຢູ່ເຂດ ພູສີທອນ ເມືອງ ວຽງ ທອງ, ແລະ ອີກຝູງໜຶ່ງທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍຢູ່ເຂດ ນ້ຳຈວນ ຊຶ່ງເປັນເຂດສະເໜີເປັນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ.

105 ງົວປ່າ. (Banteng) *Bos javanica*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ງົວປ່າແມ່ນສັດປ່າທີ່ຈັດຢູ່ໃນປະເພດຂອງ ງົວ ແລະ ຄວາຍ ຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດ ອາຊີຕາ ເວນອອກສ່ຽງໄຕ້ ແຕ່ທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ມຽນມາ ໄປເຖິງປະເທດ ໄທ, ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຢູ່ໃນເກາະ ບາຫລີ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ສັດ ຊະນິດນີ້ມີຂົນສັ້ນ, ໂຕແມ່ຈະມີຂົນເປັນສີ ນ້ຳຕານແກ່ ແລະ ໂຕຜູ້ຈະມີສີດຳຟ້າ ຫລື ສີນ້ຳຕານແກ່. ຈະມີເຂົ້າທັງສອງເພດ, ຊຶ່ງເຂົ້າຂອງໂຕຜູ້ຈະມີຂະໜາດຄວາມຍາວແຕ່ 65 -

75 ຊມ. ແລະ ຈະມີໜອກຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງປ່າໄຫລ່; ງົວປ່າເປັນສັດປ່າທີ່ຂີ້ຍ້ານ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັກອາໄສຢູ່ປ່າໂລ່ງແຈ້ງເຂດຕ່ຳ ບໍ່ຄືກັນກັບ ເມີຍ. ງົວປ່າເປັນສັດທີ່ກິນໃບໄມ້, ຫຍ້າ ແລະ ເປັນສັດທີ່ມີການອອກເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນໃນເວລາກາງເວນ ແລະ ກາງຄືນ, ມັກຢູ່ ຮ່ວມກັນເປັນຝູງທີ່ມີຈຳນວນແຕ່ 2 - 40 ໂຕ ຊຶ່ງມີໂຕຜູ້ເດັມໄວທີ່ແຂງແຮງເປັນຫົວໜ້າຝູງ; ການ ປະສົມພັນຈະມີຢູ່ຕະຫລອດປີ ແລະ ໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 1 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

En

ປະຊາກອນຂອງ ງົວປ່າ ແມ່ນຫາຍາກທີ່ຈະພົບໃນໂລກ, ຫລື ບາງທີ່ຢູ່ໃນສປປ ລາວອາດຈະຖືກສູນ ພັນໄປແລ້ວ. ມັນເປັນສັດທີ່ຖືກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງປະເທດ. ມັນມັກອາໄສຢູ່ ບໍລິເວນໂລ່ງແຈ້ງເຂດຕ່ຳ ຈຶ່ງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການລ່າ. ປະຊາກອນບາງ ຝູງທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນສປປ ລາວ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດສັດຫວງຫ້າມສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຖ້າຍັງ ມີປະຊາກອນຂອງມັນອາໄສຢູ່ ອາດຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນຊະນິດພັນທີ່ຫວງຫ້າມສຳຄັນຂອງໂລກໄດ້.

ການປະກົດມີງົວປ່າຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ປະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າ ຍັງມີງົວປ່າຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ, ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ບາງທີ່ຈະມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆພາຍໃນແຂວງ.

106 ເຍືອງ. (Southern Serow) *Naemorhedus sumatraensis*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນສັດປ່າທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບແບ້ ມີອານາເຂດແຕ່ ພາກໃຕ້ຂອງສປ ຈີນ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງພູເຂົາຫຼີມະໄລ ຈີນໄປເຖິງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ຕາມ ປົກກະຕິລຳໂຕສ່ວນເທິງມີສີ ຂີ້ເຖົາ ຫລື ດຳ, ແຜນຂົນຢູ່ເທິງຄໍມີສີຂາວປົນດຳ ແລະ ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຈະມີສີຂາວ; ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສປປ ລາວ ເວົ້າວ່າ ມັນມັກອາໄສຢູ່ ໃນປ່າເລິກ, ຕາມກ້ອນຫີນ, ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ 2,700 ແມັດ. ອາຫານຂອງມັນມີ ຫຍ້າ, ໝໍ້ ແລະ ໃບໄມ້, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນສັດທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ບາງຄັ້ງສາມາດພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ເປັນຝຸງປະມານ 7 ໂຕ/ຝຸງ; ການປະສົມພັນເລີ້ມຕົ້ນ ລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ (10) - ພະຈິກ (11) ໂຕແມ່ຈະອອກລູກຄັ້ງລະ 1 ໂຕ.



ການອະນຸລັກ:

VU; CA I

ຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍຂອງສັດຊະນິດນີ້ອາດແມ່ນການລ່າເນື້ອ ເພື່ອການຄ້າຂາຍສັດປ່າ. ຮ່າງກາຍ ຂອງເຍືອງ ຈະຖືກຂາຍເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປຸງແຕ່ງຢາຢູ່ໃນສປປ ລາວ (ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະຜິດຕໍ່ ລະບຽບກົດໝາຍ).

ການປະກົດມີລົງລົມຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ອາດຈະຖືກພົບເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ, ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ສູງຊັນ. ມັນອາດ ຈະມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການລາຍງານວ່າ ມີຢູ່ໃນເຂດປ່າ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ້ນ.

107 ເສົາຫລາ. (Saola) *Pseudoryx nghetinhensis*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ໃນຕົ້ນປີ 1990 ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເລີ້ມອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບໂຕເສົາຫລາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ໃນປະເທດສສ ຫວຽດນາມ ໄກ້ໆ ກັບຊາຍແດນຂອງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ. ເປັນສັດທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ສະເພາະແຕ່ເຂດ ສາຍ ພູຫລວງຂອງສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອາໄສຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນປ່າ ໄມ້, ມີຂະໜາດນ້ຳໜັກ 100 ກິໂລ, ເປັນຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ມັກອາໄສຢູ່ເຂດປ່າດິບປຽກຊຸ່ມ, ບ່ອນທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ເປັນສັດທີ່ກິນ ຫຍ້າ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນກິນໃບໄມ້. ມັນຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນຕ້ອງການພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ສຳລັບເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ



ການອະນຸລັກ:

ARL; EN; CA I

ປະຊາກອນຂອງເສົາຫລາໃນປະຈຸບັນມີຈຳນວນໜ້ອຍຫລາຍ ແລະ ເປັນຊະນິດພັນທີ່ຕິກຢູ່ໃນໄພ ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ມັນອາດເປັນຊະນິດພັນທີ່ຕິກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ນັກລ່າເນື້ອທີ່ບໍ່ມີ ການຈຳແນກວ່າສັດໃດສຳຄັນ ຫລື ບໍ່ສຳຄັນ ທີ່ເຂົ້າມາລ່າສັດຢູ່ຕາມຊາຍແດນສສ ຫວຽດນາມ. ຖ້າ ຫາກບໍ່ມີການດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດໃດໜຶ່ງ ປະຊາກອນຂອງເສົາຫລາກໍ່ອາດຈະສູນ ພັນໄປໃນອີກບ່ອນນີ້.

ການປະກົດມີເສົາລາຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເສົາຫລາ ຖືກຖ່າຍຮູບຈຳນວນ 2 ຄັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ້ນ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ຟາກທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ມີເສົາຫລາອາໄສຢູ່ເຂດ ນ້ຳຈວນ ຊຶ່ງເປັນເຂດສະເໜີເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ຍັງມີສະຖານທີ່ອື່ນອີກຢູ່ໃນແຂວງທີ່ເສົາຫລາອາໄສຢູ່, ເສົາຫລາເປັນສັດທີ່ຈັດຢູ່ໃນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງການອະນຸລັກ.

108 ຂາດ່າງ ຫລື ພະຍາກະຮອກດຳ. (Black Giant Squirrel) *Ratufa bicolor*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເປັນສັດປ່າທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ລະຫວ່າງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເນປານ ມາຮອດ ອິນໂດເນເຊຍ. ມັນແມ່ນຂະດ່າງ ຫລື ພະຍາກະຮອກດຳ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ໃນສປປ ລາວ ແລະ ມັກອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕຶບໜາ. ດັ່ງທີ່ຊື່ຂອງມັນກໍ່ບອກຢູ່ແລ້ວ, ຕາມປົກກະຕິຈະມີສີ

ດຳ, ແຕ່ອາດຈະມີສີເຫລືອງ, ສີນ້ຳຕານ ຫລື ສີຂາວຢູ່ພື້ນທ້ອງ. ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕົ້ນໄມ້ເປັນພິເສດ. ອາຫານຂອງມັນຄື: ໝາກໄມ້, ແກ່ນໄມ້ ແຫ້ງທີ່ມີເປືອກແຂງ, ເປືອກໄມ້ບາງຊະນິດ, ແມງໄມ້ ແລະ ໄຂ່ນົກ. ເປັນສັດທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫລື ຢູ່ເປັນຄູ່. ມີລູກປະມານ 2 - 3 ໂຕ/ຄັ້ງ ແລະ ຈະອອກລູກ 2 ຄັ້ງ/ປີ.

ການອະນຸລັກ:

PARL; CA II

ສັດຊະນິດນີ້ຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມກົດດັນຈາກມະນຸດຫລາຍກວ່າກະຮອກຊະນິດອື່ນ, ແລະ ມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບໂຕ ທະນີ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນຈະບໍ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີປ່າໄມ້ເປັນຈຸດ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການລ່າສັດຫລາຍ (Wang et al 1989, Duckworth et al. 1994). ສັດຊະນິດນີ້ມັນຈະຖືກລ່າ ຍ້ອນວ່າມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່. ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ປະຊາກອນຂອງມັນຖືກຫລຸດລົງ, ແລະ ຖ້າສະພາບການລ່າສັດປ່າຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງມັນຍັງຈະມີຢ່າງຈຳກັດ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າໄມ້ທີ່ສົມບູນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ກໍ່ປະກົດມີຢູ່ບ່ອນດັ່ງກ່າວ.

ການປະກົດມີຂາດ່າງ ຫລື ພະຍາກະຮອກດຳຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ມັນໄດ້ຖືກພົບຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດ ນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ້ນ. ມັນອາດຈະມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ.

109 ກະຮອກ. (Inornate Squirrel) *Callosciurus inornatus*.



ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະຮອກຊະນິດນີ້ແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ອິນດູຈີນ ຊຶ່ງເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ. ມັນຄືໜຶ່ງໃນຈຳນວນກະຮອກທີ່ມີສີສັນສວຍລົດງົດງາມທີ່ສຸດ ໃນບັນດາສັດປ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສັດໃນຕະກູນກະຮອກຈະມີຄວາມສວຍງາມ. ຂົນຂອງມັນຈະມີຫລາຍສີ, ມັນເປັນສັດທີ່ມັກອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການລົບກວ່າ ແລະ ຢູ່ຕາມປ່າພື້ນພູເຂດຕ່ຳ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ເຂດກະສິກຳ ແລະ ຕາມສວນ.

ມັນມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ວ່ອງໄວທັງໃນເວລາກາງເວນ ແລະ ກາງຄືນ, ຕາມປົກກະຕິຈະອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້, ຢູ່ໃນໂກນໄມ້ ແລະ ຈະສ້າງຮັງດ້ວຍໄມ້ໄມ້ ແລະ ກິ່ງງ່າໄມ້. ອາຫານຂອງມັນປະກອບດ້ວຍ ໝາກໄມ້, ແກ່ນໄມ້ທີ່ມີເປືອກແຫ້ງແຂງ, ແກ່ນໄມ້, ຕາໄມ້, ດອກ

ໄມ້, ແມງໄມ້ ແລະ ໄຂ່ນົກ. ການປະສົມພັນຈະເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດປີ, ແລະ ໂຕແມ່ຈະອອກລູກ ປີໜຶ່ງ 3 ຄັ້ງ, ແຕ່ລະຄັ້ງຈະ ອອກລູກປະມານ 1 - 2 ໂຕ.

ການອະນຸລັກ:

LKL

ມັນມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ບາງຄັ້ງມັກອາໄສຢູ່ປ່າໄມ້ທີ່ມີການລົບກວນ ຊຶ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາກອນຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ທັນຕົກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປະຈຸບັນ. ການລ່າຈະມີທ່າທີ່ ຮ້າຍແຮງກວ່າການສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ມັນອາດຈະເກີດມີບັນຫາໄດ້ໃນອານາຄົດ.

ການປະກົດມີກະຮອກຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ສັດຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

110 ເໝັນ (East Asian Porcupine) *Hystrix brachyuran*.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:

ເໝັນຊະນິດນີ້ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແລະ ມັນ ເປັນສັດທີ່ມີການປັບຕົວໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ຈະສາມາດພົບເຫັນຢູ່ປ່າໄມ້ເກືອບທຸກ ປະເພດ, ແມ່ນແຕ່ປ່າປູກ, ເຂດພູເຂົາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເປັນຫີນ. ຫົວ, ຄໍ, ປ່າ ໄລ່ ແລະ ຕີນຈະປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍຂົນທີ່ແຫລມ ແລະ ແຂງສົນຄ້າງ ແລະ ສີ ດຳ. ມັນຈະມີຂົນຍາວຢູ່ລອບໆຄໍ ແລະ ຫລັງ. ມັນຈະເປັນເໝັນທີ່ມີທາງ ສັ້ນກວ່າໝູ່ໃນບັນດາເໝັນທຸກຊະນິດ. ມັນກິນເປືອກໄມ້, ຮາກໄມ້, ຫົວທີ່ເກີດຢູ່ໃຕ້ດິນ, ໝາກໄມ້ທີ່ ລົ່ນຕາມພື້ນ, ພືດກະສິກຳ ແລະ ບາງໂອກາດກໍ່ກິນ ແມງໄມ້, ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫລັງ ຂະໜາດນ້ອຍ, ມັກຈະລີ້ໄພຢູ່ໃນຖ້ຳ, ຫລືບຫີນ ຫລື ຕາມຜັງທີ່ຂຸດດ້ວຍມັນເອງ. ມັນເປັນສັດທີ່ ອອກເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາກາງຄືນ; ມັກຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ໃນຊຸມດຽວກັນ. ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະອອກລູກຄັ້ງໜຶ່ງປະມານ 1 - 4 ໂຕ.



ການອະນຸລັກ:

VU


ເໝັນຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອິນດູຈີນ ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແລະ ເປັນສັດທີ່ຢູ່ໃນ ບັນຊີແດງຂອງ ສະຫະພັນອະນຸລັກທຳມະຊາດສາກົນ (IUCN) ການປະເມີນຜົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ຍັງມີຄວາມລະມັດລະຫວ່າງກັນຫລາຍ ກ່ຽວກັບການລ່າສັດຊະນິດນີ້, ໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນວ່າຢູ່ໃນ ໂລກ ມີແຕ່ຢູ່ຂົງເຂດ ອິນດູຈີນ ທີ່ມີການລ່າຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຄຽງຄູ່ກັບປັດໃຈທາງດ້ານນິເວດວິ ທະຍາ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນຂອງພວກມັນບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ການ ຫລຸດລົງ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນບາງກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊະນິດພັນທີ່ມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ຂາດ່າງ ຫລື ພະຍາກະຮອກດຳ ແລະ ໝີຂໍ່ ຫລື ໝີກະຮອກ

ການປະກົດມີເໝັນຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ມັນອາດຈະຖືກພົບເຫັນຢູ່ທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວແຂວງ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ, ນ້ຳກະດິງ, ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປ້ນ.

timminsi.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:



ໃນປີ 1995 ກະຕ່າຍຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍນັກວິທະຍາສາດ ຢູ່ທີ່ຕະຫລາດຫລັກຊາວ. ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈະຮັບຮູ້ວ່າກະຕ່າຍຊະນິດນີ້ຈະສາມາດພົບເຫັນສະເພາະແຕ່ຢູ່ເຂດສາຍພູຫລວງໃນສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ບ່ອນທີ່ອາດຈະສາມາດພົບເຫັນສັດຊະນິດນີ້ໄດ້ແມ່ນຢູ່ບໍລິເວນປ່າດົງດິບເຂດປຽກຊຸ່ມເທົ່ານັ້ນ. ເປັນສັດທີ່ມີອານາເຂດຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດຫລາຍກວ່າກະຕ່າຍຊະນິດອື່ນຢູ່ໃນໂລກ. ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຂົນສີເຫຼືອງເຖົາ

ຫລື ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ແລະ ມີແຖບສີດຳເປັນລາຍຍາວເປັນ ຈຸດເດັ່ນ. ມີຫູສັ້ນ ແລະ ທາງນ້ອຍ. ມັນມີອຸປະນິໄສຄ້າຍຄືກັນກັບກະຕ່າຍ ຊູມາດຕຣາ, ຊຶ່ງສາມາດພົບເຫັນ ສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນເກາະ ຊູມາດຕຣາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ກະຕ່າຍ ຊູມາດຕຣາ ອາໄສຢູ່ກ້ອງປ່າໄມ້ ກິນກ້າງໄມ້ນ້ອຍ ແລະ ໃບໄມ້. ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ, ຈະພັກຜ່ອນຢູ່ໃນຜັງຂອງສັດຊະນິດອື່ນໃນເວລາກາງເວນ. Francis, 2001.

ການອະນຸລັກ:

DD

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະຕ່າຍຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ມີຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດ, ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆທີ່ມີຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພວກມັນແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ.

ການປະກົດມີກະຕ່າຍລາຍເສືອຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຢູ່ໃນສປປ ລາວ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດຊະນິດນີ້ມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຕະຫລາດຫລັກຊາວ. ໄດ້ມີການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ມີຢູ່ໃນເຂດນ້ຳຈັດ - ນ້ຳປັ້ນ, ແລະ ຈະບໍ່ເປັນທີ່ສົງໄສເລີຍວ່າ ພວກມັນອາດຈະອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າດົງດິບເຂດປຽກຊຸ່ມຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ - ນ້ຳເທີນ ແລະ ນ້ຳຈວນ ຊຶ່ງເປັນເຂດສະເໝີເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ປະຫວັດທາງທຳມະຊາດ:



ເປັນສັດຊະນິດໄໝ້ທີ່ຫາກໍ່ຄົ້ນພົບ ມັນຖືກເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງເປັນພາສາລາວວ່າ ໝູ່ກ້ອນຫິນ, ແລະ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນຂອບສຸດທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນເຂດພູຫິນປູນ. ມັນມີຫົວຍາວສີດຳ ຫລື ສີຂີ້ເຖົາດຳ, ທາງພື້ນທ້ອງມີສີຂີ້ເຖົາອ່ອນ. ຄາດວ່າມັນເປັນສັດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວມັນເປັນສັດທີ່ກິນແຕ່ພືດເຊັ່ນ: ກິນໃບໄມ້, ຫຍ້າ ແລະ ແກ່ນໄມ້; ເຊື່ອກັນວ່າໂຕແມ່ ຈະອອກລູກຄັ້ງໜຶ່ງພຽງໂຕດຽວ. Jenkins, Kilpatrick et al 2005.

ການອະນຸລັກ:

ໃນປີ 2005 ສັດຊະນິດນີ້ຖືກບັນລະຍາຍທາງດ້ານວິທະຍາສາດເປັນຄັ້ງແລກ, ສະຖານະພາບໃນການອະນຸລັກສັດຊະນິດນີ້ ຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກມັນອາໄສຍັງບໍ່ທັນມີເທື່ອ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ປະຊາຊົນມັກໃສ່ແຮ້ວ ເພື່ອເອົາມັນໄປເປັນອາຫານ.

ການປະກົດມີຂະຍູຢູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ຂະຍູ ຈະປະກົດມີສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

4 ການອະນຸລັກຊະນິດພັນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສແບບປະສົມປະສານ

1.2 ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບ ປະເພດຂອງພືດທຳມະຊາດ

ການອະນຸລັກຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ: ການອະນຸລັກທີ່ບໍ່ມີເຂດແດນ. ຍຸດທະສາດການອະນຸລັກຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ ແມ່ນອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ງ່າຍດາຍ: ສັດປ່າທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະຊະນິດພັນທີ່ມີອານາເຂດອັນກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ຊ້າງປ່າ, ໝີ ແລະ ເສືອດາວ. ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ປ່າສະຫງວນຄືສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກ, ພືດທຳມະຊາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງຜູ້ຢູ່ໄກ້ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີທັງປະຊາຊົນ ແລະ ສັດປ່າອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ແບ່ງເປັນເຂດຫຼວງຫຼາຍ. ໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດເຫຼົ່ານີ້ “ພືດທຳມະຊາດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວພັນ ຫລື ຕິດແໜ້ນກັບເຂດປ່າສະຫງວນ ຫລື ອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໄກ້ຄຽງ, ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ທຸກວັນນີ້, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ 28 ເຂດທີ່ເປັນພືດທຳມະຊາດທາງພື້ນດິນ ແລະ ທາງທະເລ ຢູ່ທົ່ວ ອາຟຣິກາ, ອາຊຽນ, ອາເມລິການລາຕິນ ແລະ ອາເມລິການເໜືອ, ລວມທັງສປປ ລາວ. ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດ ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາມະນຸດ, ດ້ວຍການສ້າງຮູບແບບທີ່ມີຄວາມດູ່ດຽງຂອງທັງສອງຢ່າງ ແລະ ແບບມີຄວາມຍືນຍານ.

ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໃນທາງທີ່ດີກວ່າ ສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະ ສັດປ່າ ເພື່ອການແບ່ງປັນ ແລະ ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ ຊຶ່ງເປັນຊັບສົມບັດທາງທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງດ້ວຍສາຍຕາຂອງນັກອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ເບິ່ງໄປລອບໄລຂອບເຂດຊາຍແດນ, ເຫັນວ່າຍັງມີພື້ນທີ່ອີກຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງຢູ່ເທິງໂລກໜ່ວຍນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອິດທິພົນລົບກວນຈາກມະນຸດ. ຜົນທີ່ຕາມມາຄື, ການພັດທະນາລະບົບການອະນຸລັກຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ ແລະ ການທົດສອບຍຸດທະສາດພື້ນຖານການອະນຸລັກສັດປ່າ ຊຶ່ງໄດ້ມີການກວດສອບຜົນກະທົບຈາກມະນຸດ, ແລະ ເຊື່ອມຍິງກັບການກວດກາສັດປ່າໂດຍກົງເພື່ອເປັນການປະເມີນຂະບວນການຂອງສັດປ່າ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດພື້ນຖານ ແລະ ຮູບແບບຂອງພື້ນທີ່ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອະນຸລັກ ຊຶ່ງເປັນຄວາມພໍໃຈຢ່າງຍິ່ງ.

1.3 ຊະນິດພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອດຳເນີນການອະນຸລັກຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ:

ເພື່ອຕອບສະໜອງກອບວຽກໃນການດຳເນີນການອະນຸລັກ, ພວກເຮົາມີການນຳໃຊ້ຊະນິດພັນຕ່າງໆ ດ້ວຍການອະນຸລັກຊະນິດພັນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງພືດທຳມະຊາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງອະນຸລັກຊະນິດພັນທີ່ປະກົດມີຢູ່ຮ່ວມກັນນັ້ນໄວ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ພວກມັນຂຶ້ນກັບ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງ “ຊະນິດພັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທິວທັດທຳມະຊາດ” ເປັນຄືແນວໃດ? ໄດ້ມີການພັດທະນາມາດຕະຖານ 5 ຢ່າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ເປັນຫຼັກການສຳລັບ ໂຄງການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທິວທັດທຳມະຊາດເຊັ່ນ: 1) ເນື້ອທີ່, 2) ຕ່າງຊະນິດພັນກັນ, 3) ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງທີ່ລົບກວນ ແລະ ກະທົບ, 4) ໜ້າທີ່ສະເພາະ, 5) ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

1) **ເນື້ອທີ່:** ໝາຍເຖິງອານາເຂດຂອງຊະນິດພັນ. ຊະນິດພັນທີ່ມີອານາເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແມ່ນຕ້ອງການເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່; ຕົວຢ່າງ: ເສືອໂຄ່ງ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະນຸລັກ ເມື່ອທາກມີການປະເຊີນໜ້າກັນກັບມະນຸດລົບກວນ. ການອະນຸລັກອານາເຂດອັນກວ້າງຂວາງຂອງເສືອໂຄ່ງ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າການປ້ອງກັນອານາເຂດຂອງຊະນິດພັນສັດທີ່ນ້ອຍກວ່າເສືອໂຄ່ງ.

2) **ຕ່າງຊະນິດພັນກັນ:** ນີ້ແມ່ນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສສະເພາະ ແລະ ປະເພດພືດພັນທີ່ຊະນິດພັນນັ້ນຕ້ອງ ການເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ຕົວຢ່າງ: ເສືອດາວ ຕ້ອງການສັດທີ່ເປັນອາຫານສະເພາະຂອງມັນ ຢ່າງພຽງພໍ, ແລະ ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢ່າງພຽງພໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການລ່າເນື້ອ ແລະ ການສືບພັນຂອງມັນ. ຖ້າຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທາກມີປະຊາກອນສັດປ່າທີ່ເປັນເຍື່ອຂອງເສືອດາວໜ້ອຍ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມີປ່າໂລ່ງແຈ້ງເກີນໄປສຳລັບມັນ ການລ່າເນື້ອຕາມວິທີການປົກກະຕິເຊັ່ນ ການໂຈມຕີ ແບບກະທັນຫັນມັນບໍ່ສາມາດກະທຳໄດ້ ກໍ່ໝາຍວ່າມັນຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ. ການອະນຸລັກຊະນິດພັນທີ່ຕ້ອງການໃນຫລາຍໆ ປະເພດຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອການຢູ່ລອດຂອງມັນ ແລະ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊະນິດພັນອື່ນທີ່ຕ້ອງການຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

3) **ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນ ແລະ ກະທົບ:** ເມື່ອຊະນິດພັນຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການນຳໃຊ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນໂດຍມະນຸດ. ຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມາດຕະຖານການຄັດເລືອກເອົາເປັນຊະນິດພັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທິວທັດທຳມະຊາດ. ຕົວຢ່າງ: ນາກນ້ຳ ຕ້ອງການຄວາມສະອາດ, ນ້ຳທີ່ໄຫລຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ມີອາຫານພຽງພໍສຳລັບຄວາມຢູ່ລອດ. ການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ນ້ຳໂດຍຜ່ານສິ່ງທີ່ເປັນມົນລະຜິດ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຫລື ແມ່ນແຕ່ມີການຫາປາເກີນກຳນົດ ມັນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ປະຊາກອນຂອງ ນາກນ້ຳ. ການອະນຸລັກ ນາກນ້ຳ ອາດຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊະນິດອື່ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ແມ່ນ້ຳເຊັ່ນກັນ.

4) **ໜ້າທີ່ສະເພາະ:** ໄດ້ມີການໃຫ້ນິຍາມວ່າ ມີບົດບາດຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ຊຶ່ງຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ. ຫລາຍຊະນິດພັນຈະມີບົດບາດຫລາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ນົກກີກ ມີບົດບາດໃນການກະຈາຍແກ່ນໄມ້ທີ່ມັນກິນ. ການອະນຸລັກ ນົກກີກ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບການຟື້ນຟູປ່າ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ.

5) **ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ:** ມັນມີຄຸນຄ່າທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເພາະຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ມັນອາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນທາງບວກເຊັ່ນ: ສ້າງແຫລ່ງອາຫານຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບມະນຸດ ຫລື ຕອບສະໜອງລາຍໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫລື ສ້າງຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບເຊັ່ນ: ການກິນ ຫລື ການທຳລາຍພືດ

ກະສິກຳ. ຕົວຢ່າງ: ຊ້າງປ່າ ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວ ແລະ ກໍ່ສາມາດເປັນ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຈະກິນ ຫລື ທຳລາຍຜົນຜະລິດທາງກະສິກຳ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງບ່ອນປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານເຊັ່ນ ການທຳລາຍສວນໝາກກ້ວຍ, ສວນອ້ອຍ ແລະ ເຂົ້າ.

ຊະນິດພັນທີ່ສາມາດຄົບຕາມ 5 ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຊະນິດ ພັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທິວທັດທຳມະຊາດ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຊະນິດພັນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແມ່ນຈະມີເຄື່ອງໝາຍກາດາວ (*) .

ແປຄຳສັບຫຍໍ້

Aquatic = ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ

Arboreal = ເປັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ຫລື ຕາມພືດຊະນິດອື່ນໆ

Bird of prey = ນົກທີ່ລ່າ ແລະ ກິນສັດອື່ນເປັນຕົ້ນຕໍ

Biodiversity = ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ

Canopy = ຊັ້ນເຮືອນຍອດຂອງຕົ້ນໄມ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ

Carapace = ອອງເຕົ້າ ຫລື ອອງປາຝາ

Carnivorous = ສັດກິນຊີ້ນ ແລະ ລ່າສັດອື່ນເປັນອາຫານ

Catchment = ອາງໂຕ່ງນ້ຳ

Clutch = ຈຳນວນທັງໝົດຂອງໄຂ່ທີ່ສັດປ່າ ຫລື ນົກວາງໄຂ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

Conservation = ການປົກປັກຮັກສາ, ການບຳລຸງຮັກສາ, ການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍານ, ການ ຟື້ນຟູ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Deciduous forest = ປ່າຜັດປ່ຽນໃບໃນບາງຊ່ວງຂອງປີເຊັ່ນ: ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຫລື ໃນ ລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ

Diurnal = ສັດທີ່ອອກເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນໃນເວລາກາງເວນ

Dipterocarp = ປ່າໂຄກ

Endemic = ເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ

Evergreen forest = ປ່າດົງດິບ

Everwet forest = ປ່ານ້ຳຝົນ

Extinction = ສູນພັນ

Forage = ພືດ ແລະ ຫຍ້າທີ່ສັດກິນ

Habitat = ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ

Karst = ພູຫີນປູນ ຫລື ຫີນປູນ

Marshland = ເຂດດິນບໍລິເວນນ້ຳທີ່ເປັນຕົມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ ຫຍ້າ, ພືດ ແລະ ອື່ນໆ

Nocturnal = ສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນໃນເວລາກາງຄືນ

Nomadic = ສັດທີ່ມີນິເສັມກເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງຫາສະຖານທີ່ອື່ນ ຫລາຍກວ່າທີ່ ຈະຢູ່ບ່ອນເກົ່າ

Omnivorous = ເປັນສັດທີ່ກິນທັງພືດ ແລະ ສັດ

Plastron = ບໍລິເວນພື້ນທ້ອງຂອງເຕົ້າ ຫລື ປາຝາ

Primary forest = ເປັນດັ່ງເດີມທີ່ມີຄວາມສົມບູນທີ່ສຸດ ປາດສະຈາກການບຸກລຸກທຳລາຍ

Range = ອານາເຂດບ່ອນທີ່ພົບເຫັນສັດ

Rare = ສັດ ຫລື ພືດທີ່ຫາຍາກ

Riverine = ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນນ້ຳ

Savannah = ທົ່ງຫຍ້າທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ເກີດຢູ່ຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ

Secondary forest = ປ່າໄມ້ທີ່ມີການຟື້ນຟູ ຫລື ປູກຄົນຫລັງຈາກທີ່ຖືກບຸກລຸກທຳລາຍຈາກການຂຸດຄົ້ນ

Threatened = ໄພຂົ່ມຂູ່ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫລື ສັນນິຖານວ່າຈະສູນພັນ

Trend = ແນວໂນ້ມຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ (ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫລຸດລົງ ຫລື ຄົງທີ່)

Tributaries = ປາກແມ່ນ້ຳ

Understory = ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ກ້ອງຂອງຊັ້ນເຮືອນຍອດປ່າອື່ນ ທີ່ມີລັກສະນະຂອງຕົ້ນໄມ້ຍັງອ່ອນ

Ungulate = ສັດຕີນກີບເຊັ່ນ: ເມີຍ, ງົວ ຫລື ຄວາຍ

Venomous = ສັດປ່າທີ່ສາມາດກັດ ແລະ ປ່ອຍຜິດໃສ່ສັດຕູຂອງມັນ ເພື່ອເປັນອາຫານ ຫລື ປ້ອງກັນຕົວ

BIBLIOGRAPHY

Anenjeva and Stuart, 2001. *Russian Journal of Herpetology*, vol. 8, no. 3.

Campden-Main, 1970. *A Field Guide to the Snakes of South Vietnam*. Smithsonian Institution.

Eames, June 2001. *Oriental Bird Club*. Bulletin 33.

Feare and Craig, 1998. *Starlings and Mynas*. Christopher Helm.

Foster-Turley, Macdonald, Mason, eds, 1990. *Otters, An Action Plan for Their Conservation*. IUCN/SSC Otter Specialist Group.

Francis, 2001. *Mammals of Thailand and Southeast Asia*. Asia Books.

Gibbs, Barnes and Cox, 2001. *Pigeons and Doves, A Guide to Pigeons and Doves of the World*. Pica Press.

Grimmett, Inskipp and Inskipp, 1998. *Birds of the Indian Subcontinent*. Helm Identification Guides.

Hayman, Marchant and Prater, 1995. *Shorebirds: An Identification Guide to the Waders of the World*. Christopher Helm.

Jenkins, Kilpatrick, Robinson and Timmins, April 2005. *Systematics and Biodiversity* 2 (4).

Lambert and Woodcock, 1996. *Pittas, Broadbills and Asities*. Pica Press.

Mackinnon and Phillipps, 2000. *A Field Guide to the Birds of China*. Oxford University Press.

Rasmussen and Anderton, 2005. *Birds of South Asia. The Ripley Guide, Volume 2*. Smithsonian Institution.

Turner and Rose, 1994. *A Handbook to the Swallows and Martins of the World*. Christopher Helm.

IMAGE CREDITS

Ban Vanbian village/WCS and IUCN. **107**

A. Benn. **70**

S. Chape/IUCN. **Introduction (Forest and Limestone Karst)**

T.D. Evans/WCS. **109**

D.B. Hendrie. **2, 8**

A. Johnson/WCS. **80, 82, 99**

Larrac/Dept of Forestry. **21**

C.W. Marsh/IUCN. **81**

P. Pattanakeaw / WCS. **98**

W.G. Robichaud. **74, 112**

W.G. Robichaud/WCS. **90, 91,102,108**

W.G. Robichaud/WCS and IUCN. **95,106**

C. Robson. **22 – 65, 67 – 69, 71, 72**

B. L. Stuart/WCS. **12, 14, 15, 17**

J.A. Tobias/WCS and IUCN. **66**

P.P. van Dijk. **1, 3 - 7, 9 – 11**

C. Vongkhamheng / IUCN and WCS. **104**

WCS Lao/NEPL NPA. **78, 83 – 87, 93 – 97, 103, 110**

Table 1 – Important Species In Lao PDR

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
1	<i>Ichthyophis sp.</i>	Caecilians		
2	<i>Leptolalax pelodytoides</i>	Asian horned frogs		
3	<i>Leptobranchium pullum</i>	asian horned frog		
4	<i>Megophrys lateralis</i>	asian horned frogs		
5	<i>Ophryophryne poilani</i>	asian horned frog		
6	<i>Bufo galeatus</i>	toad		
7	<i>Huia nasica</i>	frog		
8	<i>Limnonectes kuhlii</i>	typical frog		
9	<i>Paa microlineata</i>	typical frog		
10	<i>Rana andersonii</i>	typical frog		
11	<i>Rana archotaphus</i>	typical frog		
12	<i>Rana johnsi</i>	typical frog		
13	<i>Rana limnocharis</i>	typical frog		
14	<i>Rana livida</i>	typical frog		
15	<i>Rana maosonensis</i>	typical frog		
16	<i>Rana nigrovittata</i>	typical frog		
17	<i>Rana taipehensis</i>	typical frog		
18	<i>Polypedates feae</i>	tree frog		
19	<i>Polypedates leucomystax</i>	tree frog		
20	<i>Rhacophorus bisacculus</i>	tree frog		
21	<i>Rhacophorus calcaneus</i>	tree frog		
22	<i>Kalophrynus pleurostigma</i>	narrow-mouthed frog		
23	<i>Microhyla annamensis</i>	leaf litter frogs		
24	<i>Microhyla berdmorei</i>	leaf litter frogs		
25	<i>Aerodramus sp.</i>	swiftlet		
26	<i>Francolinus pintadeanus</i>	Chinese Francolin		
27	<i>Arborophila rufogularis</i>	Rufous-throated Partridge		
28	<i>Arborophila brunneopectus</i>	Bar-backed Partridge		
29	<i>Arborophila charltonii</i>	Scaly-breasted Partridge		
30	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl		
31	<i>Lophura nycthemera</i>	Silver Pheasant		
32	<i>Lophura sp.</i>	pheasant		
33	<i>Lophura diardi</i>	Siamese Fireback	Globally Near-Threatened	PARL
34	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	Grey Peacock Pheasant		
35	<i>Rheinardia ocellata</i>	Crested Argus	Globally Threatened - Vulnerable; CA I	ARL
36	<i>Pavo muticus</i>	Green Peafowl	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	ARL
37	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lesser Whistling-duck		
38	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose		ARL
39	<i>Cairina scutulata</i>	White-winged Duck	Globally Threatened - Endangered; CA I	ARL
40	<i>Anas querquedula</i>	Garganey		
41	<i>Anas crecca</i>	Common Teal		
42	<i>Turnix tanki</i>	Yellow-legged Buttonquail		
43	<i>Turnix sp.</i>	buttonquail		
44	<i>Dendrocopos atratus</i>	Stripe-breasted Woodpecker		
45	<i>Celeus brachyurus</i>	Rufous Woodpecker		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
46	<i>Picus chlorolophus</i>	Lesser Yellownape		
47	<i>Picus flavinucha</i>	Greater Yellownape		
48	<i>Picus vittatus</i>	Laced Woodpecker		
49	<i>Picus sp</i>	woodpecker		
50	<i>Picus rabieri</i>	Red-collared Woodpecker	Globally Near-Threatened	
51	<i>Picus canus</i>	Grey-headed Woodpecker		
52	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	Greater Flameback		
53	<i>Gecinulus grantia</i>	Pale-headed Woodpecker		
54	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	Bay Woodpecker		
55	<i>Meiglyptes jugularis</i>	Black-and-Buff Woodpecker		
56	<i>Hemicircus canente</i>	Heart-spotted Woodpecker		
57	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Great Slaty Woodpecker		
58	<i>Megalaima virens</i>	Great Barbet		
59	<i>Megalaima lagrandieri</i>	Red-vented Barbet		
60	<i>Megalaima lineata</i>	Lineated Barbet		
61	<i>Megalaima franklinii</i>	Golden-throated Barbet		
62	<i>Megalaima incognita</i>	Moustached Barbet		
63	<i>Megalaima australis</i>	Blue-eared Barbet		
64	<i>Anthraceroceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	CA II	
65	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	Globally Near-Threatened; CA I	ARL
66	<i>Anorrhinus tickelli</i>	Brown Hornbill	Globally Near-threatened; CA II	PARL
67	<i>Aceros nipalensis</i>	Rufous-necked Hornbill	Globally Threatened - Vulnerable; CA I	ARL
68	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	CA II	ARL
69	<i>Harpactes oreskios</i>	Orange-breasted Trogon		
70	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Red-headed Trogon		
71	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller		
72	<i>Eurystomus orientalis</i>	Dollarbird		
73	<i>Alcedo hercules</i>	Blyth's Kingfisher	Globally Near-Threatened	PARL
74	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher		
75	<i>Lacedo pulchella</i>	Banded Kingfisher		
76	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher		
77	<i>Megaceryle lugubris</i>	Crested Kingfisher		
78	<i>Nyctornis athertoni</i>	Blue-bearded Bee-eater		
79	<i>Merops orientalis</i>	Green Bee-eater		
80	<i>Merops viridis</i>	Blue-throated Bee-eater		
81	<i>Merops leschenaulti</i>	Chestnut-headed Bee-eater		
82	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	Large Hawk Cuckoo		
83	<i>Cuculus micropterus</i>	Indian Cuckoo		
84	<i>Cuculus saturatus</i>	Oriental Cuckoo		
85	<i>Cacomantis sonneratii</i>	Banded Bay Cuckoo		
86	<i>Cacomantis merulinus</i>	Plaintive Cuckoo		
87	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	Asian Emerald Cuckoo		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
88	<i>Surniculus lugubris</i>	Drongo Cuckoo		
89	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Asian Koel		
90	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Green-billed Malkoha		
91	<i>Carpococcyx renauldi</i>	Coral-billed Ground Cuckoo		
92	<i>Centropus sinensis</i>	Greater Coucal		
93	<i>Centropus bengalensis</i>	Lesser Coucal		
94	<i>Loriculus vernalis</i>	Vernal Hanging Parrot	CA II	
95	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	Silver-backed Needle-tail		
96	<i>Hirundapus giganteus</i>	Brown-backed Needle-tail		
97	<i>Hirundapus sp.</i>	needle-tail		
98	<i>Cypsiurus balasienis</i>	Asian Palm Swift		
99	<i>Apus pacificus</i>	Fork-tailed Swift		
100	<i>Phodilus badius</i>	Oriental Bay Owl	CA II	
101	<i>Otus spilocephalus</i>	Mountain Scops Owl	CA II	
102	<i>Otus bakkamoena</i>	Collared Scops Owl	CA II	
103	<i>Ketupa sp.</i>	fish owl		
104	<i>Ketupa flavipes</i>	Tawny Fish Owl	CA II	LKL
105	<i>Glaucidium brodiei</i>	Collared Owlet	CA II	
106	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Asian Barred Owlet	CA II	
107	<i>Ninox scutulata</i>	Brown Hawk Owl	CA II	
108	<i>Eurostopodus macrotis</i>	Great Eared Nightjar		
109	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Large-tailed Nightjar		
110	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle Dove		
111	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove		
112	<i>Macropygia unchall</i>	Barred Cuckoo Dove		
113	<i>Chalcophaps indica</i>	Emerald Dove		
114	<i>Treron curvirostra</i>	Thick-billed Green Pigeon		
115	<i>Treron apicauda</i>	Pin-tailed Green Pigeon		
116	<i>Treron seimundi</i>	Yellow-vented Green Pigeon		
117	<i>Treron sp.</i>	pigeon		
118	<i>Ducula aenea</i>	Green Imperial Pigeon		ARL
119	<i>Ducula badia</i>	Mountain Imperial Pigeon		
120	<i>Ducula sp.</i>	pigeon		
121	<i>Gallinago sp.</i>	snipe		
122	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen		
123	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen		
124	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock		
125	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank		
126	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank		
127	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper		
128	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper		
129	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper		
130	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Pheasant-tailed Jacana		
131	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover		
132	<i>Vanellus duvaucelii</i>	River Lapwing		ARL
133	<i>Vanellus cinereus</i>	Grey-headed Lapwing		PARL
134	<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing		
135	<i>Aviceda jerdoni</i>	Jerdon's Baza	CA II	

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
136	<i>Aviceda leuphotes</i>	Black Baza	CA II	
137	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Oriental Honey-buzzard	CA II	
138	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	CA II	ARL
139	<i>Ichthyophaga humilis</i>	Lesser Fish Eagle	Globally Near-Threatened	ARL
140	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grey-headed Fish Eagle	Globally Near-Threatened; CA II	ARL
141	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle	CA II	
142	<i>Circus aeruginosus</i>	Eurasian Marsh Harrier	CA II	
143	<i>Circus melanoleucos</i>	Pied Harrier	CA II	
144	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Crested Goshawk	CA II	
145	<i>Accipiter badius</i>	Shikra	CA II	
146	<i>Butastur indicus</i>	Grey-faced Buzzard	CA II	
147	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	CA II	
148	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Black Eagle	CA II	
149	<i>Aquila sp.</i>	eagle		
150	<i>Hieraaetus kienerii</i>	Rufous-bellied Eagle	CA II	
151	<i>Spizaetus nipalensis</i>	Mountain Hawk Eagle	CA II	
152	<i>Microhierax melanoleucos</i>	Pied Falconet	CA II	LKL
153	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	CA II	
154	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe		
155	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret		
156	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron		PARL
157	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron		PARL
158	<i>Ardeola sp.</i>	pond heron		
159	<i>Butorides striatus</i>	Little Heron		
160	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern		
161	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	CA II	ARL
162	<i>Pitta oatesi</i>	Rusty-naped Pitta		
163	<i>Pitta cyanea</i>	Blue Pitta		
164	<i>Pitta sp</i>	pitta		
165	<i>Corydon sumatranus</i>	Dusky Broadbill		
166	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Banded Broadbill		
167	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	Long-tailed Broadbill		
168	<i>Irena puella</i>	Asian Fairy Bluebird		
169	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Blue-winged Leafbird		
170	<i>Chloropsis aurifrons</i>	Golden-fronted Leafbird		
171	<i>Chloropsis hardwickii</i>	Orange-bellied Leafbird		
172	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike		
173	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike		
174	<i>Lanius tephronotus</i>	Grey-backed Shrike		
175	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay		
176	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Red-billed Blue Magpie		
177	<i>Urocissa whiteheadi</i>	White-winged Magpie		PARL
178	<i>Cissa chinensis</i>	Common Green Magpie		
179	<i>Cissa sp.</i>	magpie		
180	<i>Dendrocitta formosae</i>	Grey Treepie		
181	<i>Crypsirina temia</i>	Racket-tailed Treepie		
182	<i>Temnurus temnurus</i>	Ratchet-tailed Treepie		
183	<i>Artamus fuscus</i>	Ashy Woodswallow		
184	<i>Oriolus xanthornus</i>	Black-hooded Oriole		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
185	<i>Oriolus sp.</i>	oriole		
186	<i>Oriolus traillii</i>	Maroon Oriole		
187	<i>Coracina macei</i>	Large Cuckooshrike		
188	<i>Coracina sp.</i>	cuckooshrike		
189	<i>Coracina melaschistos</i>	Black-winged Cuckooshrike		
190	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Small Minivet		
191	<i>Pericrocotus sp.</i>	Honey-Buzzard		
192	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	Short-billed Minivet		
193	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Scarlet Minivet		
194	<i>Hemipus picatus</i>	Bar-winged Flycatcher-shrike		
195	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo		
196	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo		
197	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo		
198	<i>Dicrurus remifer</i>	Lesser Racket-tailed Drongo		
199	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Spangled Drongo		
200	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo		
201	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch		
202	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Asian Paradise-flycatcher		
203	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Japanese Paradise-flycatcher	Globally Near-Threatened	LKL
204	<i>Aegithina tiphia</i>	Common Iora		
205	<i>Aegithina lafresnaye</i>	Great Iora		
206	<i>Tephrodornis gularis</i>	Large Woodshrike		
207	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	Common Woodshrike		
208	<i>Cinclus pallasii</i>	Brown Dipper		PARL
209	<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock Thrush		
210	<i>Zoothera citrina</i>	Orange-headed Thrush		
211	<i>Zoothera sibirica</i>	Siberian Thrush		
212	<i>Zoothera dauma</i>	Scaly Thrush		
213	<i>Zoothera marginata</i>	Dark-sided Thrush		
214	<i>Turdus merula</i>	Eurasian Blackbird		
215	<i>Turdus obscurus</i>	Eyebrowed Thrush		
216	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	Lesser Shortwing		
217	<i>Ficedula parva</i>	Red-throated Flycatcher		
218	<i>Ficedula monileger</i>	White-gorgeted Flycatcher		
219	<i>Ficedula hyperythra</i>	Snowy-browed Flycatcher		
220	<i>Ficedula westermanni</i>	Little Pied Flycatcher		
221	<i>Eumyias thalassina</i>	Verditer Flycatcher		
222	<i>Niltava grandis</i>	Large Niltava		
223	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Small Niltava		
224	<i>Niltava sp.</i>	niltava		
225	<i>Cyornis concretus</i>	White-tailed Flycatcher		
226	<i>Cyornis hainanus</i>	Hainan Blue Flycatcher		
227	<i>Cyornis unicolor</i>	Pale Blue Flycatcher		
228	<i>Cyornis sp.</i>	flycatcher		
229	<i>Cyornis banyumas</i>	Hill Blue Flycatcher		
230	<i>Cyornis tickelliae</i>	Tickell's Blue Flycatcher		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
231	<i>Muscicapella hodgsoni</i>	Pygmy Blue Fly-catcher		
232	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Grey-headed Canary Flycatcher		
233	<i>Luscinia cyane</i>	Siberian Blue Robin		
234	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Orange-flanked Bush Robin		
235	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie Robin		
236	<i>Copsychus malabaricus</i>	White-rumped Shama		
237	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	White-capped Water Redstart		
238	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Plumbeous Water Redstart		
239	<i>Myiomela leucura</i>	White-tailed Robin		
240	<i>Enicurus schistaceus</i>	Slaty-backed Forktail		
241	<i>Enicurus leschenaulti</i>	White-crowned Fork-tail		
242	<i>Cochoa viridis</i>	Green Cochoa		
243	<i>Saxicola torquata</i>	Common Stonechat		
244	<i>Saxicola ferrea</i>	Grey Bushchat		
245	<i>Sturnus malabaricus</i>	Chestnut-tailed Starling		
246	<i>Sturnus sinensis</i>	White-shouldered Starling		
247	<i>Sturnus nigricollis</i>	Black-collared Starling		
248	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna		
249	<i>Acridotheres cinereus</i>	White-vented Myna		
250	<i>Ampeliceps coronatus</i>	Golden-crested Myna		PARL
251	<i>Gracula religiosa</i>	Hill Myna	CA II	
252	<i>Sitta castanea</i>	Chestnut-bellied Nuthatch		
253	<i>Sitta formosa</i>	Beautiful Nuthatch	Globally Threatened - Vulnerable	PARL
254	<i>Parus spilonotus</i>	Yellow-cheeked Tit		
255	<i>Melanochlora sultanea</i>	Sultan Tit		
256	<i>Aegithalos concinnus</i>	Black-throated Tit		
257	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow		
258	<i>Hirundo daurica</i>	Red-rumped Swallow		
259	<i>Delichon sp.</i>	martin		
260	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Black-crested Bulbul		
261	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Red-whiskered Bulbul		
262	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Sooty-headed Bulbul		
263	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	Stripe-throated Bulbul		
264	<i>Alophoixus pallidus</i>	Puff-throated Bulbul		
265	<i>Iole propinqua</i>	Grey-eyed Bulbul		
266	<i>Hemixos flavala</i>	Ashy Bulbul		
267	<i>Hypsipetes mcclllandii</i>	Mountain Bulbul		
268	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul		
269	<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola		
270	<i>Prinia hodgsonii</i>	Grey-breasted Prinia		
271	<i>Prinia flaviventris</i>	Yellow-bellied Prinia		
272	<i>Prinia inornata</i>	Plain Prinia		
273	<i>Zosterops sp.</i>	white-eye		
274	<i>Tesia olivea</i>	Slaty-bellied Tesia		
275	<i>Cettia diphone</i>	Japanese Bush Warbler		
276	<i>Locustella lanceolata</i>	Lanceolated Warbler		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
277	<i>Acrocephalus aedon</i>	Thick-billed Warbler		
278	<i>Orthotomus sutorius</i>	Common Tailorbird		
279	<i>Orthotomus atrogularis</i>	Dark-necked Tailorbird		
280	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler		
281	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's Warbler		
282	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas's Leaf Warbler		
283	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler		
284	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	Pale-legged Leaf Warbler		
285	<i>Phylloscopus reguloides</i>	Blyth's Leaf Warbler		
286	<i>Phylloscopus davisoni</i>	White-tailed Leaf Warbler		
287	<i>Phylloscopus cantator</i>	Yellow-vented Warbler		
288	<i>Phylloscopus ricketti</i>	Sulphur-breasted Warbler		
289	<i>Phylloscopus sp</i>	Limestone Leaf Warbler		
290	<i>Seicercus burkii</i>	Golden-spectacled Warbler		
291	<i>Seicercus poliogenys</i>	Grey-cheeked Warbler		
292	<i>Abroscopus albogularis</i>	Rufous-faced Warbler		
293	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Yellow-bellied Warbler		
294	<i>Garrulax leucolophus</i>	White-crested Laughingthrush		
295	<i>Garrulax monileger</i>	Lesser Necklaced Laughingthrush		
296	<i>Garrulax pectoralis</i>	Greater Necklaced Laughingthrush		
297	<i>Garrulax maesi</i>	Grey Laughingthrush		
298	<i>Garrulax sp. A</i>	Laughingthrush sp. A		LKL
299	<i>Garrulax erythrocephalus</i>	Chestnut-crowned Laughingthrush		
300	<i>Pellorneum tickelli</i>	Buff-breasted Babbler		
301	<i>Pellorneum ruficeps</i>	Puff-throated Babbler		
302	<i>Malacopteron cinereum</i>	Scaly-crowned Babbler		
303	<i>Pomatorhinus hypoleucos</i>	Large Scimitar Babbler		
304	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	White-browed Scimitar Babbler		
305	<i>Pomatorhinus sp</i>	scimitar -babbler		
306	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	Streak-breasted Scimitar Babbler		
307	<i>Pomatorhinus ochraceus</i>	Red-billed Scimitar Babbler		
308	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	Coral-billed Scimitar Babbler		
309	<i>Napothera brevicaudata</i>	Streaked Wren Babbler		
310	<i>Napothera epilepidota</i>	Eye-browed Wren Babbler		
311	<i>Pnoepyga pusilla</i>	Pygmy Wren Babbler		
312	<i>Stachyris chrysaea</i>	Golden Babbler		
313	<i>Stachyris nigriceps</i>	Grey-throated Babbler		
314	<i>Stachyris striolata</i>	Spot-necked Babbler		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
315	<i>Macronous gularis</i>	Striped Tit Babbler		
316	<i>Pteruthius flaviscapis</i>	White-browed Shrike Babbler		
317	<i>Pteruthius melanotis</i>	Black-eared Shrike Babbler		
318	<i>Pteruthius aenobarbu</i>	Chestnut-fronted Shrike Babbler		
319	<i>Gampsorhynchus rufulus</i>	White-hooded Babbler		
320	<i>Actinodura ramsayi</i>	Spectacled Barwing		
321	<i>Minla cyanouroptera</i>	Blue-winged Minla		
322	<i>Minla strigula</i>	Chestnut-tailed Minla		
323	<i>Minla ignotincta</i>	Red-tailed Minla		
324	<i>Alcippe castaneiceps</i>	Rufous-winged Fulvetta		
325	<i>Alcippe dubia</i>	Rusty-capped Fulvetta		
326	<i>Yuhina flavicollis</i>	Whiskered Yuhina		
327	<i>Yuhina zantholeuca</i>	White-bellied Yuhina		
328	<i>Paradoxornis gularis</i>	Grey-headed Parrotbill		
329	<i>Paradoxornis nipalensis</i>	Black-throated Parrotbill		
330	<i>Dicaeum agile</i>	Thick-billed Flowerpecker		
331	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	Yellow-vented Flowerpecker		
332	<i>Dicaeum concolor</i>	Plain Flowerpecker		
333	<i>Dicaeum ignipectus</i>	Fire-breasted Flowerpecker		
334	<i>Dicaeum cruentatum</i>	Scarlet-backed Flowerpecker		
335	<i>Antheptes singalensis</i>	Ruby-cheeked Sunbird		
336	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>	Purple-naped Sunbird		
337	<i>Aethopyga gouldiae</i>	Mrs Gould's Sunbird		
338	<i>Aethopyga nipalensis</i>	Green-tailed Sunbird		
339	<i>Aethopyga christinae</i>	Fork-tailed Sunbird		
340	<i>Aethopyga saturata</i>	Black-throated Sunbird		
341	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird		
342	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter		
343	<i>Arachnothera magna</i>	Streaked Spiderhunter		
344	<i>Passer flaveolus</i>	Plain-backed Sparrow		
345	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow		
346	<i>Dendronanthus indicus</i>	Forest Wagtail		
347	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail		
348	<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail		
349	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail		
350	<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit		
351	<i>Anthus rufulus</i>	Paddyfield Pipit		
352	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit		
353	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit		
354	<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia		
355	<i>Emberiza fucata</i>	Chestnut-eared Bunting		
356	<i>Emberiza pusilla</i>	Little Bunting		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
357	<i>Emberiza aureola</i>	Yellow-breasted Bunting		
358	<i>Emberiza rutila</i>	Chestnut Bunting		
359	<i>Manis javanica</i>	Sunda Pangolin	Globally Near-Threatened; CA II	ARL
360	<i>Tupaia belangeri</i>	Northern Treeshrew	CA II	
361	<i>Nycticebus coucang</i>	Slow Loris	CA II	LKL
362	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Pygmy Loris	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	LKL
363	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed Macaque	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	PARL
364	<i>Manis pintadactyla</i>	Chinese Pangolin	Globally Near-Threatened; CA II	ARL
365	<i>Macaca assamensis</i>	Assamese Macaque	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	PARL
366	<i>Macaca mulatta</i>	Rhesus Macaque	Globally Near-Threatened; CA II	PARL
367	<i>Macaca arctoides</i>	Bear Macaque	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	PARL
368	<i>Pygathrix nemaeus</i>	Douc Langur	Globally Threatened - Endangered; CA I	ARL
369	<i>Hylobates sp.</i>	gibbon		
370	<i>Cuon alpinus</i>	Dhole	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	ARL
371	<i>Ursus thibetanus</i>	Asiatic Black Bear	Globally Threatened - Vulnerable; CA I	ARL
372	<i>Ursus malayanus</i>	Sun Bear	Data Deficient (Global); CA I	ARL
373	<i>Mustela strigidorsa</i>	Back-striped Weasel	Globally Threatened - Vulnerable	LKL
374	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten		
375	<i>Lutrogale sp.</i>	otter		
376	<i>Aonyx cinerea</i>	Oriental Small-clawed Otter	CA I	ARL
377	<i>Viverra zibetha</i>	Large Indian Civet		
378	<i>Viverricula indica</i>	Small Indian Civet		
379	<i>Prionodon pardicolor</i>	Spotted Linsang	CA I	LKL
380	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Common Palm Civet		
381	<i>Paguma larvata</i>	Masked Palm Civet		
382	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Small-toothed Palm Civet		
383	<i>Herpestes urva</i>	Crab-eating Mongoose		
384	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Leopard Cat	CA II	
385	<i>Pardofelis marmorata</i>	Marbled Cat	CA I	LKL
386	<i>Panthera pardus</i>	Leopard	CA I	ARL
387	<i>Panthera tigris</i>	Tiger	Globally Threatened - Endangered; CA I	ARL
388	<i>Elephas maximus</i>	Asian Elephant	Globally Threatened - Endangered, CA I	ARL
389	<i>Sus sp</i>	pig		
390	<i>Tragulus javanicus</i>	Lesser Oriental Chev-		

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
		rotain		
391	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar		PARL
392	<i>Muntiacus muntjak</i>	Red Muntjac		
393	<i>Bos gaurus</i>	Gaur	Globally Threatened - Vulnerable; CA I	ARL
394	<i>Bos javanicus</i>	Banteng	Globally Threatened - Endangered	ARL
395	<i>Naemorhedus sumatraensis</i>	Southern Serow	Globally Threatened - Vulnerable; CA I	PARL
396	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>	Saola	Globally Threatened - Endangered; CA I	ARL
397	<i>Ratufa bicolor</i>	Black Giant Squirrel	CA II	PARL
398	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Pallas's Squirrel		
399	<i>Callosciurus inornatus</i>	Inornate Squirrel	Globally Threatened - Vulnerable	LKL
400	<i>Tamias maritimus</i>	Eastern Striped Squirrel		
401	<i>Dremomys rufigenis</i>	Red-cheeked Squirrel		
402	<i>Menetes berdmorei</i>	Berdmore's Squirrel		
403	<i>Petaurista sp.</i>	Flying Squirrel		
404	<i>Petaurista elegans</i>	Lesser Giant Flying Squirrel		
405	<i>Hystrix sp.</i>	porcupine		
406	<i>Megaerops niphanae</i>	Northern Tail-less Fruit Bat		
407	<i>Macroglossus sobrinus</i>	Hill Long-tongued Fruit Bat		
408	<i>Rhinolophus luctus</i>	Large Woolly Horse-shoe Bat		PARL
409	<i>Rhinolophus paradoxolophus</i>	Bourret's Horseshoe Bat	Globally Threatened - Vulnerable	PARL
410	<i>Rhinolophus macrotis</i>	Big-eared Horseshoe Bat		PARL
411	<i>Rhinolophus pearsonii</i>	Pearson's Horseshoe Bat		PARL
412	<i>Rhinolophus sp.</i>	horseshoe bat		
413	<i>Rhinolophus pusillus</i>	Least Horseshoe Bat		PARL
414	<i>Rhinolophus malayanus</i>	Malayan Horseshoe Bat		PARL
415	<i>Rhinolophus thomasi</i>	Thomas's Horseshoe Bat	Globally Near-Threatened	PARL
416	<i>Rhinolophus affinis</i>	Intermediate Horseshoe Bat		PARL
417	<i>Hipposideros pomona</i>	roundleaf bat		
418	<i>Hipposideros cineraceus</i>	Least Roundleaf Bat		PARL
419	<i>Hipposideros lylei</i>	Shield-faced Roundleaf Bat	Globally Near-Threatened	PARL
420	<i>Hipposideros armiger</i>	Great Roundleaf Bat		PARL
421	<i>Aselliscus stoliczkanus</i>	Stoliczka's Trident Bat		PARL
422	<i>Myotis sp.</i>	myotis bat		
423	<i>Myotis annectans</i>	Hairy-faced Myotis	Globally Near-Threatened	LKL
424	<i>Myotis montivagus</i>	Large Brown Myotis	Globally Near-Threatened	LKL
425	<i>Myotis horsfieldii</i>	Horsfield's Myotis		
426	<i>Myotis hasseltii</i>	Rickett's Large-footed Myotis	Globally Near-Threatened	PARL

	SCIENTIFIC NAME	COMMON NAME	GLOBAL STATUS	LAO STATUS
427	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotine		
428	<i>Tylonycteris pachypus</i>	Lesser Flat-headed Bat		
429	<i>Pipistrellus sp</i>	pipistrelle bat		
430	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Common Bent-winged Bat		PARL
431	<i>Murina sp.</i>	tube-nosed bats		
432	<i>Murina tubinaris</i>	Tube-nosed bat		
433	<i>Murina huttonii</i>	Hutton's Tube-nosed Bat	Globally Near-Threatened	LKL
434	<i>Murina cyclotis</i>	Round-eared Tube-nosed Bat		
435	<i>Kerivoula papillosa</i>	Papillose Woolly Bat		
436	<i>Kerivoula hardwickii</i>	Hardwicke's Woolly Bat		
437	<i>Phoniscus jagorii</i>	Greater Groove-toothed Bat		
438	<i>Rat sp</i>	rat		
439	<i>Niviventer sp.</i>	rat		
440	<i>Chiromyscus chiropus</i>	Fea's Tree Rat		LKL
441	<i>Maxomys surifer</i>	Red Spiny Rat		
442	<i>Maxomys sp.</i>	rat		
443	<i>Amolops cremnobatus</i>	frog		
444	<i>Platysternon megacephalum</i>	Big-headed Turtle		ARL
445	<i>Cuora galbinifrons</i>	Indochinese Box Turtle	Globally Near-Threatened	ARL
446	<i>Cuora trifasciata</i>	Chinese Three-striped Box Turtle	Globally Threatened - Endangered	PARL
447	<i>Sacalia quadriocellata</i>	Four-eyed Turtle	Globally Threatened - Vulnerable	PARL
448	<i>Manouria impressa</i>	Impressed Tortoise	Globally Threatened - Vulnerable; CA II	ARL
449	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asiatic Softshell Turtle	Globally Threatened - Vulnerable	PARL
450	<i>Cyrtodactylus interdigitalis</i>	gekko		
451	<i>Calotes emma</i>	lizard		
452	<i>Calotes versicolor</i>	lizard		
453	<i>Physignathus cocincinus</i>	Water Dragon		PARL
454	<i>Ophisaurus sp.</i>	legless lizards		
455	<i>Varanus bengalensis</i>	Bengal Monitor	CA I	PARL
456	<i>Varanus salvator</i>	Water Monitor	CA II	PARL
457	<i>Lipinia sp.</i>	skink		
458	<i>Mabuya multifasciata</i>	skink		
459	<i>Scincella reevesi</i>	skink		
460	<i>Python reticulatus</i>	Reticulated Python	CA II	PARL
461	<i>Pareas hamptoni</i>	Hampton's Slug Snake		
462	<i>Pseudoxenodon bambusicola</i>	Chinese Mountain Keelback		
463	<i>Ptyas korros</i>	Indochinese Ratsnake		PARL
464	<i>Rhabdophis subminiatus</i>	Red-necked Keelback		
465	<i>Sinonatrix aequifasciata</i>	Mountain Keelback		
466	<i>Ophiophagus hannah</i>	King Cobra	CA II	PARL
467	<i>Trimeresurus mucrosquamatus</i>	Checker-backed Pit Viper		
468	<i>Trimeresurus popeiorum</i>	Popes' Pit Viper		

